

私立臺北醫學院八十九學年度第二學期期中期末考試(試)題紙

系級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
C、三	傳染病防治	蘇千田等	90年6月12日第3、4節		

\*①請注意本試題共 3 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

**第一部份 簡答題 (60%)**

一、請說明傳染病防治在台灣地區的重要性並舉出防治重點。

二、請寫出對傳染病防治助益大的預防注射，應具有哪些條件。

三、請分別寫出A型、B型、C型肝炎的傳染方式及目前疫苗預防注射的情形。

四、請寫出四個Health Risk Communication中可能出現的問題，並稍加解釋。

五、請分別寫出一種已根除，兩種根除中傳染性疾病的中英文名稱。

私立臺北醫學院 八十九 學年度第二學期 期中 考試 (試) 題紙

系級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
公三	傳染病防治	林千田等	90年6月12日第3、4節		

※①請注意本試題共 2 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

六、請寫出腦脊髓膜炎的疫情發展，並說明如果你是疾病管制局的局長，你要如何撲滅這次腦脊髓膜炎的疫情。

### 第二部分 選擇題 (10%)

一、關於瘧疾 (malaria)，下列何者是正確的：

- 1. 到熱帶地區旅遊，有發燒就要想到是不是感染瘧疾
- 2. 台灣沒有瘧疾患者
- 3. 瘧蚊都是在白天出沒
- 4. 以上皆正確

二、關於霍亂 (cholera)，下列何者是正確：

- 1. 台灣沒有霍亂病患
- 2. 腹瀉到會休克，要想起是不是霍亂
- 3. 到東南亞地區旅遊，不必注意飲食衛生，因為當地沒有霍亂疫情
- 4. 以上皆是

三、關於漢他病毒，下列何者錯誤：

- 1. 由老鼠傳播
- 2. 花蓮地區的案例是漢他出血熱的典型表現
- 3. 最近在苗栗也有一例漢他出血熱病例
- 4. 大陸東部省份很多感染個案

四、下列何者非必須立即通報的法定傳染病：

- 1. 霍亂
- 2. 愛滋病
- 3. 鼠疫
- 4. 伊波拉出血熱

五、下列何者為非性傳染病：

- 1. 子宮頸癌
- 2. B 型肝炎
- 3. 梅毒
- 4. 肺結核

### 第三部份 選擇題 (10%)

一、女性最常見之泌尿道感染是：

- 1. 急性膀胱炎
- 2. 急性腎盂腎炎
- 3. 慢性腎盂腎炎
- 4. 以上皆是

二、急性膀胱炎最常見之感染源是：

- 1. E COLI
- 2. Staphylococcus
- 3. Streptococcus
- 4. Proteus

三、以下何者不是預防急性膀胱炎的應注意事項？

- 1. 多喝水
- 2. 少憋尿
- 3. 充足睡眠
- 4. 多喝啤酒

私立臺北醫學院八十九學年度第二學期期中考試(試)題紙

系級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
公三	傳染病防治	林木千田等	90年6月12日第3、4節		

※①請注意本試題共3張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

四、預防性病的最好方法是？

- 1. 事前服用抗生素 2. 戴保險套 3. 事後局部清洗 4. 多喝水，多排尿

五、結核菌的泌尿道感染多為：

- 1. 淋巴感染 2. 經尿道逆行性感染 3. 血行感染 4. 以上皆非

#### 第四部分 選擇題 (10%)

一、下列何者不是美國疾病管制中心新聞發布的準則：

- 1. 正確性 2. 迅速性 3. 戲劇性 4. 嘉慎性

二、下列有關腸病毒疫性的敘述何者為非：

- 1. 可能致死 2. 多發生於幼兒 3. 常洗手為防治方法之一  
4. 去年流行過，今年不會再流行

三、下列有關去年美國紐約西尼羅病毒疫情的敘述，何者為非：

- 1. 可能致死 2. 傳播媒介為禽鳥 3. CDC 曾介入調查  
4. 媒體報導沒能提供適當資訊，並造成恐慌

#### 第五部分 選擇題 (10%)

一、院內感染細菌之來源大多是由下列何種而來？

- 1. 內因性細菌(Endogenous) 2. 外因性細菌(Exogenous)

二、院內感染中，最常發生的感染部位為何？

- 1. Urinary tract infection 2. Blood stream infection 3. Surgical site infection  
4. Bone joint infection 5. Gastrointestinal tract infection

三、在預防院內感染時，最重要且最簡便的方法是

- 1. 隔離措施 2. 加強洗手 3. 預防針扎 4. 使用較強的抗生素 5. 戴口罩

四、下列何者不是造成院內感染 UTI 之危險因子？

- 1. Prolonged duration of catheterization 2. Error in catheter care 3. Microbial colonization  
4. Diabetes mellitus 5. Male patient

五、下列何者不是造成院內呼吸道感染之危險因子？

- 1. Old age 2. COPD 3. Clear consciousness 4. Endotracheal intubation 5. Intra-abdominal surgery