

系 級	科 目	授 課 教 師	考 試 日 期	學 號	姓 名
牙二	口腔解剖學	沈永明等	____年____月____日第____節		

※①請注意本試題共 4 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

I 選擇題 (每題 2 分)

- 恆牙萌發，以那一顆牙為優先？(去除個別差異，以一般平均值而言)  
 A. 上顎門齒                      B. 下顎門齒                      C. 上顎第一大白齒  
 D. 下顎第一大白齒              E. 上顎犬齒
- 中臉部 (mid face) 生長，由 3 至 18 歲，以何者有最明顯增加？  
 A. 寬度 (Width)                  B. 深度 (Depth)                  C. 高度 (Height)
- 以下何者最後完成發育，達到成人生長量？  
 A. 眼眶骨                      B. 顴骨                      C. 上顎骨                      D. 下顎骨                      E. 耳骨
- 14 歲女童，她的那一顆牙應已經達到成年之生長量？  
 A. 犬齒                      B. 大白齒                      C. 小白齒                      D. 門齒                      E. 以上皆是
- 12 歲男生的頭顱部發育程度，一般而言，可以比擬以下那一項之生長情況？  
 A. 9-10 歲女生                  B. 14-15 歲女生                  C. 12-13 歲女生
- Adolescence 時期，有許多臉部發育的明顯特徵，請選出不正確的一項。  
 A. 眼睛變大                      B. 鼻子變大                      C. 顴骨變大  
 D. 牙齒暴出                      E. 臉部變大
- 上下顎乳門牙齒軸之交角，正常值均為：  
 A. 100 度                      B. 120 度                      C. 160 度
- 以下何者最能幫助醫師預估青少年下顎之生長量？  
 A. 出生年月日                  B. 牙齒萌發順序                  C. 身高年增量                  D. 骨骼年齡
- Otic ganglion 位於  
 A. mandibular division of the trigeminal nerve 之外側  
 B. mandibular division of the trigeminal nerve 之內側  
 C. superior posterior alveolar nerve 之內側  
 D. sphenopaltine fossa
- 下列何者非由 glossopharyngeal nerve 控制：  
 A. stylopharyngeus muscle      B. palatopharyngeal muscle      C. styloglossus muscle
- Sublingual space 與 submandibular space 之界限肌肉為：  
 A. genioglossus muscle                      B. geniohyoid muscle  
 C. mylohyoid muscle                      D. digastic muscle
- 由 lateral pterygoid and medial pterygoid muscles 之間穿出之 nerves 為：  
 A. buccal nerve and anterior temporal nerve      B. buccal nerve and inferior alveolar nerve  
 C. lingual nerve and inferior alveolar nerve      D. buccal nerve and lingual nerve
- 由 lateral pterygoid muscle 之二頭間穿出之 nerves 為：  
 A. buccal nerve and anterior temporal nerve      B. buccal nerve and inferior alveolar nerve  
 C. lingual nerve and inferior alveolar nerve      D. buccal nerve and lingual nerve
- 牙齒喪失之後，無牙脊之外形為  
 A. 上牙脊變大，下牙脊變小                      B. 上牙脊變小，下牙脊變大  
 C. 上牙脊，下牙脊均變小                      D. 上牙脊，下牙脊均變大

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
牙二	口腔解剖學	洪景明等	____年____月____日第____節		
※①請注意本試題共 4 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。					

II 填充題 (每格 1 分)

- Long buccal nerve 大約在 \_\_\_\_\_ 的位置,從下顎骨(mandible)的內側轉向外側,再繼續往前行.
- Infraorbital nerve 大約在 infraorbital notch 下緣 \_\_\_\_\_ mm.
- 上顎(maxilla)palatal gingiva 的感覺是由 \_\_\_\_\_ nerve 支配,它穿出 palatal bone 的位置是由牙齦脊(gingival crest)往正中縫合(midline suture)的方向約 \_\_\_\_\_ mm 處.
- Mental nerve 的開口絕大多數位於 \_\_\_\_\_ (那顆牙齒)的下方,它的方向是朝 \_\_\_\_\_.
- 如果做 anterior and middle superior alveolar nerve block anesthesia,上顎第一大臼齒的那一個牙根(root)無法被麻醉. \_\_\_\_\_
- 請寫出下列各個位置的感覺主要是由那條神經支配(不包括 perforating branch)
  - palatal gingiva of maxilla anterior teeth. \_\_\_\_\_
  - buccal gingiva of maxilla anterior teeth. \_\_\_\_\_
  - mandibular teeth of. \_\_\_\_\_
  - lingual gingiva of mandibular teeth. \_\_\_\_\_
- 以 indirect method 做 inferior alveolar nerve block anesthesia,注射筒(syringe)應位於對側的 \_\_\_\_\_ 及 \_\_\_\_\_ (那兩顆牙齒)之間.
- 做完 inferior alveolar nerve block anesthesia,注射筒往回退一半再注射麻醉藥其目的是要麻醉 \_\_\_\_\_ nerve.
- 以口外法(extraoral method)做 maxilla or mandible nerve block anesthesia 時,需先找到 \_\_\_\_\_ 的中點下緣,下針後碰到的骨頭應為 \_\_\_\_\_ (需寫出那一個骨頭的那一個部份)

私立臺北醫學院 90 學年度第 1 學期 ~~期中~~ ~~期末~~ 考試 (命試) 題紙

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
牙二	口腔解剖學	洪景明	____年____月____日第____節		

\*①請注意本試題共 4 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

10. 根據 Laskin 之分類, 頸部肌膜 (Fascia)除 Alar plate,及 Carotid sheath 之外尚有那四層, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.
11. Platysma 包含於 \_\_\_\_\_ fascia
12. masticator space proper 之外側為 \_\_\_\_\_ fascia 及 \_\_\_\_\_ fascia
13. lateral pharyngeal space 之界限: medially: \_\_\_\_\_; laterally: \_\_\_\_\_ muscle
14. masticator space proper 之外側為 \_\_\_\_\_ fascia 及 \_\_\_\_\_ fascia
15. \_\_\_\_\_ refers to the area formed by the residual scar of the third (\*last molar) and thr retromolar papilla
16. \_\_\_\_\_ is the area of bone between the extraction sites of the molars and the external oblique ridge.
17. 由鼻腔側壁 Torus tubarius 內方向前, 內,向下行走之隆起為 \_\_\_\_\_ muscle 所構成, 其神經支配為 \_\_\_\_\_ n,
18. 有關 Pterygopalatine fossa 之 communication 為
  - a. \_\_\_\_\_ to nasal cavity
  - b. \_\_\_\_\_ to middle cranial fossa
  - c. \_\_\_\_\_ to infra temporal fossa
  - d. \_\_\_\_\_ to hard palate
  - e. \_\_\_\_\_ to orbit
19. distolingual vestibule 稱為 lateral throat form 也就是指 \_\_\_\_\_ fossa
20. 下顎全口假牙之 primary supporting area:
  - A.
  - B.
  - C.
21. 列出 paranasal sinuses and air cells 於鼻腔之開口:

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
牙二	口腔解剖學	洪景明等	____年____月____日第____節		

※①請注意本試題共 4 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

III 填充題 (每格 2 分)

1. In the maxillary anterior teeth, nasal obstruction may be affected by periapical infection of \_\_\_\_\_.
2. There are three types ca be established in the relation of the root apices to the mandibular canal. Which is the most frequent type in the young age?  
\_\_\_\_\_
3. Spread of an infection from apexes of lower molar teeth is influenced by the origin of the \_\_\_\_\_ muscle laterally and the origin of the \_\_\_\_\_ muscle medially.
4. Extension of infection from the apexes of upper canines usually localizes in the \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ and skin. The \_\_\_\_\_ muscle is an effective barrier against progression to the skin.
5. The cortical bone of alveolar, processes which around the root surface is named \_\_\_\_\_ in the radiography.

IV 是非題 (每題 1 分)

1. External carotid artery 的 ligation 可以由 submandibular triangle approach.
2. 顏面部骨折 Le Fort I, II, III fracture 名稱依序為 craniofacial dysjunction, pyramid fr, horixontal fr.
3. 在做 facial artery 的 ligation 做 submandibular incision 應緊鄰 mandible 的 lower border 且平行做切線。
4. compound fracture 指的是骨折, soft tissue 受傷, 且有 open wound.
5. 上顎第一大臼齒頰側牙根之 palatal abscess, 切開引流應做 transvers incision.
6. 在 retromandibular fossa 施行 carotid artery 的 ligation 比在頸部施行容易。
7. zygomatic fracture 造成下陷, 會影響張口, 可能會造成患者有複視現象。
8. 手術時我們可以在 digastric tendon, posterior mylohyoid border 及 hypoglossal nerve 所圍成的三角區內找到 lingual artery 施行結紮手術。
9. 在 retromandibular fossa 施行 external carotid artery 的結紮可幫助中顏面部深部組織的止血。
10. 顏面部骨折處理是僅需要骨頭復位術(reduction)與固定術(immobilization), 咬合的處理並不重要。