

私立臺北醫學院 九十二 學年度第 一 學期期中(末)考試命(試)題紙

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
醫四	外科概論	吳志雄、陳守誠	93年1月8日第 節		

l 請注意本試題共 9 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 m 每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

答 案 卷

※ 請將答案填於答案紙上，否則將不予計分。

出題者：陳守誠 老師 複選題 (每題2分，共計8分)

1.	2.	3.	4.
----	----	----	----

出題者：陳敏夫 老師 單選題 (每題2分，共計8分)

1.	2.	3.	4.
----	----	----	----

出題者：王水深 老師 單選題 (每題1分，共計6分)

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

出題者：王德錦 老師 複選題 (每題1分，共計8分)

1.	2.	3.	4.	5.
6.	7.	8.		

出題者：翁仁崇 老師 單選題 (每題2分，共計8分)

1.	2.	3.	4.
----	----	----	----

出題者：陳瑞雄 老師 單選題 (每題2分，共計8分)

1.	2.	3.	4.
----	----	----	----

出題者：黃清水 老師 單選題 (每題1分，共計8分)

1.	2.	3.	4.	5.
6.	7.	8.		

出題者：劉國威 老師 單選題 (每題1分，共計6分)

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

出題者：蔡豐州 老師 單選題 (每題2分，共計6分)

1.	2.	3.
----	----	----

出題者：羅文政 老師 單選題 (每題2分，共計8分)

1.	2.	3.	4.
----	----	----	----

出題者：邱文達 老師 單選題 (每題2分，共計6分)

1.	2.	3.
----	----	----

出題者：吳志雄 老師 單選題 (每題2分，共計8分)

1.	2.	3.	4.
----	----	----	----

出題者：許文憲 老師 單選題 (每題2分，共計4分)

1.	2.
----	----

出題者：謝茂志 老師 單選題 (每題2分，共計8分)

1.	2.	3.	4.
----	----	----	----

私立臺北醫學院 九十二 學年度第 一 學期期中(末)考試命(試)題紙

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
醫四	外科概論	吳志雄、陳守誠	93年1月8日第 節		

l 請注意本試題共 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 m 每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

92(上)醫四外概期末考題 出題老師：陳守誠
 複選題：(每題 2 分，共計 8 分)

1. () 小腸閉鎖症的正確項是：
 - (A) 口徑大小相差甚大的腸之吻合術是手術後易併發裂漏(leakage)的主要原因
 - (B) 術後的存活率以 apple peel 或聖誕樹型者較差
 - (C) 術後的存活率與在胎日數有關
 - (D) 迴腸部閉鎖者，患唐氏症(down syndrome)機率較十二指腸閉鎖者高
 - (E) 由於科技進步現在存活率皆於 40-50% 左右
2. () 裂腹畸形(Gastroshchisis)不同於臍膨出症(Omphalocele)的重點是：
 - (A) 裂腹畸形是臍帶與脫出的內臟包在一起
 - (B) 裂腹畸形是有獨立的臍帶
 - (C) 脫出的內臟邊可找到羊膜者為臍膨出症
 - (D) 臍帶與脫出的內臟間有完整的皮膚者為裂腹畸形
 - (E) 兩者的手術方法原則上是一樣的
3. () 有關先天性無肛症正確的是：
 - (A) 直腸末端有到達或超過 I-line (ischial-line) 者可確定為低位
 - (B) 只要一判斷其型態則不論是高低位皆可馬上施行 cut back 之根治手術
 - (C) 倒立攝影(Ivertogram)最主要的是以 P-C line (pubic-coccygeal line) 判斷其高低位之型態
 - (D) 手術後的排便機能以高位者較好
 - (E) 新生兒的健診只要看到正常的肛門則不需要以指檢方式(digital examination)確認
4. () 先天性食道閉鎖症 (esophageal atresia) 正確項是：
 - (A) 食道閉鎖合併遠端氣管食道瘻管之型態最常見
 - (B) 診斷可用灌過鋇劑之橡皮管 (Nelaton tube) 但不能以鋇劑做食道造影
 - (C) 單純食道閉鎖 (食道上下皆為盲端而無瘻管者) 之型態最常見
 - (D) 適合一次根治手術者為兩盲端之距離小於 2 公分者
 - (E) 單純氣管食道瘻管之型態最常見

92 學年度醫四外概期末考題 陳敏夫老師
 單選題 (每題 2 分，共計 8 分)

1. Which of the following is correct?
 - A. Surgery plays an adjuvant role in the treatment of cancer.
 - B. The best area for biopsy is the zone of necrosis.
 - C. Enucleation is the treatment of choice for malignant tumor.
 - D. All of above
 - E. None of above
2. Which of the following is correct?
 - A. The severity of the underlying medical diseases is not a major concern of operative risks.
 - B. Although perioperative mortality is high relative the probability of cure, surgery is still a good choice for cancer management.
 - C. Absence of metastases is a factor making surgery successful.
 - D. A and B
 - E. A and C
3. Which of the following is correct?
 - A. A successful surgery should remove the primary tumor together with a reasonable margin of the surrounding healthy tissue.
 - B. If surgery would cause the disease to worsen, cancer should not be advised.
 - C. The tumor can be manipulated without causing any adverse influence.
 - D. A and B
 - E. All of the above
4. Which of the following is incorrect?
 - A. Multidisciplinary therapeutic strategy is advocated for cancer treatment.
 - B. A good surgical oncologist should be able to conduct teaching programs, clinical research, and experimental research.
 - C. In addition to play a major role in the treatment of primary tumor, surgery also treats the complications caused by other cancer treatments.
 - D. All of the above
 - E. None of the above

私立臺北醫學院 九十二 學年度第 一 學期期中(末)考試命(試)題紙

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
醫四	外科概論	吳志雄、陳守誠	93年1月8日第 節		

1 請注意本試題共 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 m 每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

92 學年醫四外概期末考題 出題老師：王水深
 單選題(每題1分，共計6分)

- Which of the following about coronary blood flow is NOT correct?
 - Normal coronary blood flow approximates 70-90 cc/100gm myocardium/min
 - The unit myocardial blood flow is 10 times higher than the rest of the body
 - The oxygen saturation in coronary sinus is lower than that in SVC or IVC
 - Coronary artery blood flow occurs primarily during systole
 - The extraction of oxygen in the coronary bed is two thirds or more
- Which of the following should receive coronary artery bypass surgery EXCEPT:
 - Left main coronary artery stenosis of 70% with no symptoms
 - Left main coronary artery stenosis of 80% with chest pain
 - Three-vessel disease with 90% stenosis of proximal LAD
 - 90% stenosis of RCA and CX with no symptoms
 - 90% stenosis of proximal LAD and proximal LCX
- Which of the following are risk factors for coronary artery bypass surgery, EXCEPT:
 - Age older than 65 years
 - Ejection fraction >60%
 - Female gender
 - Hypertension
 - Diabetes mellitus
- Which of the statement about surgical indication for aortic valve lesion is NOT correct
 - The asymptomatic patient should not undergo operation
 - Progressive increase in cardiac size on serial X-ray should receive operation
 - Intolerable angina with diastolic pressure below 50 mmHg is indicated
 - Significant left heart failure is indicated for operation
 - Regurgitation due to bacterial endocarditis usually needs valve replacement
- Which of the following test is the best guide to monitor warfarin (Coumadin) therapy as an anticoagulant?
 - Prothrombin time (PT)
 - Partial thromboplastin time (PTT)
 - Activated partial thromboplastin time (APTT)
 - Activated clotting time (ACT)
 - Thrombin time (TT)
- Which of the following cardiac condition is recommended for endocarditis PROPHYLAXIS?
 - Isolated secundum atrial septal defect
 - Previous coronary artery bypass grafting surgery
 - Mitral valve prolapse without regurgitation in children
 - Cardiac pacemakers
 - Previous bacterial endocarditis, even in the absence of heart disease

92(上)醫四外概期末考題 出題老師：王德錦
 單選題(每題1分，共計8分)

- 乳房局部皮膚凹陷(Skin dimpling)，除了乳癌之可能外，也有可能原因為：
 - Breast Abscess
 - Fat Necrosis
 - Leiomyoma
 - Fibroadenoma

私立臺北醫學院 九十二 學年度第 一 學期期中(末)考試命(試)題紙

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
醫四	外科概論	吳志雄、陳守誠	93年1月8日第 節		

1 請注意本試題共 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 m 每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

2. Bloody nipple discharge 最可能原因為：

- (a) Breast cancer
- (b) Page's disease
- (c) Intraductal papilloma
- (d) mastitis

3-8 題之各種病例之下一步驟之處理以那一種手術法 (A-G) 為最正確？(可重覆選擇)

- A. Excision
- B. Nipple Biopsy
- C. Radical Mastectomy
- D. Modified Radical Mastectomy
- E. Mastectomy
- F. Needle Localization Biopsy
- G. Conservation Operation (乳房保留手術)

3. 28 歲未婚女性，乳頭下一公分處有 3 公分大之腫瘤，經 Biopsy 為 Infiltrating ductal carcinoma
4. 30 歲未婚婦女，右外上側距乳頭 3 公分之位置；有 2 公分之腫瘤，Biopsy 確定 Infiltrating ductal carcinoma
5. 40 歲婦女，經乳頭病理切片檢查，確定為 paget's disease，但乳房檢查並無腫瘤現象
6. 右側乳頭長期 itching，並有濕疹樣的皮膚病變，且容易出血
7. 50 歲婦女，乳房並無腫塊，定期 mammography 發現有 cluster microcalcification 在右外側位置
8. 50 歲婦女，有 3 公分大之腫瘤，經 biopsy 為 malignant phyllodes tumor

92 學年醫四期末考題 出題老師：翁仁崇

單選題 (每題 2 分，共計 8 分)

1. 一位兩天大的男嬰在地區醫院出生時即有明顯發紫的現象，血氧濃度 78%，呼吸急促，經心臟超音波檢查初步診斷為大血管完全轉位症 (TGA)，由於該地區醫院無法執行複雜開心手術，而且顧慮到轉送大醫院之過程中發生病情惡化之情形。你認為此時應先做下列何種處置以暫時穩定病情？
 (A) B-T shunt (B) Bidirectional; Glenn shunt (C) Total cavopulmonary shunt (D) Atrial septostomy.
2. (承上題)該病童經轉送大醫院後心導管檢查證實為 TGA，並無合併 VSD，血氧濃度可達 85%，呼吸稍緩。如果你是一位心臟外科醫師你認為以目前的趨勢此病童應接受下列何種手術治療？
 (A) Mustard operation (B) Jatene operation (C) Fontan operation (D) Norwood operation.
3. 一位 3 個月大的女嬰，患有蒙古癡呆症 (Down syndrome)，同時主訴經常性上呼吸道感染、體重不增、聽診發現有收縮性心雜音和 second heart sound 增強之情形，心電圖呈現心軸偏左 (left axis deviation) 之現象，你認為這位女嬰最可能的診斷為：
 (A) secundum type atrial septal defect (B) perimembranous type ventricular septal defect
 (C) AV canal type septal defect (D) sinus venous type atrial septal defect
4. (承上題)目前這位女嬰在門診接受強心劑和利尿劑的治療，你認為此女嬰在何時接受外科手術治療的時機最恰當？
 (A) 一歲以內 (B) 兩歲以內 (C) 學齡前 (D) 青春期

92(上)醫四外概期末考題 出題老師：陳瑞雄

單選題 (每題 2 分，共計 8 分)

1. The criteria of "diagnostic symptoms and signs of 5-P's" for the peripheral arterial occlusive disease including the followings except.
 (a) Pain
 (b) Pulseless
 (c) Paresthesia
 (d) Purple
 (e) Paraparesis

私立臺北醫學院 九十二 學年度第 一 學期期中(末)考試命(試)題紙

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
醫四	外科概論	吳志雄、陳守誠	93年1月8日第 節		

1 請注意本試題共 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 m 每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

2. Which of the following procedure is not an extra-anatomic bypass?
- Femoral to ipsilateral popliteal bypass
 - Right femoral to left femoral bypass
 - Axillary to bi-femoral bypass
 - Right axillary to left axillary bypass
 - Right axillary to left popliteal bypass
3. Which of the following is greatest benefit in the treatment of patients with "Burger's Disease"?
- Sympathectomy
 - Oral Vasodilators
 - Arterial reconstructive surgery
 - Cessation of tobacco use
 - Warfarin anticoagulation
4. For "Carotid artery stenosis", which of the following situation is not a candidate for receiving carotid endarterectomy?
- The symptomatic patients with 70% carotid artery stenosis
 - The asymptomatic patient with 80% carotid artery stenosis
 - The asymptomatic patient with 75% carotid artery stenosis
 - The symptomatic patient with 90% carotid caotid artery stenosis
 - The patients with symptoms of "subclavian steal" plus 50% of concomitant carotid artery stenosis, and patent posterior communicating artery

92 學年醫四期末考題 出題老師：黃清水

單選題 (每題 1 分，共計 8 分)

- 依照 Nyhus 對鼠蹊部疝氣的分類，股疝氣是屬於 (1) type I (2) type II (3) type III (4) type IV。
- 下列各種疝氣何者最不容易得到術前診斷？(1) indirect (2) direct (3) femoral (4) obturator。
- 有關小兒疝氣以下幾點何者為錯？(1)與 patent processus vaginalis 有關 (2)男多於女 (3)左邊多於右邊 (4)主要為 indirect。
- 一般而言何種疝氣最不容易發生 incarceration？(1) direct (2) indirect (3) femoral (4) obturator。
- 有關 Richter hernia 何者為非？(1)腸道的 antimesenteric side 發生嵌頓 (2)不易診斷 (3)常發生於較小而邊緣堅硬的 hernia (4)常伴有完全性的腸阻塞(complete ileus)。
- 應用巴斯卡流體力學原理的修補法是：(1) Bassini (2) Lichtenstein (3) McVay (4) Stoppa (5) Marcy 修補法。
- 有關腹腔鏡疝氣手術的陳述下列何者為誤？(1)傷口小、恢復快 (2)術後疼痛減少(3)較經濟便宜(4)需使用人工網(5)需全身麻醉。
- 復發性疝氣手術困難，再復發率高的原因是除了(1)前次手術疤痕粘連 (2)組織缺失 (3)組織退化薄弱 (4)無法使用人工網。

92 學年醫四外概期末考題 出題老師：劉國威

單選題 (每題 1 分，共計 6 分)

- 對於血管瘤(hemangioma)的敘述，下列何者為非？
 - 胎兒時迅速長大
 - Mast cell 在 proliferative phase 數目增加
 - 通常不會退化
 - 血管內皮細胞(endothelial cell)不正常增生
 - 與 Vascular Malformation 外觀不易區分

私立臺北醫學院 九十二 學年度第 一 學期期中(末)考試命(試)題紙

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
醫四	外科概論	吳志雄、陳守誠	93年1月8日第 節		

1. 請注意本試題共 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 m 每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

- 皮膚雷射治療 Tattoos 對何種顏色最不易治療？
 - Cosmetic red inks
 - flesh-toned, tan inks
 - White inks
 - 以上皆是
 - 以上皆非
- 雷射作用於皮膚中，以下列何者對身體標的物(chromophores)最有作用？
 - Reflected
 - Transmitted
 - Scattered
 - Absorbed
 - 以上皆非
- Kasabach-Merritt Phenomenon 是包括
 - 有 primary platelet trapping
 - Thrombocytosis
 - PT, aPTT, variably elevated.
 - Low fibrinogen level
 - Biopsy 有 atypical histolytic picture
- 雷射安全上，下列何者會引起呼吸道疾病(e.g. pneumonia, bronchitis, emphysema 等)
 - Ocular hazards
 - Fire
 - Plume and splatter
 - Electrocution
 - Skin and surrounding tissue hazards
- 血管瘤等紅色斑，目前以何種雷射治療效果最理想？
 - CO₂ Laser
 - Argon
 - Pulsed dye Laser
 - Ruby Laser
 - Nd:Yad Laser

92 學年醫四外概考題 出題老師：蔡豐州

單選題(每題 2 分，共計 6 分)

- 燒燙傷於急性期(休克期)給予輸液極為重要，目前最被廣泛使用的公式為？
 - Kooland formula 2.5cc/kg/%TBSA
 - Parkland formula 4cc/kg/%TBSA
 - Brooke formula 6cc/kg/%TBSA
 - 以上皆非
- 擁有自己獨立一套供應血液循環血管的組織叫做什麼？
 - Graft
 - Flap
 - Construct
 - 以上皆是
- 受傷後產生纖維化疤痕，並延伸出傷口範圍的病態組織稱做：
 - Hypertrophic scar
 - Keloid
 - Spider nevus
 - 以上皆非

92 學年醫四外概期末考題 出題老師：羅文政

單選題(每題 2 分，共計 8 分)

- 下列三叉神經痛相關敘述何者為非？
 - 主要侵襲 V₂ 及 V₃
 - 年輕人出現 trigeminal Neuralgia 需注意是否為 MS(multiple sclerosis)患者
 - 主要是 internal carotid artery 在 trigeminal N 的 entry zone 造成 compression
 - 少部份病患為腫瘤引起，如三叉神經瘤

私立臺北醫學院 九十二 學年度第 一 學期期(末)考試命(試)題紙

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
醫四	外科概論	吳志雄、陳守誠	93年1月8日第 節		

1 請注意本試題共 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 m 每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

2. 下列敘述何者為非？
- (1) 三叉神經痛，常會有 trigger zone
 - (2) 顯微血管減壓手術能有效且不會造成神經永久傷害
 - (3) NSAID 抗發炎止痛藥為主要的藥物選擇
 - (4) 若懷疑為腫瘤引起的三叉神經痛，則 MRI 為必需的檢查
3. 下列敘述何者正確？
- (1) Subdural hemorrhage(SDH)可分為急性、亞急性及慢性。其中慢性代表受傷時間大於一週以上
 - (2) 一般為介於腦膜及大腦皮質間的交通靜脈或靜脈竇受傷所致
 - (3) 一般患者年齡大於 60 歲，且伴有挫傷性腦出血時，則死亡率大於 50%
 - (4) CT 上可見列 hyperdense(white) crescentic mass 沿者顱骨的 inner table
4. 有關 Subarachnoidal hemorrhage(SAH)敘述何者為非？
- (1) 常與動脈瘤或動靜脈畸型破裂有關
 - (2) Warning headache 常見於動靜脈畸型，約 30~50%
 - (3) 病患常有頸部僵硬的症狀，且有 25%病人會有 seizure 發作
 - (4) 一般 SAH 分為五個等級。而病人意識清楚但伴有一側眼瞼下垂瞳孔放大，因此將歸為第二級(grade II)

92 學年醫四外概期末考題 出題老師：邱文達

單選題 (每題 2 分，共計 6 分)

- () 1. 蜘蛛網膜下腔出血最常見的原因是(a)Aneurysm(b)AVM(c)Brain tumor(d)Brain abscess
- () 2. GDC (Guglielmi detachable Coils)是用來治療(a)Aneurysm(b)AVM(c)Brain tumor(d)Brain abscess
- () 3. Guideline of severe head injury 是源自於(a)實證醫學(b)經驗累積(c)報章雜誌(d)教科書

92(上)醫四外概期末考題 吳志雄老師

單選題 (每題 2 題；共計 8 題)

1. () A patient received thyroid surgery had sudden onset of high fever palpitation, hypertension flush which of the followings is inappropriate management
 (1)calcium gluconate injection (2) Check Cortisol (3) Check T₃ T₄ (4) large dose of PTU
2. () A patient had bilateral thyroidectomy in the morning, sudden onset of air hunger agitation and restless in the afternoon, which is the first thing to do?
 (1)Life long calcium supply (2) Open wound with evacuation of hematoma
 (3)Thyroid hormone supply (4)Check serum calcium
3. () Which of the followings is the most sensitive test in thyroid cancer follow up after bilateral total thyroidectomy :
 (1)Thyroid sonography (2)Thyroglobulin (3)T₃ T₄ (4)Bone scan
4. () Most common type of primary hyperparathyroidism is
 (1)Chief cell hyperplasia (2)Adenocarcinoma (3)Clear-water cell hyperplasia (4)Single adenoma

2. What is the most common type of primary hyperparathyroidism is

- (A) Chief cell hyperplasia
- (B) Adenocarcinoma
- (C) Residual hyperplasia
- (D) Multiple adenomas
- (E) Diphtheria

私立臺北醫學院 九十二 學年度第 一 學期期中(末)考試命(試)題紙

系 級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
醫四	外科概論	吳志雄、陳守誠	93年1月8日第 節		

1 請注意本試題共 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 m 每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

92 學年醫四外概期末考題 出題老師：許文憲

單選題 (每題 2 分，共計 4 分)

1. Following a traffic accident, a 40-year old female motorcyclist sustained blunt trauma to abdomen but she was able to go to work. Five hours later she started having abdominal pain with abdominal distention. For this reason she visited surgical clinic in a general hospital where she complained of pain in both side of shoulder when she was on supine position. She was noticed to have pale face with a Hb of 8.0 at this time. She also complained of pain in left lower rib cage.

What do you think about this patient's pathology?

- (1) Hemoperitoneum due to stomach perforation.
- (2) Due to bowel perforation.
- (3) Due to pancreas laceration.
- (4) Due to liver laceration.
- (5) Due to spleen laceration

2. A 10-year old girl was riding a bicycle that hit a rock in road, so she bumped her abdomen to the handle bar. 24 hours later she started complaining of upper abdominal abdomen associated with nausea and vomiting. Her temperature was up to 38°C, BP 110/80, pulse rate 108/min, WBC up to 16,000.

What is most likely injury to the visceral organs?

- (1) Liver
- (2) Small intestine
- (3) Pancreas
- (4) Spleen
- (5) Stomach

92 學年醫四外概期末考題 出題老師：謝茂志

單選題 (每題 2 分，共計 8 分)

1. A careful appendectomy was done for acute appendicitis. The operation wound is classified as:

- (A) Clean wound.
- (B) Dirty wound.
- (C) Contaminated wound.
- (D) Clean-dirty wound.
- (E) Clean-contaminated wound.

2. What is the organism that causes a viscus-contaminated wound infection?

- (A) *Staphylococcus epidermidis*
- (B) *Staphylococcus aureus*
- (C) Resident flora
- (D) *Streptococcus pyogenes*
- (E) Diphtheroids

私立臺北醫學院 九十二 學年度第 一 學期期中(末)考試命(試)題紙

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
醫四	外科概論	吳志雄、陳守誠	93年1月8日第 節		

l 請注意本試題共 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 m 每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

3. For surgical infections, which statement is NOT correct ?
- (A) Usually needs an incision/drainage.
 - (B) Usually needs a surgical intervention
 - (C) Usually caused by aerobes.
 - (D) Should divert/repair a bowel leak when it developed.
 - (E) Should receive regular monitoring for operative infection.
4. For a patient with post-operative wound infection, which statement is NOT correct ?
- (A) Usually developed 5 to 10 days after the operation.
 - (B) May develop fever and wound pain.
 - (C) It is usually the cause of death.
 - (D) Open the wound and allow it to drain.
 - (E) Suturing the wound with braided silk.