

私立臺北醫學院/十九學年度第 二 學期 期中 考試(試)題紙

系級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
(五)	精神科	林月琴	90年6月19日第3節		

※①請注意本試題共3張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

1. () E.C.T.最常見的 complication 是 (1) disorientation (2) memory impairment (3) hypotension (4) drowsiness
2. () Akathisia 可能出現於接受那種藥物治療的病人 (1) valium (2) lithium (3) tricyclic antidepressant (4) chlorpromazine
3. () 目前臨牀上最常用於治療失眠的藥物是屬於那一類? (1) barbiturates (2) benzodiazepines (3) antihistamines (4) phenothiazines
4. () 接受鋰鹽治療病人其血中鋰濃度較不受下列那一因素之影響 (1) 腎臟功能 (2) 食鹽攝取量 (3) 利尿劑 (4) 肝臟功能
5. () 病人認為公共汽車上的人對他指指點點，或是頭故意轉一邊看不起他，可能是那一種精神症狀 (1) visual hallucination (2) delusion of reference (3) incoherent speech (4) negativism
6. () 一般而言，下列那種症狀不會出現於非精神病患者 (1) anxiety (2) depression (3) delusion (4) panic
7. () 下列有關躁鬱病的問題那一個是錯的 (1) 常會再發病 (2) 常有週期性症狀變化 (3) 第一次發病症狀都是躁症 (4) 兩次發病之間常是毫無症狀
8. () 下列那一個不是躁症的主要症狀 (1) 新語症(neologism) (2) grandiosity (3) distractibility (4) hyperactivity
9. () 下列有關憂鬱症的描述，何者為錯 (1) 常有失眠 (2) 可有胃口增加現象 (3) 不出現精神病症狀 (4) 常見體重減輕
10. () 下列症狀中在躁病(mania)時那一個較少出現 (1) 誇大(grandiosity) (2) 拒絕症(negativism) (3) 注意力分散(distractibility) (4) pressure of speech
11. () 關於 Mental Retardation 何者為非？ (1) 個別標準化智力測驗 IQ 70 以下 (2) mild MR，經教育可有獨立生活 (3) moderate MR，經訓練可在庇護環境下工作 (4) severe MR，就學後仍無語言能力 (5) profound MR，一般生活自理仍須人協助
12. () 關於 Autistic Disorder 何者為非？ (1) 又稱 Kanner's autism (2) qualitative impairment in social interaction (3) qualitative impairment in communication (4) restricted repetitive and stereotyped pattern of behavior, interests and activities (5) onset after school entrancing
13. () Asperger's Disorder 與 Autistic Disorder 最大的不同在於前者 (1) No qualitative impairment in social interaction (2) No significant delay in language (3) No restricted repetitive and stereotyped pattern of behavior, interests and activities (4) No function impairment (5) No motor delay or clumsiness
14. () 以下之兒童精神疾病多於學齡前開始發生，何者除外？ (1) Attachment disorder (2) Separation anxiety (3) Selective mutism (4) Enuresis (5) suicide and deliberate self-harm
15. () Lewy 等人在美國心理健康機構的贊助下，證明高強度與低強度的光線都會提高血液中 (1) 血清素(serotonin) 的含量，(2) 多巴胺(dopamine) 的含量，(3) 正腎上腺素(norepinephrine) 的含量，進而証實 light therapy 對輕、中度 major depressive disorder 的療效。
16. () From the epidemiological data (Hibbeln HR, Lancet 1998; 351), societies consuming large amounts of fish, which contain more omega-3 fatty acids, the rate of major depression appear to be (1) higher (2) lower (3) no different

Choose the correct definition(配合題):

- (1) Impairments (2) Disabilities (3) Handicap
17. () The disadvantage experienced by an individual with disease that limits or prevents the fulfillment of normal roles, such as worker, student, friend, citizen, and family member
18. () The characteristic positive and negative symptoms and associated cognitive and affective abnormalities of disorders such as schizophrenia, autistic disorder, and bipolar disorder.
19. () 下列關於精神分裂症的預後，何者的敘述是錯誤的？ (1) 大約二分之一的病患一直進行至痴呆狀態 (2) 大約四分之一至三分之一會好轉緩解 (3) 大約三分之一會呈現輕度症狀 (4) 大約三分之二會呈現慢性缺陷狀態
20. () 下列何者已經不用於治療精神分裂症？ (1) Dopamine D2 receptor antagonist. (2) Insulin shock therapy. (3) Group psychotherapy. (4) Behavioral therapy.
21. () 關於精神分裂症的臨床特徵，下列何者的敘述是不正確的？ (1) 所有在精神分裂症出現的症狀，都可以在其他的精神病看到。 (2) 精神分裂症的臨床症狀會隨著臨床病程的進行而改變。 (3) 觀察精神分裂症的症狀的時候，不需要考慮病患的教育程度、智能、宗教、文化的背景。 (4) 思考障礙與聽幻覺是精神分裂症患者經常出現的症狀。

私立臺北醫學院 八十 學年度第 二 學期 期中 考試 命 題紙
 期末考試(試)

系 級	科 目	授 課 教 師	考 試 日 期	學 號	姓 名
五	精神科	陳初鈞	10年6月19日第3節		

※①請注意本試題共2張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

22. () 下列何者不是 Eugen Bleuler 所稱的精神分裂症的 4A 症狀？(1)思考連結鬆散(loosening of association)。(2)情感鈍化(affect blunted)。(3)自閉 autism)。(4)不合群(associativity)。
23. () 下列何者不是人格違常疾患的症狀？(1) autoplasic (2) ego-syntonic (3)without remorse to maladaptive behaviors (4) lack of motivation for help
24. () 從精神動力學來說，臨床表現最接近精神官能症的人格違常，是下列那一種診斷？(1) antisocial personality disorder (2) schizoid personality disorder (3) paranoid personality disorder (4) avoidant personality disorder
25. () 精神病理學上所稱 Othello 症候群是指下列那一種妄想症？(1) 嫉妒型妄想症(Jealousy type) (2) 誇大型妄想症(Grandiose type) (3) 被害型妄想症(Persecutory type) (4) 多情型妄想症(Erotomanic type)
26. () Psychosis 與 Neurosis 的敘述何者錯誤？(1)neurosis 的社會功能也會受損(2)neurosis 的現實感也就是情緒，行為，思考與周遭的環境能夠整合(3)有些 psychosis 可以完全回復病前人格與功能(4)主要差別為是否有幻覺
27. () 何種睡眠問題不會出現在 Anxiety disorders 的病患(1)decreasing sleep need (2)dreamy sleep (3)initial insomnia (4) 以上皆會
28. () 某人年幼時失去父親(early parental loss)，以致當發生 921 大地震喪失好友，此無法彌補的損失導致其出現嚴重的 PTSD，請問 early parental loss 在此個案的病因學上是屬(1)前置(predisposing)因素 (2)促進(precipitating)因素(3)維持(perpetuating)因素(4)以上皆非
29. () 面對主訴 functional somatic syndrome 的病人，首先必須(1)排除可能的生理因素(2)開立交感神經鬆弛劑(3)轉介精神科(4)明確告知因環境壓力有關
30. () 下列何種輕型精神疾病(minor psychiatric disorders)最容易被送至急診求治(1)conversion disorder. (2)dissoicative disorder.(3) panic disorder (4) phobia
31. () 有關「神經衰弱症」的敘述何者錯誤？(1)可能包括因慢性病毒感染引起者(2)以 chronic and disabled fatigue 為主要症狀(3)在國際疾病分類系統 (ICD-10) 有此診斷(4)要考慮與長期睡眠障礙的關聯
32. () 有關睡眠障礙何者敘述正確(1)建立良好睡眠週期一定要準時躺床(2)早睡早起身體好是重要的衛生法則(3) initial insomnia 者，可先看電視到累才上床(4) initial insomnia 的病患，最好不要在床上睡午覺
33. () 下列何種狀況可以進行 Liason-psychiatry，精神科醫師不需直接會診病患(1)器官移植(2)可能有醫療糾紛時(3)病患有不合理要求(4)安寧病房之末期病患(5)以上皆是
34. () (填充)評估自殺危險性，依危險度由低而高，列出評估的順序(A)today? now? (B) suicide idea (C) timing/ situation (D) suicide plan
35. () 對於自殺的敘述何者為誤？(1)無望感是自殺的主要心理因素，因此美國 ECA 研究發現憂鬱症是自殺最高危險群邀(2)有過以立即致死方法自殺企圖者，是高危險群(3)務必讓自殺者當家人的面承諾不自殺(4)終身自殺危險無法預防
36. () 據報載，一位精神分裂症患者，目前處於急性期（有明顯之被害妄想），進而認為其鄰居加害自己，因此出手攻擊鄰居，請問作為一位精神科專科醫師，我們可以對其家人有何建議：(1)應立即趕到病人家中現場，並親自強制病患住院。(2)建議其父親尋求當地警政或消防人員協助病患就醫，經診視後決定其(病患)是否符合強制住院之要件，再決定是否強制其住院。(3)精神科專科醫師並不負社會安全之責，無須理會家屬任何要求。(4)聯絡當地警察，命令警察單位協助病患就醫。(5)以上皆可。
37. () 我國目前對於妨害性自主罪的相關規定，以下何者為是？(1)被害人可以包括男女性，非僅限於女性。(2)即使近親之間妨害性自主罪，或是配偶間妨害性自主罪，或是犯案者年齡較輕，一但犯案，都屬於非告訴乃論(公訴)。(3)妨害性自主，基本上使限於生殖器與生殖器接觸為限，口交、肛交不在規範內。(4)所有加害人都需強制至醫院接受治療。(5)以上皆對。
38. () 有關 MDMA 的敘述何者為錯？(1)屬於一種幻覺劑(2)藥理作用可以改善人際關係 3 俗稱強姦丸(4)化學結構式與安非他命相像(5)過量使用會導致腦傷與虛脫
39. () 有關成癮疾患的敘述何者為錯？(1)成癮疾患就好像傳染病一般會具有傳染性(2) 成癮疾患的成因與人格、社會、心理及家庭有關(3)成癮疾患的診斷與治療需要專業人員的介入(4)使用成癮

私立臺北醫學院八十九學年度第二學期期中考試(試)題紙

系級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
五	精神科	黃哲弘	90年6月18日第3節		

※①請注意本試題共3張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

物質是一種犯罪的行為(5)司法體系是最後一道的防線

40. () 下列何者非為成癮物質流行之原因？(1) 容易取得(2) 法律管制(3) 價格便宜(4) 攜帶方便(5) 爽度足夠
 41. () 有關憂鬱症的敘述何者錯誤 (1) 主要關鍵的 neurotransmitter 為 Serotonin (2) 只要能減少 monoamine 的藥就有抗憂鬱效果 (3) Norepinephrine 也可能與憂鬱的機制有關 (4) 最先發明的抗憂鬱劑為 Prozac 屬 selective serotonin reuptake inhibitor
 42. () Amphetamine 會惡化精神分裂的症狀或產生類似精神分裂之聽幻覺或妄想乃因為 (1) amphetamine 會抑制 dopamine reuptake (2) 阻斷 postsynaptic dopamine receptor(3)使 Dopamine 量增加 (4) 延長 Dopamine 作用時間

臨床題組

67 歲寡居女性，因拒絕進食，無法入睡，身體虛弱而由家人送至急診就醫。

病人很少就醫，但喜歡服食成藥，除年輕時就重聽外，無內外科重大疾病史。據家人描述，病人性格外向積極，目前獨居長子一家樓上，生活可自理。平時熱衷宗教活動，會自己搭車到處探視朋友。病人從未有任何精神科就醫紀錄，家人亦否認其承受任何社會心理壓力。

就醫前一週曾抱怨解尿困難、灼熱等症狀，並輕微發燒，自行服用成藥。就醫兩天前開始活動力降低、話少、夜眼差。就醫當晚向家人抱怨身上爬滿蜘蛛、蜈蚣等小昆蟲，神情渙散而被送往急診就醫。

病人於急診之生命跡象，脈搏每分鐘 120 下、耳溫攝氏 39.2 度、呼吸每分鐘 25 次、血壓 170/94 毫米汞柱。基本血液及生化檢查結果，除白血球上升(13500/uL)及血糖略低(60mg/dL)外，餘皆正常。於此情形下照會精神科醫師。

43. () 病史中，何者較不可能是導致此現象的危險因子(1)年齡 (2) 性別 (3)服藥習慣 (4) 重聽 (5) 以上皆是危險因子
 44. () 在急診進行精神狀態檢查，何者較不具鑑別診斷效力 (1)意識狀態 (2)注意力 (3)對時間的定向感 (4)情緒狀態 (5)睡眠週期變化
 45. () 經檢查後發現病人記憶力明顯受損。於此類病人，你預期以下哪一方面的記憶受損發生最快，也最明顯(1) 長期記憶(2) 短期記憶(3) 一般常識記憶(4)早年生活記憶 (5)沒有一定
 46. () 比較可能的 精神科診斷 是 (1) 癡呆症合併精神症狀 (2)老年憂鬱症 (3)譖妄症 (4)晚發型精神分裂症(5)適應障礙症

簡答題

47. 若不以 DSM 系統的診斷準則為依據，如何簡單區分某人的精神狀態(例如情緒、行為或思考)「可能」已經達到「精神疾病, Psychiatric Disorder」程度？(本題 4 分，超過 30 字則逐步扣分)

48. 某肺癌末期個案，已出現胸痛、呼吸窘迫、入睡困難等症狀，請問你要如何給他「適當」的希望？(本題 2 分，超過 30 字則逐步扣分)

49. 某病患因有心臟病家族史，以致過度擔心罹患「心肌梗塞」(MI, myocardial infarction)，經重複進行精密檢查仍無證據顯示有 MI 的跡象，若你是心臟科權威醫師，個案接受你的心導管檢查後亦顯示正常，請問如何告知檢查結果，可以較能降低此個案對於心肌梗塞的焦慮？(本題 2 分，超過 30 字則逐步扣分)