

1032

私立臺北醫學院 1032 學年度第 一 學期 期中 考試 (命) 題紙
期末 考試 (試)

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
醫	精神醫學	張	90年1月9日第7-8節		

※①請注意本試題共 3 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

教務處
公佈專用

單選題(兩分)

- () 1. 預防躁鬱病再復發最有效的藥物是(1)chlorpromazine (2) lithium (3) valium (4) haloperidol
- () 2. E.C.T. 最常見的 complication 是(1)disorientation (2) memory impairment (3) hypotension (4) drowsiness
- () 3. 下面那一項是以 chlorpromazine 治療時較少出現的副作用(1) agranulocytosis (2) E.P.S. (3) hypotension (4) constipation
- () 4. 目前較安全的安眠藥多屬於(1) phenothiazine (2) benzodiazepine (3) barbiturate (4) tricyclic antidepressant
- () 5. Neurosis 與 Psychosis 主要的差異為(1)功能退化與否(2)慢性化與否(3)自殺危險度(4)發病時現實感是否完好
- () 6. 病人自己覺不需要的動作，但仍一再重複的強迫自己去做是(1) manerism (2) stereotype (3) hyperactivity (4) compulsive behavior
- () 7. 病人沒有真正器官上的疾病，但仍過份的關心自己的健康，擔心自己患有某嚴重的疾患稱為(1) obsessive thinking (2) agitation(3) circumstantiality (4) hypochondria
- () 8. 以為自己的思考內容雖未對別人訴說，但外人多知曉自己想的內容，可能是那一精神症狀(1) thought broadcasting (2) auditory hallucination (3) thought withdrawal (4) perseveration
- () 9. 躁症病人在下列症狀中那一個症狀較少出現(1) pressure of speech (2) grandiosity (3) euphoria (4) hallucination
- () 10. 下列有關躁鬱病的問題那一個是錯的 (1) 常會再發病 (2) 常有週期性症狀變化(3) 第一次發病症狀都是躁症(4) 兩次發病之間常是毫無症狀
- () 11. 下列有關憂鬱症的描述，何者是錯的常有失眠 (2) 可有胃口增加現象 (3) 不出現精神病症狀 (4) 常見體重減輕
- () 12. 下列關於精神分裂症的預後，何者的敘述是錯誤的？ (1) 一半以上的病患一直進行至痴呆狀態。(2) 大約四分之一至三分之一會好轉緩解。(3) 大約三分之一會呈現輕度症狀。(4) 大約三分之一會呈現慢性缺陷狀態。
- () 13. 下列何者是精神分裂症最受重視的生物學假說？(1) 腦內的血清素(serotonin)活性太低。(2) 腦內的多巴胺(dopamine)的活性太高。(3) 腦內的麩胺酸(glutamate)的活性太高。(4) 腦內的乙醯膽鹼(acetylcholine)的活性太低。
- () 14. 關於精神分裂症的臨床特徵，下列何者的敘述是不正確的？(1) 所有在精神分裂症出現的症狀，都可以在其他的精神病看到。(2) 精神分裂症的臨床症狀會隨著臨床病程的進行而改變。(3) 觀察精神分裂症的症狀的時候，不需要考慮病患的教育程度、智能、宗教、文化的背景。(4) 思考障礙與聽幻覺是精神分裂症患者經常出現的症狀。
- () 15. 下列何者不是精神分裂症主要的思考障礙？(1) 思考被廣播(thought broadcasting)。(2) 思考化聲(audible thoughts)。(3) 思考被插入(thought insertion)。(4) 思考阻斷(thought blocking)。
- () 16. 下列那一種人格達常的診斷工具，必須要以一對一，面對被訪者的會談方式進行？(1) Tridimensional Personality Questionnaire.(2) Maudsley Personality Inventory. (3) 柯氏性格量表。(4) Structured Interview for DSM-III-R Personality Disorders.
- () 17. 下列何者不是人格達常疾患的症狀？(1) autoplasic (2) ego-syntonic (3) without remorse to maladaptive behaviors (4) lack of motivation for help
- () 18. DSM-IV 人格疾患分類與精神疾病的關係，何者為誤：(1) cluster A -delusional disorder (2) cluster C (e.g. obsessive-compulsive personality disorder—anxiety disorders (3) cluster B (e.g. histrionic personality)—suicide (4) antisocial personality disorder—major depression
- () 19. 下列何者成癮物質在歷史上從未曾被法律禁止過？(1) 煙草 (2) 酒精(3) 檳榔(4) 鴉片(5) 大麻
- () 20. 有關成癮治療，下列何者藥物屬於嫌惡劑？ (1) Naltrexone (2) Disulfiram (3) Methadone (4) Haloperidol (5) Buprenorphine
- () 21. 有關 MDMA 的敘述何者為錯？(1) 屬於一種幻覺劑(2) 藥理作用可以改善人際關係(3) 過量使用會導致腦傷與虛脫(4) 化學結構式與甲基安非他命相像(5) 俗稱強姦丸

10137-2

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
醫	精神科	郭	90年1月9日第7-8節		

※①請注意本試題共 3 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

教務處公佈專用

- () 22.我國青少年最常濫用之非法藥物為：(1) 海洛因(2) 安非他命(3) 大麻(4) 強力膠(5) 古柯鹼
- () 23. Flu-like symptoms (fatigue, lethargy, myalgia, chills) are most often associated in the following clinical situations: (1) serotonin syndrome during the drug interaction of MAOIs and SSRIs (2) SSRI initial side effects (3) SSRI discontinuation symptoms (4) all of the above
- () 24. 下列何者並非 SSRI 引起的常見副作用(1) nausea/ vomiting (2) loss of libido (3) tremor (4) insomnia
- () 25. 下列何者並非 "atypical antipsychotics" 比 typical antipsychotics 較好之處：(1). causes prolactinemia after the use of six months,(2). does not (or is not likely to) produce extrapyramidal symptoms in clinical doses,(3).has the therapeutic effects in treating negative symptoms of schizophrenia (4)owns antidepressant or antimanic therapeutic effects
- () 26. antipsychotics 導致 prolactinemia 以及 extrapyramidal symptoms: 乃主要與何者有關(1)Dopamine D1 occupancy,(2).Dopamine D2 occupancy (3). Serotonin S1 occupancy (4). Serotonin S2 occupancy

以下四題，為同一題組，請注意

75 歲已婚男性病患向來沒有精神科就醫紀錄，就醫前兩天出現坐立不安、心情急躁等非特定症狀，並且於就醫當晚突然攻擊家人，而被送往急診就醫。據家人描述，病患前性格溫和，近兩年開始時常抱怨記憶力減退，曾有兩次出門後找不到路回家。除此之外並未有任何行為問題，亦從未出現攻擊行為。除慢性阻塞性肺病、前列腺肥大外，無其他內外科病史。於急診之生命跡象，脈搏每分鐘 120 下、耳溫攝氏 39.2 度、呼吸每分鐘 25 次、血壓 170/94 毫米汞柱。基本血液及生化檢查結果，除白血球上升(13500/uL)外，餘皆正常。於此情形下照會精神科醫師。

- ◆ () 27. 於急診進行病史蒐集及精神狀態檢查，下列何者對鑑別診斷幫助較小?(1)意識狀態及注意力 (2)疾病歷程及變化 (3)短期記憶能力 (4)妄想及幻覺內容(5)睡眠週期變化
- () 28 經檢查後發現病患定向感明顯受損。於此類病患，你預期以下哪一種定向感受損發生最快，也最明顯?(1)地點(2)人物 (3)時間(4)自我(5)沒有一定
- () 29. 病患於急診仍持續有行為干擾，考慮投予藥物治療，較好的選擇是 (1)高效價抗精神藥物(antipsychotics) (2)巴比妥鹽類鎮靜劑(barbiturates) (3)苯二氮平類鎮靜劑(benzodiazapine)(4)抗組織胺類鎮靜藥物(antihistamine) (5)情緒穩定劑(mood stabilizers)
- () 30. 比較可能的精神科診斷是(1)癡呆症合併精神症狀(2)老年憂鬱症(3)晚發型精神分裂症(4)譫妄症(5)老年躁鬱症
- () 31. 開啟生物精神醫學的基礎乃至於締造 2000 年諾貝爾醫學獎的得主，主因於(1) Lithium 發現可用來治療躁鬱症(2)精神分析術發明 (3) Chlorpromazine 發現可以治療精神分裂症(4)美國之"去機構化運動"
- () 32. 非精神科醫師最常面對之精神疾病(psychiatric disorders), 下列何者為非(1) 精神分裂症(2).精神官能症 (3).器質性精神症候群(organic mental syndrome) (4).物質濫用
- () 33. 當某一糖尿病病患因藥物副作用，而不願定期服藥，當你加以更改處方之後，病患詢問："有何副作用?"，請問你將如何應對較好(1).一再保證無副作用(2)先詢問病患最擔心何種副作用(3).詳細告知相關之副作用，但最後強調不用擔心那麼多(4).告知病患糖尿病惡化的後果
- () 34. 告知病患罹患第二期癌症時，你認為下列哪種說法，較能減少病患焦慮並給予希望?(1).沒有關係，我有好幾個病患還活著(2).還好及早發現，只要適當治療仍有 X%有 Y 年以上存活率(3).你最怕以後會如何?不用擔心包在我身上(4).這種癌症經過適當治療絕對可以根除

10139-3

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
醫大	精神學	張	90年1月9日第1-8節		

※①請注意本試題共 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

教務處公佈專用

- () 35. 評估自殺危險，只能評估立即自殺危險，因此評估危險度由高而低依序為何 1. suicide plan/methods; 2. suicide timing 3. suicide idea; 4. now/today(最近或今天)會發生嗎(A) 325 (B) 3142 (C) 4312 (D) 3124.
- () 36. 有關「神經衰弱症」的敘述何者錯誤？(1)在國際疾病分類系統 (ICD-10) 有神經衰弱症(neurasthenic disorder) 此診斷(2)以 chronic fatigue 為主要症狀(3)可由病毒感染引起(4)華人地區睡眠障礙或身體化症者常自認罹患此疾
- () 37. 下列為自閉症之核心症狀，除了(1)精神病症狀(2)語言障礙(3)人際關係障礙(4)情緒表達異常
- () 38. 因身心症狀而常自行就診的科別，下列各種配對何者不正確(A) generalized anxiety disorder - 心臟科 (B) panic disorder - 急診 (C) body dysmorphic disorder - 整形外科 (D) somatoform disorder - 精神科
- () 39. 開刀前病人的狀態，那一項是預後良好的預兆(1)顯著憂鬱症(2)顯著的恐懼感(3)相當程度的焦慮和不安(4)完全無焦慮(5)高年人
- () 40. 外科醫師在開刀前遇到病人有顯著的憂鬱症狀時，他應該(1)馬上進行開刀以期憂鬱症狀的消失(2)終止開刀而等症狀消失後才開刀(3)馬上照會精神科醫師會診以商討處理(4)自動給予抗鬱劑而觀察幾天後進行開刀
- () 41. 有關睡眠障礙何者敘述正確 (1) 建立良好睡眠週期一定要準時躺床 (2) terminal insomnia 以抗焦慮劑最優先考慮使用 (3) dreamy sleep 應與焦慮有關；睡前玩電腦遊戲到疲累，有助睡眠 (4) initial insomnia 的病患，也要考慮可能與身體不適有關
- () 42. 某人於地震住屋全倒之後，出現持續一年的頭暈、心悸、腹痛，卻只擔心其身體症狀而否認與壓力有關。此種病患的處置原則(選錯誤)(1)詢問其最擔心的疾病，若檢查正常則確定的告知「排除」該疾病的可能 (2) 若許多檢查皆正常者，應暫時停止檢查先治療其最難過的症狀 (3) 從未就醫者，必須考慮查出可能的身體疾病 (4) 雖已確定無生理疾病，若此次檢驗可以令其完全放心，也可安排檢查(5)先不處置，直接安排轉介精神科
- () 43. 關於兒童精神疾病的好發期以及好發性別，何者為非(1)自閉症通常於嬰幼兒期即可被診斷(2)過動症通常於孩童期即可被診斷(3)女性特殊發展疾患多(學習或語言障礙)，男性情緒障礙多(4)藥物濫用於青少年期後好發
- () 44. 關於刑法中對於精神障礙的相關規定，下列何者為是？(1)心神喪失人之行為，得減輕其刑 (2) 精神耗弱人之行為，不罰。(3) 心神喪失人之行為，不罰 (4) 精神喪失人之行為，得減輕其刑 (5) 以上皆非。
- () 45. 刑事案件之司法精神鑑定，有那些情形部分？(1)刑事案件被告犯案當時之精神狀態 (有無責任能力) (2) 訴訟過程中被告之精神狀態 (有無訴訟能力) (3) 鑑定證人之精神狀態 (有無證言能力) (4) 鑑定被害人之精神狀態 (此關係著犯罪事實之認定及構成要件)。(5) 以上皆對
- () 46. Cognitive therapy has been applied mainly to (1). depression (2). obsessive-compulsive disorder (3) paranoid personality disorder (4) panic attacks (5). somatoform disorder
- () 47. A patient with a fear of heights is brought to the top of a tall building and required to remain there as long as necessary for the anxiety to dissipate. This is an example of (1) graded exposure (2) participant modeling (3) aversion therapy (4) systematic desensitization (5) flooding
- () 48. The fundamental rule of psychoanalysis is (1). psychic determinism (2) abreaction (3). free association (4) the concept of the unconscious (5) resistance and repression
- () 49. Supportive psychotherapy uses such techniques as (1). strong leadership (2) a warm and friendly atmosphere (3) gratification of dependency needs (4) support in development of legitimate independence (5). all the above

問答題：請說明(50個字以內)：如何界定一個人的「精神狀態或行為」已經可達到屬於某精神疾患(psychiatric disorder)