

臺北醫學大學九十二學年度第一學期 期中考試 (試) 題紙

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
護三	內外科護理學	魏怡玲	93年1月13日第3節		

※①請注意本試題共 6 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

一、選擇題(每題 1.5 分, 72%):

1. 下列敘述何者為是?

- (A) Brain Death=reversible coma
- (B) Glasgow Coma Scale > 7=Coma
- (C) Persistent Vegetative States= damage of reticular activating system
- (D) Consciousness=Aware+Awake

2. 常用於心臟移植術後抑制排斥作用之藥物，主要干擾核酸之合成為

- (A) Prednisolone
- (B) Sandimmun neural
- (C) Cyclosporin A
- (D) Imuran

3. 何者為照顧一位腎臟器官捐贈者之合宜護理措施?

- (A) 移植的器官取出宜加溫保持血液循環
- (B) 腎臟可保存 72 小時後再植入
- (C) 維持足夠尿流量以 1cc/kg/hr 原則
- (D) 如體溫過高則降溫後即需立即取出臟器

4. 伍老先生為心臟移植後之病患，下列哪項衛教內容為非?

- (A) 嚴禁出入公共場所，以避免與上呼吸道感染之病者接觸
- (B) 漸進式恢復正常活動且定期追蹤，以恢復心臟機能
- (C) 穿著彈性襪，以預防血栓靜脈炎發生
- (D) 加強胸腔物理治療，以預防肺之塌陷

5. The most common post-surgical complications with organ transplantation are:

- (A) Bleeding & Hematuria
- (B) Rejection & Infection
- (C) Allergy & Organ failure
- (D) Fluid retention & Pain

6. 下列關於器官移植之敘述，何者為是?

- (A) 當病患心跳停止、呼吸停止及瞳孔放大即可由神經科醫師宣判腦死而進行器官移植
- (B) 所有身體的器官皆可移植至所需者身上，以獲「重生」
- (C) 捐/受贈者的 Rh、ABO 血型、MHC 相容性決定移植成功率
- (D) 複製人發展可做為未來器官移植的最佳選擇方式

7. 當陳先生由火場被救出時，臉及鼻、唇部皆有灼傷，此時，下列何種器官可能也受傷?

- (A) 食道
- (B) 胃
- (C) 肺
- (D) 以上皆是

8. 陳老太太不甚燙傷前胸及雙手，局部皮膚發紅且有水泡，此外，陳老太太亦罹患糖尿病，現以口服藥物控制血糖。下列何種措施較適合陳老太太目前的情況?

- (A) 住進加護中心治療
- (B) 住在一般病房接受治療
- (C) 在急診室處理好，即可門診繼續治療
- (D) 先掛新陳代謝科，確定血糖是否已控制好再做定奪

9. 對於大面積燒傷患者的初期治療，護理人員最大的責任是要確定患者有足夠的液體補充，下列哪些變數最能作為判斷依據?

- (A) 血壓、脈搏及每天的體重
- (B) 血色素及血球沉降率
- (C) CVP 值、尿量、尿比重及電解質
- (D) 體溫及傷口滲液流失量

情況題：陳先生 30 歲 64 公斤，因瓦斯氣爆致身上前胸、右手全部(包含背面及腹面)有二至三度的燒傷，試回答 10-12 題

臺北醫學大學九十二學年度第一學期 **期中** 考試 **(試)** 題紙

系 級	科 目	授 課 教 師	考 試 日 期	學 號	姓 名
護三	內外科護理學	魏 玲 玲	93年1月13日第3節		

※①請注意本試題共 6 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

10. 請根據九分法則估算陳先生的燒傷面積大約為多少？  
 (A) 18%      (B) 27%      (C) 36%      (D) 45%
11. 根據 Baxter formula，請選出燒傷後前 8 小時適用的輸液種類？  
 (A) 0.9% Normal Saline      (B) 0.45% Saline  
 (C) D10W      (D) Lactated Ringer's solution
12. 在前八小時需給予陳先生多少的輸液量？  
 (A) 2880 cc      (B) 3456 cc      (C) 4608 cc      (D) 6912 cc
13. 下列有關 Tamoxifen 的描述，何者錯誤？  
 (A) 為乳癌的荷爾蒙治療藥物      (B) 服用劑量為 20mg/day  
 (C) 可抑制動情激素的分泌      (D) 需服用 2-5 年
14. 下列有關 Herceptin 的描述，何者正確？  
 (A) 為乳癌的荷爾蒙治療藥物      (B) 為乳癌的免疫抗體治療藥物  
 (C) 為乳癌的化學治療藥物      (D) 為乳癌的放射線治療製劑
15. 下列有關乳癌放射線治療副作用的描述，何者錯誤？  
 (A) 喉嚨乾澀      (B) 肺底部炎症      (C) 皮膚變化      (D) 腹瀉
16. 下列有關右側結腸癌症狀的描述，何者正確？  
 (A) 厭食      (B) 直腸出血      (C) 大便習慣改變      (D) 裡急後重
17. 接受下列何種結腸手術後的病人，會有永久性人工肛門？  
 (A) Hemicolectomy with anastomosis  
 (B) Low anterior resection (LAR)  
 (C) Abdominal-perineal resection (APR)  
 (D) Pull through
18. 下列有關結腸造瘻灌腸沖洗 (結腸訓練) 的描述，何者錯誤？  
 (A) 適用於降結腸癌的造瘻      (B) 需配合作息時間  
 (C) 灌腸時若有腹痛，宜減速或暫停      (D) 需終身每天定時灌腸
19. 下列有關 Cholelithiasis 症狀的描述，何者錯誤？  
 (A) epigastric pain on RUQ and radiate to right subscapular area  
 (B) anorexia, nausea or vomiting  
 (C) jaundice  
 (D) clay urine or dark stool
20. 下列有關腹腔鏡式膽囊切除術的描述，何者錯誤？  
 (A) 屬於一種 Video surgery，視野清楚  
 (B) 病人腹部會有四個 1~2 公分的小傷口，比傳統的手術方式傷口小  
 (C) 病人手術後腹脹是因為手術時在腹腔中打入 O<sub>2</sub> 避免腹腔沾連膽囊所致  
 (D) 病人住院日數比傳統手術方式的住院日數短
21. 下列有關 T Tube 的描述，何者錯誤？  
 (A) 接受 Cholecystectomy 手術的病人身上會有 T Tube  
 (B) T Tube 引流膽汁，術後第 2、3 天少於 200C.C.  
 (C) T Tube 至少會放置 7~10 天  
 (D) T Tube 拔除前會安排 Cholangiography，以確定膽道內傷口水腫已消失

系 級	科 目	授 課 教 師	考 試 日 期	學 號	姓 名
護三	內外科護理學	魏玲玲	93年1月13日第3節		

※①請注意本試題共 6 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

22. 下列有關膽囊結石的膽囊切除術術教內容之描述，何者錯誤？  
 (A) 等排氣後才可進食 (B) 常翻身及下床走動可促進排氣  
 (C) 需採低油、低膽固醇飲食 (D) 終身需要上述飲食限制
23. 下列有關 Pancreatitis 臨床徵象的描述，何者錯誤？  
 (A) 葡萄糖耐受度降低 (B) 高血鈣 (C) 腹膜炎 (D) 麻痺性腸阻塞
24. 下列有關 Whipple 手術的描述，何者錯誤？  
 (A) 適用於胰臟癌。  
 (B) 胃、膽管、胰臟分別與空腸吻合，術後需監測是否滲漏  
 (C) 術後會放置 T Tube  
 (D) 術後不需預防 Dumping Syndrome
25. 骨癒合分期的順序，何者正確？  
 ①Cellular proliferation ②Ossification ③Hematoma formation ④Cellus formation  
 (A) ①→②→③→④ (B) ②→③→④→①  
 (C) ③→①→④→② (D) ④→①→②→③
26. 施行簽引的原則，何者正確？  
 ①病人必須平躺，採功能性位置 ②牽引力需儘量呈一直線  
 ③不需有反牽引力 ④牽引裝備不能有磨擦情形出現  
 (A) ①+②+④ (B) ①+②+③ (C) ①+③+④ (D) ②+③+④
27. 下列何者為骨折可能出現的合併症？  
 ①脫水 ②氣性壞疽 ③間室症候群(compartment syndrome) ④肺栓塞  
 (A) ①+②+④ (B) ①+②+③ (C) ①+③+④ (D) ②+③+④
28. 下列何種石膏最可能出現 Cast syndrome？  
 (A) 長臂石膏 (B) 體石膏 (C) 拇指人字形石膏 (D) 短腿石膏
29. 六十歲的丁先生因左髖關節缺血性壞死(AVN of left hip)於今天施行 THR，手術返回病房。  
 請問術後應給丁先生那些護理措施？  
 ①密切測量 vital signs，以防寒顫、血壓下降及出血  
 ②給予熱敷傷口及止痛劑以減輕疼痛  
 ③患肢外展 15~20°，髖關節屈曲夾角不可 < 90°，以防關節脫臼  
 ④預防傷口感染  
 (A) ①+②+④ (B) ①+②+③ (C) ①+③+④ (D) ②+③+④
30. 二十歲的王小姐因左踝關節軟組織創傷，關節腫脹厲害，由急診收入病房。如果您是她的主護  
 護士，您會給予那些護理措施？  
 ①Elevate the left leg ②Apply ice to left ankle  
 ③Exercise the injured extremity ④Maintain a compression  
 (A) ①+②+④ (B) ①+②+③ (C) ①+③+④ (D) ②+③+④
31. 下列何者不是美國糖尿病協會 (ADA) 在 1997 年公告之 DM 診斷標準？  
 (A) 有三多症狀及隨機 B.S. ≥ 200 mg/dl (B) 空腹 8 小時後之 B.S. ≥ 126 mg/dl  
 (C) OGTT 之 2 小時 B.S. ≥ 200 mg/dl (D) HbA<sub>1c</sub> > 8%
32. 下列口服降血糖藥物中，那些可刺激胰臟分泌 insulin？  
 ①Amaryl ②Euglucon ③Novonorm ④Glucophage ⑤Glucobay  
 (A) ①+②+③ (B) ①+③+⑤ (C) ②+④+⑤ (D) ②+③+④

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
護三	內外科護理學	魏玲玲	93年1月13日第3節		

\*①請注意本試題共 6 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

33. 有關預防 Diabetic foot 之護理指導，何者最正確？  
 (A) 因腳掌出汗少皮膚易裂開，可在腳趾間擦乳液潤膚  
 (B) 視力變差時可請家人用指甲剪修剪腳趾甲與腳趾頭平齊  
 (C) 夏天鼓勵病患穿夾腳涼鞋保持通風  
 (D) 冬天腳冷可浸泡溫水或使用熱敷墊保暖
34. 有關 DKA 之敘述，何者最正確？  
 (A) Type 2 DM 病患中斷注射 Insulin 治療是其誘因之一  
 (B) 檢驗值會出現：B.S. > 600 mg/dl、pH < 7.3 & HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> < 15 mEq/L  
 (C) 應立刻由靜脈注射 NPH 20 Unit，以阻止酮體生成  
 (D) 治療過程中如 B.S. 降至 250 mg/dl 時，點滴應改為 10% G/W 合併 insulin 滴注
35. 有關 ARF 之敘述，何者不正確？  
 (A) Prerenal failure 的腎實質並未受損害，但腎血流量有減少  
 (B) 病患接受 Chest CT 檢查時，注射顯影劑可導致 ARF  
 (C) ARF 病患尿液之 sp. gr 與血漿相同，固定 > 1.010  
 (D) ARF 病患的 Oliguria period 是指一天的尿量 < 400ml
36. 有關 ESRD (或 Uremia) 臨床表徵之敘述，何者不正確？  
 (A) 電解質不平衡有 Hypocalcemia 及 Hypokalemia  
 (B) 由於 BUN 堆積會造成小腿感覺異常、有刺痛感  
 (C) 90% 病患因 Erythropoietin 製造減少而導致 Anemia  
 (D) 為矯正低血鈣、高血磷情況，病患 PTH 之分泌會增加
37. 有關 ESRD 保守療法的敘述，何者最正確？  
 (A) 病患在兩次透析間體重之增加，以不超過 dry weight 3% 為宜  
 (B) 為減輕水腫應限制鹽份攝取，可鼓勵病患改用無鹽醬油  
 (C) 教導家屬烹調蔬菜及肉類時，應將湯汁倒掉不食用  
 (D) 每天至少攝取蛋白質 40gm，1/3~1/2 要來自植物性蛋白質
38. 有關透析治療原理的敘述，何者最正確？  
 (A) 擴散作用 (diffusion) 可使水分子由濃度低的地方經過半透膜流向濃度高的地方  
 (B) 超過濾 (ultrafiltration) 的驅動力來自膜上壓，血液側產生負壓，而透析液產生正壓  
 (C) 血液透析用的透析液不需無菌，其比例為逆滲透水：透析液 = 1：34  
 (D) 腹膜透析液中葡萄糖的濃度愈高、體積愈大透析效果愈好
39. 下列那些因素會誘使 Liver cirrhosis 病患發生 Hepatic encephalopathy？  
 ①便秘 ②腸胃道出血 ③高血鉀 ④代謝性酸中毒 ⑤鎮靜劑  
 (A) ①+②+③ (B) ③+④+⑤ (C) ①+②+⑤ (D) ②+③+④
40. 何者不是 Hepatorenal syndrome 之病理機轉？  
 (A) 血中 Ammonia 濃度升高 (B) 血液中出现內毒素  
 (C) 體內假性神經傳導物質增加 (D) 體內有效液體容積不足
41. 有關 Liver cirrhosis 病患發生 E V bleeding 時的治療措施，何者不正確？  
 (A) 以 IV pump 注射 Pitressin 止血時，需合併給予 NTG  
 (B) 以內視鏡操作注射硬化劑 (95% ethanol) 可控制急性出血  
 (C) 給予病人口服 propranolol (Inderal) 可立刻減少出血量  
 (D) 插入 S-B Tube 將食道球充氣至 35~40mmHg 可壓迫止血

臺北醫學大學九十二學年度第一學期 ~~期中~~ 考試 ~~命~~ (試) 題紙

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
護三	內外科護理學	魏玲玲	92年1月13日第3節		

※①請注意本試題共 6 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

42. 對於 Hepatic coma 病患之護理措施，何者不正確？
- (A) 持續評估病患意識程度，並保護病患的安全
  - (B) 依照醫囑給予肌肉注射 Neomycin，可消滅腸內細菌
  - (C) 依照醫囑給予口服 Lactulose，可降低腸內的 pH 值
  - (D) 教導避免攝取牛肉漢堡、火腿及花生醬等含氮高的食物
43. 下列敘述有關進行期休克的身體反應中，何者錯誤？
- (A) 此期的身體代償反應已趨衰竭
  - (B) 可能會呈現代謝性酸中毒
  - (C) 血壓正常、快而強的脈搏為最常見之徵象
  - (D) 若及早治療，仍可逆轉患者的病況
44. 下列有關過敏性休克患者之護理措施，何者不當？
- (A) 1/1000 Epinephrine 是治療過敏性休克最重要的藥物
  - (B) 為預防過敏性休克，給藥後至少應觀察 30 分鐘
  - (C) 必要時使用 Intraortic ballon pump (IABP)，監測心輸出量
  - (D) 給藥前先問診或先測試
45. 下列有關休克生理反應的敘述，何者正確？
- (A) 神經性休克是因為脊髓受傷使得交感神經興奮，而導致末梢血管擴張
  - (B) 出血性休克的病人因血漿喪失，致使血比容及血紅素降低
  - (C) 過敏性休克是一種抗原抗體反應，引起血管擴張及微血管通透性增加
  - (D) 感染革蘭氏陽性菌會釋放 endotoxin，而造成血管通透性降低
46. 心因性休克病人若出現心輸出量減少情況，下列導因何者最正確？
- (A) 心跳速率異常 (B) 前負荷減少 (C) 後負荷減少 (D) 心肌收縮力減少
47. 下列有關休克處置的敘述，何者正確？
- (A) 休克的病人宜採下肢放低 45 度，膝蓋伸直的姿勢
  - (B) 應嚴密監測血壓，以維持足夠的前負荷
  - (C) 當病人使用血管收縮劑時，需注意觀察當低血壓現象
  - (D) 小心監測 urine output，成人應維持 15 毫升/小時
48. 下列有關休克輔助性治療的敘述，何者錯誤？
- (A) Military Antishock Trousers(MAST)充氣後可將下半身的血流移轉 750ml 至心臟
  - (B) Intraortic ballon pump(IABP)，可降低後負荷，減少心肌耗氧量
  - (C) Military Antishock Trousers(MAST) 僅適用於心因性休克
  - (D) Intraortic ballon pump(IABP)可增加冠狀動脈之灌流

臺北醫學大學九十二學年度第一學期 ~~期中~~ ~~末~~ 考試 ~~命~~ (試) 題紙

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
護三	內外科護理學	魏玲玲	93年1月13日第3節		

※①請注意本試題共 6 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

一、選擇題 (72%):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

二、問答題 (28%):

1. 請說明「身體心像紊亂」心理調適四階段的特色。(4%)
2. 請說明結腸癌手術前大腸準備 (Colon Prepare) 的內容及其目的，以及需執行多久？(6%)
3. 請說明乳癌手術後手臂運動之目的、列舉至少三個運動項目、運動執行至何時可停止？(6%)
4. 請說明診斷 Hypoglycemia 之三要素 (Whipple's triad) 及 mild hypoglycemia 之治療 (4%)
5. 請問連續性可活動性腹膜透析 (CAPD) 有那些優點？(4%)
6. 當 Liver Cirrhosis 病患併發 Portal hypertension 時，在臨床上會出現那些現象？(4%)