

私立臺北醫學院 八十九 學年度第 一 學期 ~~期中~~ 考試 (試) 題紙

| | | | | | |
|-----|--------|------|----------------|----|----|
| 系級 | 科目 | 授課教師 | 考試日期 | 學號 | 姓名 |
| 口護三 | 內外科護理學 | 魏玲玲 | 90年1月11日第 10 節 | | |

※①請注意本試題共 6 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺下部份均以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

一、選擇題答案 (每題 1.5 分，共 72 分)

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. () | 2. () | 3. () | 4. () | 5. () |
| 6. () | 7. () | 8. () | 9. () | 10. () |
| 11. () | 12. () | 13. () | 14. () | 15. () |
| 16. () | 17. () | 18. () | 19. () | 20. () |
| 21. () | 22. () | 23. () | 24. () | 25. () |
| 26. () | 27. () | 28. () | 29. () | 30. () |
| 31. () | 32. () | 33. () | 34. () | 35. () |
| 36. () | 37. () | 38. () | 39. () | 40. () |
| 41. () | 42. () | 43. () | 44. () | 45. () |
| 46. () | 47. () | 48. () | | |

二、問答題 (共 28 分)

1. 請寫出心輸出量不足的症狀。(5分)

2. 當病患呈現那些症狀可能代表活動無耐力的現象。(5分)

3. 請解釋下列名詞：① 前負荷 ② 後負荷。(3分)

4. 請列舉肝昏迷的治療。(3分)

5. 請陳述有關身體心像紊亂的定義特徵。(4分)

並以乳癌手術後病人為例，說明其心理調適各階段的特色及其護理重點。(8分)

| | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|----|----|
| 系級 | 科目 | 授課教師 | 考試日期 | 學號 | 姓名 |
| 護三 | 內外科護理學(一) | 魏玲玲 | 90年1月11日第(四)節 | | |

※①請注意本試題共 6 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部分均以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

一、選擇題 (每題 1.5 分，共 72 分)

- 心臟病患進行心室射出血量分率(Ejection Fraction)核子醫學檢查，其主要目的在評估：
 - 心臟收縮功能
 - 心室擴張程度
 - 心臟血流方向
 - 心肌肥厚程度
- 心衰竭病患使用度巴明(Dopamine)藥物，下列何者非其給藥目的？
 - 增進腎臟血流以達利尿效果
 - 改善冠狀動脈阻塞程度
 - 增進心肌收縮
 - 維持血壓
- 當病患出現周邊組織水腫、中心靜脈壓(CVP)升高、頸靜脈怒張、體重增加等症狀時，為下列何者之表徵？
 - 左心衰竭
 - 心肌梗塞
 - 高血壓
 - 右心衰竭
- 在給予毛地黃藥物(Digitalis)前，發現病患心跳速率為42次/分鐘，以下那一項護理措施不適當？
 - 仍給予藥物並繼續評估心跳速率
 - 詢問病患無視力模糊、頭暈、腸胃不適的情況
 - 再測量心尖脈一分鐘，評估其心率及節律
 - 暫停給藥並聯繫醫師
- 心律去顫術適用於何種病患？
 - 竇性心搏過速
 - 房室傳導阻滯
 - 心室纖維顫動
 - 心房撲動
- 何種病患可於心電圖監測下進行頸動脈竇按摩？
 - 心房早期收縮
 - 上心室性心搏過速
 - 病竇症候群
 - 二重脈
- 心律調節器置入術適用於何種病患？
 - 完全性房室傳導阻滯
 - 心房撲動
 - 心室早期收縮
 - 心室纖維顫動
- 如果心電圖每一個P波後跟隨著正常的QRS複合波，RR間距均為規則，心率每分鐘120次，此為：
 - 心房纖維顫動
 - 心室心搏過速
 - 竇性心搏過速
 - 心房撲動
- 心導管檢查主要之目的為：
 - 診斷心律不整
 - 評估高血壓的合併症
 - 確立心衰竭的病因
 - 診斷冠狀動脈疾病
- 下列有關穩定型心絞痛(stable angina)的敘述，那一項是不正確的？
 - 通常具有誘發因素
 - 心電圖上可能出現ST間段或T波的變化
 - 一般可經由休息及服藥後緩解
 - 可經由血栓溶解劑來預防進一步的血栓形成
- 有關心肌梗塞病患之護理措施，何者不適當？
 - 住院期間須完全臥床休息，以減少心肌負荷
 - 如有胸痛情形可予氧氣使用
 - 必要時可依醫囑給予止痛劑
 - 急性期採集中護理使病患獲得休息

私立臺北醫學院八十九學年度第一學期~~期中~~期末考試(試)題紙

| 系級科 | 目 | 授課教師 | 考試日期 | 學號 | 姓名 |
|-----|-----------|------|--------------|----|----|
| 護理系 | 內外科護理學(一) | 魏玲玲 | 90年1月11日第IV節 | 務務 | |

※①請注意本試題共 6 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少者務務以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

務務
 佈專用

12. 冠狀動脈患者服用 Aspirin 之目的為：
 - (A) 減緩心絞痛的症狀
 - (B) 溶解冠狀動脈之血栓
 - (C) 預防冠狀動脈血栓的發生
 - (D) 治療心肌的炎症反應

13. 下列有關休克之敘述，何者錯誤？
 - (A) 休克是由許多不同原因引起之疾病，其共同特徵是身體的循環系統無法維持細胞的灌流及功能之需要
 - (B) 導致休克之可能因素包括：前負荷降低、後負荷降低或心肌收縮力降低等等
 - (C) 休克一旦發生，身體可經由腎上腺-交感神經系統、Aldosterone 及 ADH 之代償作用，使血壓回復正常
 - (D) 休克進行至失代償階段，容易形成瀰漫性血管內凝血(DIC)

14. 下列敘述有關休克之藥物治療中，何者不正確？
 - (A) 1/1000 之 Epinephrine 是治療過敏性休克之第一線藥物
 - (B) 輸液治療是維持血壓及組織灌流的重要方法
 - (C) Dopamine 加入點滴後，應利用 infusion pump 輸入，且不可外漏，以免引起組織之壞死
 - (D) Vasopressor (血管收縮劑) 單獨使用效果最佳

15. 下列有關休克的分類敘述中，何者正確？
 - (A) 分佈性休克，主要是血管阻力降低導致絕對液體容積之不足，回心血量減少，終至心輸出量減少所致
 - (B) 最常引起敗血性休克的是革蘭氏陽性菌
 - (C) 過敏性休克是由 IgG Antibody, Antigen & Mast cell 交互作用促成，直接引起微血管擴張，使血管內液體移轉組織間隙所致
 - (D) 心外阻塞性休克是心臟瓣膜及心肌本身以外之因素導致心臟無法充填而休克，其死亡率極高

16. 下列有關休克的治療與護理之敘述中，何者錯誤？
 - (A) 只要有下列兩種情況，即可視為休克來治療：① Systolic pressure < 80mmHg、② Pulse rate < 120 次、③ Pulse pressure > 20mmHg
 - (B) 除了心因性休克外，休克病患宜擺放在一種修正的休克姿勢 (Modification of the Trendelenburg position)
 - (C) 主動脈內氣球唧筒於心臟舒張時將 balloon 充氣，可使舒張壓升高，以達到增加冠狀動脈灌流之目的
 - (D) 抗休克褲子(MAST)適用於大量出血的 Hypovolemic shock，絕不可使用在心因性休克之病患

17. 開心手術採低溫處理，請問正常體溫下，每下降 1°C，則基礎代謝率及身體需氧量的變化各是多少？
 - (A) ↑5% ↑7%
 - (B) ↑7% ↑5%
 - (C) ↓5% ↓7%
 - (D) ↓7% ↓5%

18. 開心手術前之護理，下列何者為非？
 - (A) 腹式呼吸為最省力的一種深呼吸方法，加上圓唇吐氣，可增加肺活量
 - (B) 冠狀動脈硬化病患，術前剃毛範圍包括頭、前胸、雙腋、腹部、陰毛
 - (C) 牙齒疼痛應懷疑發炎，建議看牙醫，徹底矯治後再行手術較安全
 - (D) 可設定 Triflo II 之潮氣量為 12cc/Kg，依實際狀況再調整

19. 陳先生 2 天後準備行開心手術，請問住院時服用之藥物，那些應提醒醫師先行停服？
 - a. Euglucon b. Bokey (Infant ASA) c. Inderal d. Digoxin e. Scanol
 - (A) a+c+d (B) b+c+d (C) a+b+c+d (D) a+c+d+e

私立臺北醫學院 八十九 學年度第 一 學期 ~~期中~~ 考試 ^命 題紙 _(試)

| 系級 | 科 | 目 | 授課教師 | 考試日期 | 學號 | 姓名 |
|----|-----------|-----|---------------|------|----|----|
| 醫三 | 內外科護理學(一) | 魏玲玲 | 90年1月11日第(四)節 | | | |

※①請注意本試題共 6 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺考部分概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

試卷專用

20. 開心手術後當天何種情況應懷疑心臟血管功能異常？
 - (A) 每小時尿量 50cc，比重 1.020
 - (B) 唇肢端微蒼白，稍濕冷
 - (C) 血壓 130/90mmHg、HR 88 次/分、RR 18 次/分
 - (D) 胸腔引流第 1 小時 50cc、色紅

21. 若開心手術後病患主訴翻身時胸部疼痛，下列何種處理方式不恰當？
 - (A) 指導傷口支托法
 - (B) 評估傷口疼痛性質，避免疏忽心絞痛的可能，仍可先給麻醉止痛藥
 - (C) 觀察傷口部位有否紅腫發炎現象
 - (D) 避免做翻身動作

22. 開心患者之出院指導方面，下列敘述何者為非？
 - (A) 定時測量體重，若發現 1 天增加 $\geq 1.5\text{Kg}$ ，應懷疑體液瀦留
 - (B) 利尿劑之服用是希望尿量越多越好，避免增加心臟負擔
 - (C) 服用 Coumadin 應注意有否出血狀況，如牙齦出血、月經期過長... 等
 - (D) 吃低鈉飲食注意勿過猶不及，遵守禁煙限酒之原則

23. 有關肝硬化病人形成腹水機轉的敘述，那一項最正確？
 - (A) 門脈高壓導致血漿及淋巴液的流體靜壓降低
 - (B) 肝硬化導致腹內壓上升
 - (C) 低蛋白血症導致膠體滲透壓降低
 - (D) 血中留鹽激素濃度降低

24. 肝硬化病人的臨床徵象中，何者是因血中 Estrogen 太多引起的？
 - (A) 血小板減少症
 - (B) 門-系腦病變
 - (C) 紅掌
 - (D) 蛇女頭

25. 何者不是肝昏迷的誘發因素？
 - (A) 感染
 - (B) 腸胃道出血
 - (C) 便秘
 - (D) 高血鉀

26. 肝硬化病人發生食道靜脈曲張破裂出血時，下列之護理措施何者最正確？
 - (A) 用 S-B Tube 止血時，食道球應灌入 200-300ml Air
 - (B) 食道球最好每隔 6-8 小時放鬆 30 分鐘，留置時間不可以超過 24 小時
 - (C) 給 Sandostatin 靜脈滴注時，需同時給病人 NTG 以預防心肌缺血
 - (D) 向病人解釋醫師會經由內視鏡將 Inderal 注入靜脈瘤內來止血

27. 骨癒合分期的順序何者為對？

| | | |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| a. Cellular Proliferation | b. Ossification | c. Hematoma Formation |
| d. Cellus Formation | e. Consolidation and Remodeling | |

 - (A) a→b→c→d→e
 - (B) b→c→d→e→a
 - (C) c→a→d→b→e
 - (D) d→a→b→c→e

28. 施行牽引的原則，何者為對？

| | | |
|------------------|---------------|------------|
| a. 病人必須平躺，採功能性位置 | b. 牽引力需儘量呈一直線 | c. 不需有反牽引力 |
| d. 牽引裝備不能有磨擦情形出現 | e. 牽引力必須持續使用 | |

 - (A) a+b+d+e
 - (B) a+b+c+d
 - (C) a+b+c+e
 - (D) a+b+c+d+e

私立臺北醫學院八十九學年度第一學期 ~~期中~~ 考試(試) 題紙

| 系級 | 科目 | 授課教師 | 考試日期 | 學號 | 姓名 |
|-----|-----------|------|--------------|----|----|
| 口護三 | 內外科護理學(一) | 魏玲玲 | 90年1月11日第10節 | | |

※①請注意本試題共 6 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

29. 下列何者為骨折可能出現的合併症?
 a. 脂肪栓塞 b. 氣性壞疽 c. 間室症候群(compartment syndrome) d. 肺栓塞 e. 脫水
 (A) a+b+c+d (B) b+c+d+e (C) a+c+d+e (D) a+b+d+e
30. 五十歲的王女士因右下肢糖尿病性壞疽，將於二天後施行截肢，請問術前應給王女士那些截肢前評估?
 a. 病人的身體狀況 b. 病人對截肢的看法 c. 周圍血管功能檢查的結果
 d. 病人的復健潛能 e. 實行截肢的種類及高度
 (A) a+b+c+d (B) b+c+d+e (C) a+c+d+e (D) a+b+c+d+e
31. 上何種石膏最可能出現 Cast syndrome?
 (A) 長臂石膏 (B) 短腿石膏 (C) 體石膏 (D) 拇指人字形石膏
32. 六十歲的丁先生因左髖關節缺血性壞死(AVN of Left Hip)於今天施行 THR 手術返回病房，請問術後應給丁先生那些護理措施?
 a. 密切測量 vital signs，以防寒顫、血壓下降及出血
 b. 熱敷傷口及止痛劑給予以減輕疼痛
 c. 患肢外展 15-20 度，髖關節屈曲夾角不可小於 90 度，以防關節脫臼
 d. 協助床上便盆使用，側翻時雙腿中要夾枕頭
 e. 預防傷口感染
 (A) a+b+c+d (B) b+c+d+e (C) a+c+d+e (D) a+b+d+e
33. 結腸會製造下列何種物質?
 (A) 鉀離子 (B) 維生素 K (C) 維生素 A (D) 維生素 D
34. 何種 Colostomy 病人執行 Colon Irrigation 以後，可以定時解便?
 (A) 升結腸造瘻者 (B) 橫結腸造瘻者 (C) 降結腸造瘻者 (D) 迴結腸造瘻者
35. 下列有關降結腸癌症狀之描述，何者不正確?
 (A) 解血便 (B) 嘔吐 (C) 大便習慣改變 (D) 裡急後重
36. 下列何種 Colostomy 病人會同時做 APR 手術?
 (A) 單口造瘻者 (B) 雙口造瘻者 (C) 環狀造瘻者 (D) 暫時性造瘻者
37. 下列有關 Colostomy 正常顏色之描述，何者正確?
 (A) 白色 (B) 粉紅色 (C) 紫色 (D) 黑色
38. 下列有關結腸癌手術前 Colon Prepare 之描述，何者不恰當?
 (A) 需執行三天
 (B) 為減少糞便污染傷口，每天安排一次 S.S. Enema
 (C) 為減少糞便量，會給與 Dulcolax 和 MgSO₄
 (D) 因糞便量減少，所以每天可進食 Full Diet，以防虛弱

私立臺北醫學院 八十九 學年度第 一 學期 ~~期中~~ 考試 (試) 題紙

| 系級 | 科目 | 授課教師 | 考試日期 | 學號 | 姓名 |
|-----|--------|------|-------------|----|----|
| 護理三 | 內外科護理學 | 魏玲玲 | 90年1月11日第Ⅳ節 | | |

※①請注意本試題共 6 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則該部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

務必處心佈專用

39. 下列有關 Cholecystitis 病人之症狀描述，何者不正確？
 - (A) 發燒
 - (B) 灰白便
 - (C) 疼痛放射至左肩
 - (D) 噁心、嘔吐
40. 下列有關 T tube 攝影之描述，何者不正確？
 - (A) 通常安排在膽囊切除術以後 7 至 10 天
 - (B) 可同時行碎石術
 - (C) Whipple 手術後不安排此項檢查
 - (D) 攝影確定無結石後且膽汁排泄通暢，才會拔掉 T tube
41. 接受膽囊切除術的病人，應採取何種飲食？
 - (A) 終生需採 low fat & low cholesterol diet
 - (B) 終生需採 low sodium diet
 - (C) 最初採 low fat & low cholesterol diet，以後可採 moderate fat diet
 - (D) 最初採 low sodium diet，以後可採 moderate sodium diet
42. 下列有關 Whipple operation 之合併症描述，何者不正確？
 - (A) Dumping Syndrome
 - (B) fistula of anastomosis
 - (C) Unstable D.M.
 - (D) esophageal bleeding
43. 下列有關膽樹系統手術的護理措施，何者不正確？
 - (A) 手術後不需 NPO
 - (B) 床頭抬高且屈膝，可減輕傷口疼痛
 - (C) 手術後 6 週內勿提 10 磅以上重物
 - (D) 傷口可能放置 Jackson bag 引流管以引流血水
44. Acute Pancreatitis 是由下列何項血液檢查確認？
 - (A) GOT
 - (B) Bilirubin
 - (C) Amylase
 - (D) BUN
45. Breast Cancer 最常出現的症狀為下列何項？
 - (A) 乳頭有血性分泌物
 - (B) 無痛性腫塊
 - (C) 乳頭凹陷
 - (D) 乳房皮膚變化
46. 下列有關乳癌病人所接受的 MRM 手術切除範圍的描述，何者正確？
 - (1) 單側全部乳房 (2) 同側腋下淋巴結 (3) 胸大肌 (4) 同側鎖骨下淋巴結
 - (A) 1+2+3
 - (B) 1+2+3+4
 - (C) 1+4
 - (D) 1+2
47. 下列有關乳癌手術後患臂的 Lymphedema 描述，何者不正確？
 - (A) 為淋巴液回流不易所致
 - (B) 患臂會出現麻、緊繃感
 - (C) 六個月內患臂不可量血壓，以後就無此禁忌
 - (D) 手臂運動可預防及減輕症狀
48. 下列有關乳癌手術後給予 Tamoxifen 治療的相關描述，何者正確？
 - (A) 血液檢查結果為 ER (+) 者效果好
 - (B) 劑量為每天 10 mg
 - (C) 可殺死乳癌細胞
 - (D) 需終生服用