

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
日護三	產科護理學	周雨樺等	92年01月09日第二節		

- 請注意本試題共 8 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
- 每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

一、選擇題 (請將正確答案打「✓」標示於答案卷方格內；每題 1.5 分，共 84 分)

- 待產時因產婦宮縮疼痛而使用 Demerol，肌肉注射此藥 30 分後，產婦即產下一女嬰，此時你最有可能觀察到，下列何種變化最有可能發生？
 - 產婦血壓下降
 - 產婦呼吸抑制
 - 胎兒激動不安
 - 胎兒呼吸抑制
- 有關第一產程時宮縮痛，下列敘述何者不正確？
 - 組織行無氧代謝所造成
 - 陰道會陰燒灼感
 - 牽扯 T10-T12, L1 所造成
 - 牽扯 L1-L5 所造成
- 對於麻醉藥影響產婦及胎兒，下列敘述何者正確？
 - 藥物引起低血壓而降低流入胎兒血流
 - 肥胖者對麻醉藥量會降低
 - 為達最好止痛效果於產程前就打麻醉藥
 - 為維持麻醉劑量不給大量點滴注射
- 產婦因待產 10 小時，產程未有明顯進展，醫師先於人工破水，下列敘述何者不正確？
 - 教導下床解小便
 - 注意臍帶是否脫垂
 - 床尾抬高
 - 注意羊水性質顏色
- 產婦陣痛入院催生，以陰道內診檢查：OS 4 公分、Effacement > 80%、Station -1、子宮頸堅實度柔軟、子宮頸位置在前面，請為其 Bishop scoring system 得分為？
 - 9 分
 - 10 分
 - 11 分
 - 12 分
- 當病歷上呈現「at 10:30AM Vacuum 產女嬰，Ep W'd 2 度裂傷」，下列何者不是我們要優先考量的？
 - 觀察母親惡露量
 - 產婦陰道口腫脹
 - 胎兒頭皮完整性
 - 胎兒皮膚黃疸否
- 對於胎產式異常，下列敘述何者正確？
 - 枕後位能立即分娩
 - 枕橫位產程短
 - 面產式是產式中最大徑線
 - 枕前位產婦最易背痛
- 下列敘述何者正確？
 - 巨嬰表體重在 5000gm 以上
 - 早產指 36 週前
 - 子宮內感染最早從產婦體溫可知
 - 臀產最易胎盤滯留
- 對於破水的敘述，下列何者不正確？
 - 羊水試紙呈現深褐色
 - 注意羊水性質及顏色
 - 羊水無法像小便般隨意控制
 - 羊水流出現易感染

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
日護三	產科護理學	周雨樺等	92年01月09日第二節		

- 請注意本試題共 8 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
- 每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

情況題：邱女士，前胎剖腹產，現宮縮為 I/D：50"/30-60"，胎心音在 90-110 次/分間，點滴注射 L/R500.c.c + 1/2Amp piton-s，血壓 110/50mmHg，聽診肺有囉音，護生教導左側躺情況也未改善，請根據以上陳述回答下列 10-13 題：

- 當護士請醫師評估產婦，決定停掉催生，其理由為：
 - 前胎剖腹產
 - 高張性子宮活動
 - 胎心過慢
 - 低血壓
- 除教導左側躺外，下列何項護理措施較不適當？
 - 立即加快催生點滴以補充液體
 - 教導產婦躺向右側
 - 給予氧氣
 - 教導產婦呼吸技巧
- 當護士評估聽診肺有囉音時，可能的原因為：
 - 藥物副作用
 - 正常現象
 - 大量點滴注射結果
 - 產婦閉氣結果
- 對於邱女士，產後應注意事項，下列何者不正確？
 - 產後出血
 - 肺囉音改善否
 - 子宮硬度
 - 呼吸抑制否
- 對於痛經之敘述，何者不正確？
 - 約有 1/5 的女性子宮前屈造成
 - 1/5 為子宮後屈造成
 - 自然生產使經血排出的管道變得較通暢
 - 如在月經第一天特別疼痛立即服藥最有效
- 關於經前緊張症候群之敘述，何者不正確？
 - 常見從經前十天左右開始
 - 動情激素和助孕酮的比例失調
 - 腎上腺皮質分泌抗利尿激素
 - Vit B6 不足
- 對於子宮全切除術之術後指導，下列何者不適當？
 - 有出血即需返診
 - 鼓勵早下床活動
 - 會有餘尿是不正常
 - 勿常蹲姿及提重物
- 下列敘述何者正確？
 - 念珠球菌感染為黃綠色分泌物
 - 陰道滴蟲感染為白或黃色分泌物
 - 巴氏腺等源於男性海綿球體
 - 披衣菌感染常造成輸卵管炎
- 對於停經之症狀，下列敘述何者不正確？
 - 熱潮紅乃最後出現之症狀
 - 高血壓常與熱潮紅相伴出現
 - 骨質疏鬆症乃出現之疾病
 - 泌尿系統常出現頻尿及殘尿感

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
日護三	產科護理學	周雨樺等	92年01月09日第二節		

- 請注意本試題共 8 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
- 每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

- Menstrual cycle length can vary as a result of differing lengths of the :
 - luteal phase
 - ovulation
 - secretory phase
 - follicular phase
- Which of the following factors is the LEAST common cause of infertility ?
 - tubal factor
 - male factor
 - combined factor
 - cervical factor
- Which one is the peritoneal factor clue to infertility ?
 - Asherman's syndrome
 - Mullerian anomaly
 - Young's syndrome
 - Endometriosis
- Which of the following disorders is *not* usually diagnosed by hysterosalpingography (HSG) ?
 - hydrosalpinx
 - distal tubal occlusion
 - proximal tubal occlusion
 - ovarian endometriosis
- Which is (are) the complication(s) of artificial reproductive technology (ART) ?
 - ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS)
 - heterotopic pregnancy
 - psychological problems
 - all of the above
- 當一位餵母乳的媽媽告訴你，我的寶寶好像吃不飽，2-3 個小時就要吃一次奶，大便又稀稀軟軟的，是不是消化不好？下列哪一項回答為正確。
 - 母乳中的乳蛋白含量比酪蛋白多，較容易消化，排空時間較快所以寶寶大約 2-3 個小時就要吃一次奶，這是正常的
 - 母乳因為乳糖含量較高，容易引起腸胃道刺激消化吸收較差，所以寶寶的大便會稀稀的
 - 母乳中的鐵質含量比牛奶高，產生的乳凝塊也比較大，大便也應該成形，你的寶寶有消化上的問題，應給醫生看看
 - 母乳中水分含量比牛奶多，所以寶寶營養攝取會較差，大便也比較稀，此時媽媽應該多給寶寶補充一些固體食物

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
日護三	產科護理學	周雨樺等	92年01月09日第二節		

- 請注意本試題共 8 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
- 每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

- 下列哪一些徵象可以判斷出吃母乳的寶母乳攝取量足夠？①嬰兒小便6-8次/天 ②吃完奶後不再有尋乳反射 ③體重增加0.5公斤/月左右 ④不到2小時就要吃母乳 ⑤吃母乳時寶寶的喉嚨有吞嚥動作，且有吞嚥聲音
 (A) ①②③④ (B) ②③④⑤ (C) ①③④⑤ (D) ①②③⑤
- 以下針對母乳的敘述何者為是？
 (A) 初乳約泌乳開始的前一週內，含大量的IgA，脂溶性維生素及礦物質
 (B) 過渡奶中，蛋白質含量較初乳多，但乳糖、脂肪及熱量較初乳少
 (C) 前奶含較多的不飽和脂肪酸是熱量供應的主要來源
 (D) 成熟奶比初乳顏色更黃、更稠，以及含有大量的免疫球蛋白
- 請問 Letdown reflex 是指哪一個激素的作用？
 (A) Estrogen (B) Progesterone (C) Prolactin (D) Oxytocin
- 李太太向護士表示，坐完月子就要上班了，可以繼續餵母乳嗎？要怎麼辦才好呢？身為護士的你要如何回應較恰當？
 (A) 不適合餵母乳了，斷斷續續餵奶容易乳腺炎，並教導媽媽退奶方法
 (B) 還是可以餵母乳，並教導媽媽擠乳及保存乳汁的方法
 (C) 可以不用再餵了，乳汁最營養的成分在產後一個月，所以媽媽可以退奶了
 (D) 媽媽可利用午休時間回家給寶寶吸吮乳汁，因乳頭刺激對乳汁分泌最好
- 針對母乳保存方法，下列敘述哪一項為正確？
 (A) 室溫下初乳可存放24小時，成熟乳可存放6小時
 (B) 若存放於獨立冷凍庫，乳汁可保存約12個月之久
 (C) 乳汁存於冷凍冷藏不同門的冰箱，可存放約3-4月
 (D) 母乳保存的室溫是指20°C
- 以下哪些是哺餵母乳的好處？①可減少嬰兒過敏及感染的反應 ②可促進母親子宮復舊 ③可以減少半夜哺餵的次數 ④方便經濟、出門不用帶太多瓶瓶罐罐 ⑤增加親子間的依附關係 ⑥不容易引起嬰兒便秘
 (A) ①②③④⑤ (B) ②③④⑤⑥ (C) ①②④⑤⑥ (D) ①②③⑤⑥
- 王太太向護士表示：「我的乳頭有點短，寶寶不知道有沒有吸到奶，我想還是擠到奶瓶給他吸好了，這樣我也知道他吸多少。」，下列哪一項回答不適宜？
 (A) 乳頭短寶寶確實不易含住，若媽媽要擠奶請注意一定要先用肥皂水清洗乳房及雙手
 (B) 乳頭長短並不影響乳汁的分泌，嬰兒吸奶須含住乳頭及部分乳暈
 (C) Oxytocin 與 Prolactin 的感受器位於乳頭部位，若不給寶寶直接吸吮會影響乳汁的分泌
 (D) 餵母乳的寶寶是以吸吮的時間、間隔及排尿次數來觀察他吃的飽不飽，而不是吃多少西西
- 陳太太 G1P1、C/S 後第二天，今天早上母嬰同室時家屬協助媽媽採搖籃式哺餵母乳，陳太太向護理人員表示寶寶吸乳頭時會痛，而且傷口也很不舒服，身為護士的你，下列哪一個處理不恰當？
 (A) 協助媽媽改採側臥、或橄欖球式餵奶
 (B) 告知這是剛開始餵奶的現象，習慣就好了
 (C) 觀察寶寶是否含住乳頭或乳暈
 (D) 協助並教導媽媽哺餵母乳的技巧

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
日護三	產科護理學	周雨樺等	92年01月09日第二節		

- 請注意本試題共 8 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
- 每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

- 呂太太 NSD 第三天，護士今天發現呂太太有奶脹的情形發生，下列哪一些措施較為適當？
 - 教導其每次餵奶前應先作熱敷及按摩，以促進乳腺通暢
 - 哺乳期間不宜穿胸罩，以免壓迫乳房，影響乳汁分泌
 - 每次餵完奶後應注意乳房是否排空，若無則須擠出乳汁
 - 鼓勵產婦及早建立固定的餵食時間表
- 早期產後出血最常見的原因為何？
 - 子宮乏力
 - 子宮外翻
 - 黏著性胎盤
 - 傷口感染
- 晚期產後出血最常見的原因為何？
 - 生殖道損傷
 - 胎盤碎片殘留
 - 子宮無力
 - 瀰漫性血管內凝血
- 有早期產後出血跡象的婦女，護理人員應提高警覺仔細評估，以下哪一項措施不恰當？
 - 若子宮軟須按摩直到子宮變硬後再按 30 分鐘
 - 密切監測生命徵象，特別是脈搏和血壓
 - 注意膀胱是否脹滿，請產婦 3-4 小時解一次小便
 - 仔細評估惡露的量及性質
- 李太太 G2P2、C/S 第二天，體溫 38.5°C，產婦主訴腹部疼痛、厭食、惡露量多且有臭味，子宮壓痛，請問李太太可能是什麼問題？
 - 乳腺炎
 - 泌尿道感染
 - 子宮內膜炎
 - 血栓靜脈炎
- 乳腺炎主要是因為下列何種微生物感染所造成？
 - E. coli (大腸桿菌)
 - Proteus (變形桿菌)
 - Staphylococcus Aureus (金黃色葡萄球菌)
 - Streptococcus (鏈球菌)
- 產後罹患乳腺炎的婦女，下列護理措施哪一項較適宜？
 - 發炎早期，乳房變硬和疼痛時可給予熱敷以減輕疼痛
 - 症狀一出現可依醫囑給予抗生素及止痛藥來減輕不適的症狀
 - 減少餵奶次數以防乳房過度刺激，造成乳汁過度分泌
 - 發炎一產生不可以再哺餵母乳或擠乳房，以防乳房傷害更大
- 下列哪一項不是乳腺炎常發生的時間？
 - 產後一週內
 - 產後 2-4 週
 - 哺乳突然停止
 - 斷奶時
- 預防產後血栓靜脈炎的最好方法是？
 - 多喝水
 - 早期下床
 - 骨盆底肌肉收縮運動
 - 口服抗生素

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
日護三	產科護理學	周雨樺等	92年01月09日第二節		

- 請注意本試題共 8 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
- 每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

情況題：呂太太產後第 5 天，發現右下肢靜脈有觸痛感，局部發紅發熱走路會痛，請回答 42-44 題

- 依呂太太的情形，此時較適當的護理為何？
 - (A) 按摩疼痛部位
 - (B) 鼓勵多下床活動
 - (C) 臥床休息、抬高下肢
 - (D) 臥床休息、彎曲膝蓋並搖高床尾
- 當護理人員為呂太太作身體評估時，可以發現有哪些現象？①Homan's sign (+) ②low leg edema ③reflex arterial spasms (反射性動脈痙攣) ④Purpura (紫癍)
 - (A) ①②③
 - (B) ②③④
 - (C) ①③④
 - (D) ①②④
- 當呂太太服用 Warfarin 時，護士的護理措施中哪一項正確？
 - (A) Warfarin 作用快，須持續服用約 1 個月，不可隨意停用
 - (B) 此藥不會經由乳汁排出，可以繼續哺餵母乳
 - (C) Protamine 可對抗 Warfarin 造成的出血問題
 - (D) 需要密切監測出血現象，如惡露量、鼻出血、牙齦出血、傷口出血等問題

情況題：林太太自從被診斷為不孕症，情緒相當低潮，先生安慰她想帶她出門散心，但林太太不願出門甚至不想與人談到此事，也很少參加一些聚會，請回答下列 45-46 題：

- 依 psychosocial reaction 請問林太太處於下列哪一期？
 - (A) Deny
 - (B) Isolation
 - (C) Crime
 - (D) Grief
- 針對林太太的狀況，請問護士應優先採取下列哪一項護理措施？
 - (A) 與他們夫妻一起討論對不孕的看法及表達情緒
 - (B) 避免不孕的神話，儘量將不孕經驗正常化
 - (C) 提供一些收養資料，轉移負向的感受
 - (D) 門診後加強衛教並協助他們加入支持性團體
- 產後泌尿道感染最常見的致病菌為？
 - (A) Group B streptococcus (B 群鏈球菌)
 - (B) E. coli (大腸桿菌)
 - (C) Staphylococcus (葡萄球菌)
 - (D) Proteus (變形桿菌)
- 王太太 G1P0，現懷孕 34 週，試問在下列何種情況下可能會考慮立即將胎兒生產出來？①Non-stress Test 為反應型 ②Contraction Stress Test 為陽性 ③Fetal Movement Count 30 分鐘內有 4 次強的胎動 ④Biophysical Profile Scoring 為 4 分
 - (A) ①②
 - (B) ②③
 - (C) ②④
 - (D) ③④
- 愛滋病毒感染婦女將愛滋病毒傳染給嬰兒的途徑有哪些？
 - (A) 在子宮內經胎盤傳染
 - (B) 生產時暴露於母體的血液中
 - (C) 經哺餵母乳感染給新生兒
 - (D) 以上皆是

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
日護三	產科護理學	周雨樺等	92年01月09日第二節		

- 請注意本試題共 8 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
- 每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

- SARS 肆虐季節即將來到，有關健全母體及胎兒免疫系統的方法何者較適當？①均衡的飲食及營養攝取 ②適當的運動與充足的睡眠 ③戴 N95 口罩避免感染 ④注射免疫球蛋白 ⑤莫使自己處於緊張和壓力下
(A) ①②③ (B) ①②⑤ (C) ①③④ (D) ③④⑤
- 于美仁，37 歲，G2P1，此胎懷孕診斷有 GDM，試問針對其 GDM 的情況與相關護理措施，下列敘述何者為非？
(A) 在懷孕期間建議熱量的攝取應保持在每日 1800 大卡以下，避免體重持續增加、胎兒過度成長
(B) 可將適量點心安排在于小姐易發生低血糖的時段
(C) 若糖尿病控制不住，易引起胎盤鈣化、胎兒酸中毒、甚至胎死腹中
(D) 胎兒肺部成熟度測定之 L/S 比值應 ≥ 3 才算正常
- 下列有關孕期婦女相關敘述何者有誤？
(A) HbsAg(+)表示母體有 B 型肝炎病毒的存在
(B) HbeAg(+)者，其嬰兒在出生 24 小時內要皮內注射 1 劑 B 型肝炎免疫球蛋白
(C) Rh 不相容常出現於 Rh (+) 母親懷有 Rh (-) 的胎兒時
(D) O 型血的孕婦懷有 A 型或 B 型的胎兒可能會產生溶血，但其反應是緩和的
- 下列哪些情況可能會導致懷孕母體瀰漫性血管內凝血？①子宮外孕 ②葡萄胎 ③前置胎盤 ④胎盤早期剝離 ⑤重度子癩前症
(A) ①②③④ (B) ①②④⑤ (C) ②④⑤⑥ (D) ③④⑤⑥
- 王太太 28 歲，G1P0，妊娠 10 週，有地中海型貧血，先生正常，試問此胎兒日後成長狀況如何？
(A) 1/2 正常，1/2 有漸進性溶血性貧血
(B) 1/2 有漸進性溶血性貧血，1/2 有 Cooley's anemia
(C) 1/4 正常，1/2 有漸進性溶血性貧血，1/4 有 Cooley's anemia
(D) 1/4 正常，1/4 有漸進性溶血性貧血，1/2 有 Cooley's anemia
- 有關感染症的相關敘述，下列何者有誤？
(A) Gonorrhea 能經由胎盤傳染給胎兒
(B) Penicillin 是 Syphilis 目前唯一的治療
(C) Condyloma 的致病微生物是人類乳頭瘤病毒
(D) Bacterial Vaginosis 可於第二、三孕期以 Metronidazole 治療，不用擔心會導致畸胎
- 有關 PIH 婦女在孕產期及 MgSO₄ 使用的相關處理，下列敘述何者正確？
(A) 給予利尿劑 (如：Thiazides) 可降低血鈉
(B) 飲食應限制蛋白質及鈉的攝取
(C) 產後 24 小時內仍需給予 MgSO₄
(D) 產後應服用 Ergonovine 幫助子宮收縮

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
日護三	產科護理學	周雨樺等	92年01月09日第二節		

- 請注意本試題共 8 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
- 每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

二、問答題 (請將正確答案寫在背面；共 16 分)

- 請寫出剖腹產術後照護重點？(5%)
- 對於女性陰道疾病，需注意的臨床症狀為哪三點？(3%)
- 寫出 4 種有關不孕中影響排卵的因素？(2.5%)
- 何謂 TORCH？(2%)
- 護理人員於臨床上如何判斷 MgSO₄ 的使用是否有中毒情形出現？試寫出其中毒徵象及判別數值。(4%)

答 案 卷

一、選擇題 (請將正確答案打「✓」標示於方格內；每題 1.5 分，共 84 分)

題 案	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A																				
B																				
C																				
D																				
題 案	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A																				
B																				
C																				
D																				
題 案	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56				
A																				
B																				
C																				
D																				

二、簡答題 (共 16 分，請將正確答案寫在背面，並將題號標示清楚)