





東醫寶鑑內景篇卷之四

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

小便

小便原委

靈樞曰水穀者常並居胃中成糟粕而俱下

焦而滲入膀胱之中胞氣化之而爲尿以泄出也。別汁而滲入膀胱焉○內經註曰水滾自迴腸泌別

難經註曰水

灌入於膀胱自小腸盛受於闌門以分三別也。真則滲灌入於膀胱上口而爲溲便詳此三說則

小便即泌

入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於

肺通調水道

下輸膀胱則小便又似水飲精微之肺運化而後施者也夫溲尿者水也水

氣上升

本體固不能上升則豈可謂小便獨爲氣化乎。升則成其氣之子氣者水之母氣行焉氣化則能升矣且水

或運化謂小便範由泌別不由

脬爲尿器

膀胱而居膀胱之中焉故內經曰脬津淀則又有室也夫膀之居於膀胱也有上口而無下口津液者膀胱

院於胞外積於膀下無空處則入尿急時至廁安能即出乎夫惟積滿膀下之空處而不可再容故急則出矣

辨尿色

水液渾濁皆屬於熱○小便黃者小腹中有熱肝熱病者小便先黃○足陽明之脉病氣

盛則尿色黃

有五色惟赤白色者多赤色多因酒得之白色乃小便

脈法滑實為癃

少陰脉數婦人則陰中生瘡男子則氣淋○小便

虛○小便不禁赤者有熱白者氣虛

下元虛冷贊○下焦無血小便澀數而黃遺精慳○腎

脈滑實為癃

婦人則陰中生瘡男子則氣淋○小便

脈細

遺精白濁當驗於尺結筋動緊

脉微

少陰微者氣閉膀胱不

脉緩

小便澀者血因火燭下

小便不利

陰虛則小便難澀○小便澀者血因火燭下

小便難外候

候其鼻頭色黃者小便必難澀○小便澀者血因火燭下

小便不利

陰虛則小便難澀○小便澀者血因火燭下

小便澀

少陰火四物湯加知母黃柏牛膝甘草梢血

小便澀

熟而小便澀惟陰分盡而陽乘之若小便黃赤膀胱

小便澀

則萬全木通散利之附○小便數而不利者有三

小便澀

搏下焦津液不能行者二也必滲瀉乃愈若脾胃虛

小便澀

氣滯不能通調水道下輸膀胱而化者三也可順

小便澀

氣令施化而出宣發苓朮柏子飲酒○上盛下虛

小便澀

或欲成寐宣清心蓮子飲酒○上盛下虛

如嚼
欲滲之。腎虛小便數而癃

欲滲之。

腎宜虛平小

補元而
便繁

卷之二

卷之三

四

萬全木通散

或取之

卷之三

卷之三

卷之三

一
爲

葵苓琥珀散
平補元冷
長流甘桂
蟻肉桂
酒川浸
湯子大棗
下五
十湯
小酒
大
三
半

滑石小便
草羹各一
水一疊
便數而
藥葉
山藥
鹽胡蘿
蔴亂

白术分琥珀
末每三錢
僅壓之即
漏或遺
膏腎口益
黃汁炒米
為末糯米
子仁大歸

以猪澤苓各
禁兔五各
各禁兔五各
仁不翻戰肉內
不翻戰肉內

語 答 錢 緣 五 兩

小便不通芒硝一錢龍眼肉
色之細嚼之立通

又鷄子中黃一枚服之不過三
又炒鹽熱熨小腹冷復易之

又治孕婦忍便久致胎轉自取冰甲燒歇脈之
又以蒲黃裹患人腎令頭至地三度即通

加宣驟便小懨之芩閥血氣不其或也殊即陽火過
味氣○不便以如湯難分分通證百瘻蓋○之孔陰
五散小通閉破血調壅宜宜有小次者閥閉別屎器
芩通便乃而之汚本治滋清氣便名火者瘻也之所
謂不血絕於香法腎肺血閉為病暴合入之生
透九通滯無○下沉有丸散之塞牀為病而絡端病
泉猶宜致其夫而香二疎如異而病尿為言膀也遺尿
散芩五氣熱熱不末如○不如不是滯屎之膀胱其尿
湯芩不微則通二氣小渴渴渴也牀點一約生閉
散通者不則鑑不便而而時網瀝滴病下病瘻督
鵠而小通用空能不小小見○點不也焦瘻督
竅便冷桃心化通便便躁熱滴出分實痔脉
導滯算則仁服而膚不不者在而俗而遺尿者
亦而不承蒸不下通通是下出呼言瘻女
元尊館禁氣用通狀者者也焦一小之閉足子
池氣有其湯吐則如熟熟既均日復有虛三八
膏除粒之法疎覆在在○寒熱不暴則焦算
子疎○盛類以皮被下上小不十通水遺者挺
湯湯小者躬提疾痛焦焦便便是之屎六孔

八正散

治膀胱熱，積小便，癃閉，不通大黃木通瞿麥篇蓄滑石梔子車前子甘草各一錢石斛

清肺散

治渴而小便閉，猪苓通草各一錢，萹蓄水煎服。一錢入燈心

滋腎九

治不渴而小便閉，桂半錢右為末水丸，梧子大空心洗，各一錢。

滋腎九

治下焦熱，一名泄腎丸。○一人病小便不通，腹脹，脚腫，雙睛凸出，晝夜不眠，苦痛不可言，且苦嘔，噫氣，小便癃閉，是無陰而陽氣不化者也。此人奉養出

道寸氣除燥湯

治小便不通，赤茯苓一錢半，知母澤瀉各一錢，右以柏子仁一錢

須臾自愈，遂處此方服之。

導赤元

治膀胱有熱，小便不通，大黃一兩半炒梔子

地膚子湯

治下焦熱，結小便不通，地膚子一錢，知母

宣氣散

治癃閉急痛，甘草梢木通各三錢，梔子滑石各一錢，右末二錢，燈心湯調下。

通關丸

治小便不通，黃柏知母並酒炒滑石各二兩，木通一兩，內桂三錢，右剉作一貼。

猪苓湯

治熱結小便不通，猪苓才通澤瀉滑石枳殼，黃柏酒浸牛膝麥門冬瞿麥萹蓄車前子各七分。

百九

白醫湯，下。

加味五苓散

治虛寒小便不通五苓散料等分加當歸根皮土苓木通甘草梢亦等分右剉

透泉散

治小便赤澁不通滑石一兩芒硝甘草各五錢琥珀二錢半右細末每二錢空心以燈心

下煎湯調

老虛人癃閉

年老人小便不通加黃芪煎水吞下滋腎丸空心調

癃閉宜吐塞

小便不通屬氣虛血虛有實熱有痰氣閉皆宜吐之以提其氣氣升則水自降蓋

多氣承載其水也氣虛用參术升麻血虛用四物

二陳皆先服後泻吐之實熱當引之用八正散方見○一人病小便不通諸藥無效丹溪曰此種

痰病也積痰在肺肺爲上焦而膀胱爲下焦

喘而腹滿爲下焦上焦

哮喘

喘而腹滿爲下焦上焦

心服咽

芩苓煎湯調

癃閉宜瀉

實熱癃閉用八正散蓋大便動利小便自之水出焉乃以二陳湯先飲大吐之後下竅

癃閉宜瀉

實熱癃閉用八正散蓋大便動利小便自之又能透達雖然大便小便脉絡相貫入有多日佐

癃閉宜瀉

澤瀉其末在肺合用葶苈桑皮更以木通滑石佐

癃閉宜瀉

小便不通但用神保元散門葷大渴數行小便自通顧○實熱尿閉宜用導水丸三花神祐丸下便

癃閉宜瀉

膀胱急疾走或飽食忍尿或飽食走馬或忍小便或

癃閉宜瀉

小便或醉飽入房使小腸之氣逆而不通大腸之

癃閉宜瀉

氣與之俱滯外水不得入膀胱內水不得出膀胱之

癃閉宜瀉

急數每欲尿時痛不可言大便亦裏急甚者頻

癃閉宜瀉

非痢必以手按臍下庶可立出小便亦便甚者因併

癃閉宜瀉

急數每欲尿時痛不可言大便亦裏急甚者因併

泄此嘔大腸張浮腫治法用涼藥疏利小腸中
正憂悶多者便自然順流。○胎婦轉脬之病
滑利疏導藥鮮有應效。因思脬為胎所壓
邊脬系了戾不通爾胎若舉起懸在中央脬系
此疏水道自行一婦患此詮之兩手似滯重
探湯加參术半夏陳皮甘草生薑空心煎服
是與八貼而安此法恐偶中後歷用數人
老陰陽熨法。○轉脬宜二石散加木通車前子等分煎服
人脬轉困篤欲死六味地黃九倍澤瀉瀉
轉宜參术飲。○孕婦脬
轉觀宜參术飲。○孕婦脬

二石散治脬轉八九日不得尿滑石寒水
各一錢水十九盞前生五盞空心分二服門
蒲黃散治脬轉不得尿蒲黃滑石各等分
蒲黃散分為末每二錢雞子清調丁雄

滑石散治前子大腸轉得尿寒水石二兩滑石寒水
取五升每服一升

葱白湯治小便卒暴不通小腹膨脹氣上衝心悶絕
右剉水五升煮取二升分三服。○王白
參木散治孕婦轉脬小便不通。○王白
薑三片大棗二枚炒滑石各五錢右剉作一
田螺肉擣膏或生葱汁調貼。○王白
必飽食氣傷胎系弱不能自舉而下壓膀胱故
婦九月轉脬尿閉脚腫形癆脉左稍和而右澁
急婦轉脬脉細氣弱胎手入產門托起。○王白
恐加急滿令產婆以香油抹手入產門托起。○王白
而服四貼次早煎。○王白
加急滿令產婆以香油抹手入產門托起。○王白
恐加急滿令產婆以香油抹手入產門托起。○王白

原出如注。又洪將孕婦倒竪起胎自墜轉其尿。注出勝於手足太陰之脈也。又曰：陽氣發於頭，陰氣發於足，故足太陰之脈，當逆流而上，故曰倒竪。此言其理也。

欲水大小是關於便格。曰逆不營陽不升，煎小便也。氣格熱陰格開得故氣和不入便不傳。兩口者在陽寒者盡。曰不則其正不通。寸四吐丹易在其其關得血則欲散通亦此俱倍逆。因位胃熱命陰相留陽府其潮門股內謂證盛名上小病中之而陽營之府則尿。不之紅之多曰曰下便名遇氣死俱齒血盛陽注又不願謂陰死關格俱不關絕格矣。盛曰留矣。承出汎欲。之陽寒格氣病通格不者。樞靈不格之邪不勝將令關三關在其口也。故寒入甚。得陽則在和於孕不格焦格上證脉瞞日在熱寒關相氣陰五陽手婦食者約乃熱嘔大。關胃在之則營不脉藏脉托胸此謂約三在逆於內岐中下氣不散盛則不潮堅謂肺者焦下而入經。水焦無得曰則矣。陰和氣不約故小迎曰關葉填出小關陰脉則之覺行之也便四人若不塞曰便格氣氣不氣有也。病明不信迎不下三關格關不太和留絡亦長也。通名脉得故便無則格得盛陰之也。時猶九天者曰大小曰躁入吐者相則脉氣。

新吐水以也砂便審
水下煎利不石之死
通陰二鴻服以吐大藥而
先陽三一又調不便呻活
以熨火十時胃下秘。只
冷法次齊承則肛一此
物又每出帶氣下門小一
熨名次有末湯焦脫兒人
小冷飲膾糊一何出小耳
腹熱一有丸兩以一溲兆孫
幾熨盞血芥加開二不。
次安其涌子牽不寸通關
後治病泄許牛令戴號格
以脬如既六子飲入跳忌
熱轉失之十頭水曰旋用
物及和今丸未則此轉淡
熨二飲吞三小下下滲
如便前不
下瀉利則利
上河何塞減小

掩脣詣

紙。白角同通。良膳方二。也藥調轉敷。脖直切。封不中味。小竊二反。臍一入厚。通自擣便。○藥下證於鋪。口通通成不小。須自內諸腹益。於臍女餅通便。兩轉以藥內上。患法入封麝閉人。矣甘草節失救驗。人以用臍白皂上半田。各買水煎。內磁角用夏螺末生處如湯則。用瓶煎布。末生處如湯則。蓋滿湯線填擣劑泉飲死。一盛洗縛臍細之涌之以。捻水陰定中封不此及甘。填以戶下上臍可救藥遂。之有內用上急之。末至水。倒字翻皂即處。

難治不治

掩臍法。良臍二方。同良臍。買方二。轉藥也。藥調轉。直敷臍。入厚臍。下證於鋪。內諸腹益。須自內上。以藥內上。兩轉甘不即用。人矣。各小草效通大。神父驗炷。煎救來。前煮。之。藥遂。可救。死飲泉劑。填噙。線湯滿蓋。便餽水二。人半。頭闊人半。水二餽。便蓋滿湯線。填噙。劑泉飲死。之。以。之涌。通即一盛洗縛臍細。氣滿藥錢。及甘。不此。及甘。中封。不此。及甘。外通短張。即右散。填以戶下。上臍。可救藥遂。之有內用。用上。一急汁末。淘字翻皂葱。即處之至水。格不得小小。研勻。作病通研。開不格。

小便不禁 死呻吟

死小便不通
呻吟○傷寒
遺尿

此爲陽脫。寒熱病及風不溫治在膀胱也。○凡視關格遺見者頭死汗門者。○水泉不自知覺是膀胱也。○不胸藏膀胱也不詒約死汗門者。○尿不出不自止者。○納經食一元三日。○

便不不禁死小
門便
遺者。不
通傷
寒此
熱爲病陽
水出
不及膀胱
所注泉不
自之。尿熱爲
病陽
謂流水出
之。下下謂流水出
焦爲之。下下謂流水出
虛貫本肺焦焦所注泉不
及膀胱
也通在氣虛蓄出也不自風不
仲也腎虛寒血多納止知溫治
景植其則不與而○者覺狂
是也言○
末尿能虛色腎是也言○
以瞞下下經在色溫勞白與膀胱直凡
加散鴻淋小參○焦焦曰肺變制內焉膀胱○視關
山合加瀝便甚小不竭下則卒水損是膀胱遺格
葉解益不不補便歸則虛知遺液則以俱藏膀胱見
更毒智禁禁之遺則遺則天失則便遇虛也不者頭
五湯仁乃色不失遺尿遺一無便尿夜內證約死江
味猶如陰赤愈者復失尿之度尿自而氣曰為門者

酒各一浸
熟兩末酒
半地或酒
黃杜桂沖當
炒歸炒石酒
洗解子鰣大
各酒洗空二
兩兔乾董炮絲
桂子酒心各一
巴戟雨戰

參芪湯治氣虛遺尿人參黃芪蜜炒白朮
黃白朮陳皮各一錢益智仁研八

當歸
升麻

補脬飲
片肉棗二個
小治便婦五枝
不入水分煎草
利因空心三分
黃產心三根
絲傷服分量
絹脬服八到十
生小便者使一
絹筒一尺禁火
剪或附貼子薑
碎漏白濕糞三

卷之三

雞腸散治小兒遺尿不禁多因脬寒或稟受陽氣不
束二錢梓桂水煎龍骨各二錢半右剉每二錢米
煎空心服或為末一錢米薑三片桑螵蛸蒸谷
雞肫散治小兒遺尿雞肫右為末一具雞腸一
錢酒一調服燒存錢酒調下
大免絲子元治脾氣虛寒小便不禁兔五味子酒
附肉子

錢右爲末酒糊和丸梧子大空心溫酒服或鹽湯下五

草香元治半鹿首酥灸肉蓴蓉酒浸當歸酒洗各五錢龍昌蝦柱螭粉巴戟赤石脂禹餘粮米糊和丸
白薑益智仁乳香荳二錢半右為末
梧子大空心鹽
湯下七十九
既濟丸治脬氣不足有陰火小便不禁兔絲子酒燒當歸
智仁炒白茯苓韭子炒肉蓴蓉酒燒當歸
既濟丸益智仁氣不足有陰火小便不禁兔絲子酒燒當歸

濟丸治脬氣不足有陰火小便不禁免絲子酒當歸
益智仁炒白茯苓韭子炒肉芙蓉酒羌當歸

熟黃肉地酒黃蒸各五錢黃柏知母並鹽水炒杜子一錢右為末安麪粉和山茱萸丸

東西歸金門卷

草芩加呻
飲方散薊
子見黃芩
色鮮者如黑
豆汁與小腸
虛熱腎與膀胱
道赤散金妙
防黃湯火散
也五方
宜觀去
五淋甘

增一味道赤散治血淋痛生乾地黃木通黃芩車前子梔子仁川芎赤芍藥甘草各一錢右

金黃湯治小便出血水道澀痛
車前子一錢半
滑石一錢半
芒硝一錢半
硝各五錢
為末每取五
錢空心水煎服

小魚飲子根滑石通草蒲黃沙鷄節竹葉當歸山梔仁甘草灸各七分右劑

沫尿赤淋瀝宜八正散。坊見。元散暑視以加梔子導赤散煎。二錢加木香。橘皮。茴香各一錢。為末。空心服。

This image shows a vertical strip of aged, yellowish-brown paper, likely a book cover or endpaper. The paper has a textured appearance with some minor discoloration and small dark spots, characteristic of old paper. The right edge of the strip shows the binding material, which appears to be a dark, possibly black or dark brown, fabric or leather. The overall texture is slightly rough and uneven.

心點白服內湯小便清滯常有餘瀝不盡小腹脹滿宜沉香散通

散氣益元散加木香、桔梗、茴香為末。上法點鼻，治氣淋小腹脹滿，糞子赤芳藥各七錢半沉黃芪、枳根、黃芩、牛膝煎服，加

背脊石葦滑石玉不留行當歸各五錢陳皮青
皮文香白芷各二錢半右爲末每二錢空心以
大麥前芻調下鹽口剉取一兩煎服名沉香飲
通秘散治氣淋痛不可忍香附子陳皮亦效
分劑五錢空心水煎服得

通忽爾六便通泄石塊自小便膚指○蓋元嚴偏主石淋湖○石淋宜石燕丸滑石散。石韋瞿麥子燒赤醋淬三次研散水飛砂散鵝砂散。石燕丸焙乾語子草。

大空心以瞿麥燈心煎

滑石散

治沙石淋病割滑石石膏各五錢石韋瞿麥

鵬砂散

治沙石淋急痛鵬砂琥珀赤英蓼蜀葵子陳門煎湯空心調下

淋病有八

沙淋心調下

膏淋

尿出如膏莖中澀痛如膏浮凝如脂癭

鹿角霜丸

宜鹿角霜丸秋石元海金散香兒散

一以

年患膏淋三年藥無效火無少減戴人見之

日惑

之疾也亦曰白三實由腹熱非虛也以

藥行毒

通瘻三汁又鴻漸散

米糊和九

橘子大空心煎下

秋石元膏

治濁氣干清精散而成膏淋黃赤白黯如肥

海金沙散

治膏淋海金沙滑石各一兩甘草二錢半

香兒散

治血淋及沙淋膏淋如條痛如刀割真麝香

沙淋

陰莖中有砂石沉在盆底膀胱陰大煎熬津液凝結輕

二神散

治砂石散苦拔散琥珀散

蜜沙調下

急痛海金沙二錢半滑石二錢半

金石散

治砂石淋作痛石首魚頭中骨三對大

苦杖散

治砂石淋每尿時器中刺剗有聲痛楚不甚
乃安下砂出盡

琥珀散

杜牛膝榔細剗每一合兩一水五盞煎耗
其四留其一去滓以麝香

琥珀散

治砂石淋各二錢水通當歸木香
薑金篇蓄各一錢右為末每三錢以蘆葦葉

冷淋

必先寒標小便澁數寢中腫痛呻吟亦有甚冷而
淋者其證先寒戰而得溲便蓋冷氣與正氣交爭

生附湯

治冷小便澁痛甚寒藥附子生滑石各
附湯七分水通半夏製瞿麥各一錢二分右剗作

生附湯

治冷小便澁痛甚寒藥附子生滑石各
附湯七分水通半夏製瞿麥各一錢二分右剗作

生附湯

治冷小便澁痛甚寒藥附子生滑石各
附湯七分水通半夏製瞿麥各一錢二分右剗作

生附湯

治冷小便澁痛甚寒藥附子生滑石各
附湯七分水通半夏製瞿麥各一錢二分右剗作

木香湯

治冷小便澁痛甚寒藥附子生滑石各
白芍藥青皮茴香檀香澤鴻陳皮甘草各七

木香湯

治冷小便澁痛甚寒藥附子生滑石各
白芍藥青皮茴香檀香澤鴻陳皮甘草各七

諸淋通治

淋證所感不一或因房勞或因忿怒或因醉
氣動生火或因厚味蓋房勞陰虛大動也忿怒者

諸淋通治

淋證所感不一或因房勞或因忿怒或因醉
氣動生火或因厚味蓋房勞陰虛大動也忿怒者

諸淋通治

淋證所感不一或因房勞或因忿怒或因醉
氣動生火或因厚味蓋房勞陰虛大動也忿怒者

諸淋通治

淋證所感不一或因房勞或因忿怒或因醉
氣動生火或因厚味蓋房勞陰虛大動也忿怒者

鴻腎湯

治淋急甚者宜用此大黃二錢剉成散婦人

鴻腎湯

黃各一錢玄參細辛各八分生硝赤茯苓黃芩各六分甘草四分右剉水二盞煎藥至一盞半入大黃煎至七分去滓下芒硝攬勻空心服

麝金黃連丸治小腸膀胱積熱或癃閉不通或遺尿不禁或白濁如泔或膏淋如膿或如涕子水或如沙石米粒或如粉糊俱熟證也悉主之滑石白茯苓各四兩黑牛頭末三兩黃芩大黃琥珀各二兩麝金黃連各一兩右為末水九十九子大沸湯下五七十九丸

三因琥珀散治五淋澀藥痛小便出膿血琥珀海金沙煎湯調下四根心以萱草根

石韋散治諸淋滑石二錢勻水煎服石韋木通各一錢當歸王不留行甘草各五分右為末每二錢空心以小麥煎湯調下四錢○或剉一兩水煎服亦可

五淋散

治五淋赤芍藥山梔仁各二錢當歸赤茯苓

各一錢條黃芩甘草各五分右剉作一服空

心水煎

醫

通草湯

治五淋通草葵子茅根挑膠瞿麥當歸蒲黃

貼入薑五貼空

醫

必效散

治一切淋當歸生地黃赤茯苓滑石牛膝山

貼入燈心一團空心水煎服

醫

海金沙散

治五淋酒洗木香雄黃海金沙各五錢右剉作

好酒調下

醫

澹寮五淋散

治五淋施子仁一錢半赤茯苓赤芍藥

陳各五分右剉作

每二錢臨帖

心水煎服

醫

一方

治諸淋四苓散一錢益元散二錢施子仁

一錢右剉作

一貼水煎空心服

醫

貼空心水煎服

醫

附

諸淋四苓散一錢益元散二錢施子仁

一錢右剉作

一貼水煎空心服

醫

四

白茅湯

治

婦人產後諸淋無間膏石令熱皆治之白茅根五錢瞿麥白茯苓各二錢半葵子人參

紫貝一錢二分半蒲黃桃膠滑石各七分甘草五分

入薑三片燈心二十莖空心水煎服

附○或為末每二錢木通湯調下

利尿分二服

小兒藥毒成淋

一年少自初生七箇月發也大痛地呴大

輕則濇重則弦視其形瘦而稍長其色青而蒼意其父必因多服下部藥遺熱在胎留於子之命門而然遂以紫雪和黃柏細末丸梧子大晒十分乾門而與二百丸作一服經二時又與三百丸作一服壓之又經半日痛大作連腰痛

腹木道乃行下如漆如粟者一大椀許其病減一貼

率以熱湯下以食物壓之又經半日痛大作連腰痛

分之八後以陳皮一兩苦棗子一大椀許其病減一貼

與之又下漆粟者

一合許遂安劑者

赤白濇

小便

而出

赤濇或白濇其狀澁面如油光滑不可吃

下凝如膏糊或如米泔或如粉糊或如

赤白濇

小便

而出

赤濇或白濇其狀澁面如油光滑不可吃

赤濇之病皆是

濕熱

內傷也

猶如大氣火則水渾濁而水

濁冬則清

土堅

而水清

此其理也水火既濟則土自

濁邪干水也

因脾

胃之濕

熱下滲入膀胱故使溲便

濁之證

因脾

胃之濕

熱下滲入膀胱故使溲便

濁或白

心與

小腸

主病屬火故也氣虛而熱甚者則為

嗜慾而致也

由思慮

而得之

主濕熱有痰有寒屬金故也

因脾

胃

濕熱

中焦不清濁氣滲入膀胱為濇門

血屬氣與廟疾帶下同

升麻柴胡或

星子元貽

益氣湯炒星子元貽

必蠟芩兼服加減

珍珠丸

九味丸

金蓮散加房勞傷腎者草薢分清飲小兒絲子元貽

白朮根入是虛火四物湯加蒼朮升麻柴胡或

星子元貽

丹

益氣湯炒星子元貽

酒煮當歸丸。最獨辰小秒，子苓湯加氣分加。腹妙飲充，道赤。痛散，觀赤。不斂○可。忍水白，宜火濁○。作分通赤，煎芳。寒清用濁，服藥。治飲芡宜韻，嘴東桑實加又。短蠶元末秘白。

星半蛤粉丸
心癇作湯糊下和
秀百治濕

治濕熱白瀉。蛤粉二兩。南星半夏並薑。各一兩。右為末。薑汁煮神門丸。

標榜

一兩青黛
乾薑散各三錢滑石粉各一錢
白湯下五七十九門和

金蓮丸

蓮丸治思慮心便赤濁石蓮肉白茯苓龍骨
天門冬麥門冬柏子仁當歸酸棗仁紫石英
遠志乳香龍齒各一兩右為末蜜丸梧子大
朱砂為衣空心溫酒或棗湯下七十九丸入
門

1

草辭分清陰

解分清飲以治小便 白濁凝脚 如
薑 蒲 菖蒲烏藥益
甘草五分右

蒼木難名丹

鹽剉一作一捻水貼空心正入丹治脾精不禁小便漏濁淋瀝不止手足
力乏腰背痠疼盍用蒼术等劑以斂脾

練精子鍛肉脰各為雨來右譯

精子劍肉腥各譯何精錢半生於烏炮也蒼木紙製四兩箇香炒川芎龍骨

四炒固真丸

炒固真丹崩帶等證
茶末一斤剉作四分一分以人
芒香青益各一兩同炒一分以川
雨同炒一分以烏藥川練子各一
酒醋同炒俱以大黃色爲度只取
茶末爲末以煮藥

酒醋打糲
腎脾來刺人
腎部微蟲

蠟芩元

一名喜元治

喜元治腎有邪濕不土及婦人白濤日帶氣不固便如治等

證

雪白芩四兩剉以猪芩剉二錢半同放於磁器中用木煮二十餘沸去猪芩取出來為末蔴黃

蠟芩湯

徐徐送下以小便清為度

得微微火燒出婦人白濤日帶氣不固便如治等

加減珍珠粉丸

治赤白濁及白濤通用黃柏根白皮一兩滑石二兩擣根

青黛乾薑炒褐色各五錢右為末炒神麴打糊和

秘精元

治下虛腰寒小便白濁牡蠣煅兔絲子酒製

標

大空心薑各等分右為細末酒摻和勻九如梧子大空心薑湯下之九十九明○一名固精元

固本元

治小便濁甘草灸三兩猪芩二兩半蓮花蕊

黃連各二兩白茯苓縮砂益智仁半夏薑製

予

大空心薑各等分右為細末酒摻和勻九如梧子大空心薑湯下之九十九明○一名固精元

半芩丸

治白濤即精門

白术各五錢煎作

加味清心飲

治心熱心便赤濁蓮肉白茯苓各一分石錢

菖蒲

蕪車前子白木澤鴻甘草各五分剉

一貼入澄心二十莖空心水煎服

麥門冬遠志人參各五分剉

妙應丸

治赤白濁牡蠣煅三錢龍骨辰砂菖蒲白茯苓

各五錢白蜜各二錢半右為末山藥糊和

芩益智仁蓮肉砂各二錢半右為末山藥糊和

雞清元

小便濁通用大半夏生為末以雞子清和丸

十九湯下五

米湯下五

夏清元

小便濁通用大半夏生為末以雞子清和丸

十九湯下五

米湯下五

十九湯下五

十九

白芍芩煎治赤白濁亦茯苓一錢益智仁草薢石

水火分清飲治赤白濁亦茯苓草五分右到水
升麻各七分甘草五分右到水

桑螵蛸散

小便白如稠米泔日數十次心神恍惚瘦

志蓋製石菖蒲蓋炒龍骨入參白茯神當歸酒洗

桑螵蛸散

此以女勞得之也桑螵蛸益水拌蒸速

歸臥以人參茯苓桑白皮煎湯調下蓋

鹽病白淫內經曰脾傳之腎病名曰病癓

小腹寬熱而痛溲出白液名曰鹽註曰腎脉貫脊屬腎絡膀胱故小腹寬熱而

脂肉如虫之蝕日內損削故云交接漸微也○夫

而脾受風邪傳於腎經邪熱內燉故其證小腹寬熱而

痛溲出白液病名曰鹽蓋邪熱內燉真精不守

故也宜肉蓯蓉丸。○內經曰思想無窮吟頑不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱發為筋痿吟頑不

而謂之癓也

子大空心酒

戴人曰遺尿閉癃陰痿將脾精滑白淫皆男子之

病也血涸不月腰膝上熱足墮盞乾癰閉小腹有

塊或定或移前陰突出後陰痔核皆女子之病也

肉蓯蓉丸

治鹽病肉蓯蓉白茯苓黃芪澤瀆牡蠣粉

子大空心酒

下三十九

而謂之癓也

膀痺證

溢于小便上為清涕○夫膀胱者津液之府氣

出故能出今風寒濕邪氣客于膀胱中則氣不能化

化則能出

肺滿而水道不通也足太陽之經從膀胱入絡

肺之類也屬風寒濕宜巴戟丸溫腎湯附

巴戟丸

治膀痺小便澀而不通巴戟一兩半桑螵蛸

續斷肉蓯蓉製生乾地黃酒洗山藥附子炮

續斷肉蓯蓉酒浸各一兩杜仲炒石斛鹿茸

子山茱萸官桂各三錢右為龍骨

右為龍骨

白芍芩煎治赤白濁亦茯苓一錢益智仁草薢石

水火分清飲治赤白濁亦茯苓草五分右到水

升麻各七分甘草五分右到水

右

酒蜜丸梧子大空心

下五七十九粒

溫腎湯

治脬虛小便不利赤苔苓白术澤鴻乾薑炮

莖中痺痛

童兒精未盛而御女老人陰已痿而思色以降其精則精不出而內敗莖中瘡澀而爲淋

復耗之則

八味丸料加車前子牛膝煎服取汗若精已竭而便愈

便則愈疼

八味丸砂礬倍附子較之凡此當滋化源不可誤用知柏淡滲之劑既鴻真陽復損真陰

津門○肝經氣滯

莖有熱正莖引膀胱刺痛宜參苓琥珀煎服加於子澤鴻養

連炒木通

龍膽草赤芍芩煎服兼服六味地黃丸

功觀為妙

熟盛莖中痺痛導赤散砂礬加梔子大黃門

丸○

致肝經血虛火燥宜補中益氣湯不能滋生金子水

四分琥珀

澤鴻柴胡當歸尾青皮黃柏各三分入參五分赤芍芩

分右剉作一貼

入燈心一團空心水煎服門

一方

澤鴻各一錢右剉作一貼空心水煎服明

三方

甘草梢末通各二錢青皮黃柏

交腸證

婦人小便中出大便名交腸證服五苓散

一方

澤鴻各一錢右剉作一貼空心水煎服明

三方

失於傳送名為大小腸交也

三方

又用補中益氣湯而愈春

三方

東晉書卷第十四

東晉書卷第十四

三

小便多寡 老人與壯年飲水無異多寡何也。日壯者如春夏之氣升者多而降者少。老者如秋冬之氣降者多而升者少故不同耳。

飲後即小便

內經曰飲入於胃游溢精氣上歸於脾。脾下便欲小便由精氣不輸於脾不歸於肺。病入飲入胃邊膚至膚上攻使口燥咽乾宜補益氣湯。靈樞曰人熟穀之液其氣悍以清故後穀而入先穀而滾出焉。

單方 凡四十八種有

滑石

能利竅以通水道為至燥之劑。

利小便。

硝石

治五淋及小便不通雪白細研每二錢勞。

是也。

淋

葵子湯下血淋熱淋並冷水調下氣淋木通。

勞。

湯下石林

陳紙炒溫不調下小便不通小麥煎湯。

勞。

海金沙

通利小腸治沙淋尿閉每取一兩入臘茶末和勻以生薑甘草煎湯調三錢服。

勞。

浮石

治砂淋澁痛右為末取二錢空心以甘草湯調下。

勞。

淋石

治石淋入尿中出小石也主石淋水磨服。

勞。

甘草梢

味淡者主膀胱中刺痛同木通空心煎服。

勞。

草薢

治夜多小便或遺尿又治尿數日夜無度剉水煎。

勞。

牛膝

療老人遺尿小便澁莖中痛欲死酒煎空心服。

勞。

車前草

利小便通五淋及癰瘍不透根葉擣取汁。

勞。

澤瀉

治五淋止小便澁數去脬中久陳積物煎服。

勞。

澤瀉

牛屎

刺熱小便癆小便不通
主貴屎小更不卒死

卷之三

雞勝

溫酒和服。○或燒爲末。溫酒調服。治一女食
鹽妙法。作臘。○不禁取。用燒。灰。○
肚脰裏黃皮。主遺尿及小便滑。數不用。
男用。○

金匱

尤良幹
法陵癃閉取陰蹻○海照
乙卯穴照
便淋閉關元灸三陰交即行間委中
大敦委陽大鍾行間委中
小便淋閉關元灸三陰交即行間委中

大使

大便原委

熟糲
自經曰
胃下大腸
傳小腸
入於會
為隕門
上口蓋
胃中水
小腸下穀
口腐

物出內經

一陽者，傳導之官化物謂之便也。

卷之三

○六府者猶陰之應受之則入之六腑爲六府食入謂呼陰不受之則入之五藏則入之五臟則入之頭於頭

○久風夏

必中殫泄。○春傷於風，飧於泄，則為洞泄。○內清氣留，攻氣在連，乃為洞泄。○脾下則生飧泄。○胃脾胃受

濕則不藏也

穀不分故大腸傳導而注瀉也。○倉廩是門戶不要也。註曰：是大腸之門戶，不得開閉也。

渴於○
恣腸腸
念虛折

下良化生故者謂陽
而二之間滯積
生者熱夜下之
熱卧門入始
與矣○臟
累被病也
合風因亦
易濕有曰
氣外二滯
分侵一下
則二者言
或者皆月火
雨令煩滯

水經

化
慧
而
生
熟
素
登
隱
合
從
棄
是
已
亦
古
亦

辨便名

脉法

世證有五
浮沉細閉者死大下者微沉虛
迫滿肥伏而結死沉浮病爲弱小滑
裏急瀉大泄後泄便注者有齶勿遲
血溢入腸重兩色食飲胃○寒為脉○無無微止者連暑
人腸老熱陰沉下害差小弱為者濕
參胃數便白則食泄○欲生緩
白濕至膾腸吐不脾人結結數病脉日不○數弱
未毒圓血鳴逆化泄虛沉左下脉○宜下自
亦腹而小切宜色大入數天連微凡○洪病止疾多
蒸痛不腹痛胃黃腸閉虛脉於小病無大旦雖且在
芩泄能痛宜芩宜泄結結遙尺吉身積病一發大夏
當瀉便宜五湯胃小脉沉為為浮涼不○餘熱有
歸下莖芩○風陽雀遲風陽洪脉病下行不熱
川如中藥散大湯泄啄若結者○脉病脉死者○
芎黑痛湯勦腸○大者是鑿二難者生微反弱死腸
白豆宣○門泄脾癥不風○尺治生滑小實○
芍汁大大○者泄泄治躁躁脉躋身大却者下○下
藜或黃棗小食者○鑿右結虛○熟子為死剗下膾
桂下湯泄腸已腹胃○尺之或大脉弦生弱脉痢血
皮瘀者泄瘻張泄○脉沉便大急脉○大脉脉

世證有五

甘草各一錢
粟米一撮
水煎服

胃參湯治陳皮肺胃濕盛酒瀉腹痛水穀不化蒼犬厚朴
肉桂甘草各五分白朮亦茯苓白芍藥各一錢
入薑三分大棗二枚水煎服

固腸丸治泄痢日久滑數瘦弱以此瀝之龍骨附子
白豆蔻枯白芩訶子皮各一兩丁香良薑赤石脂
醋糊和丸縮砂各五錢木香三錢右為末
梧子大栗米飲下三十丸
泄治一切泄瀉白朮白芍藥各一錢半
草朮五分右剉作一貼水煎服

藥也。門入要
燥濕湯治諸泄鴻白末二錢。白茯苓白芍藥炒各一
錢。半陳皮一錢。甘草炎五分。右剉作一貼水。
煎服。胞○此三白湯加陳皮。
一味也。一名木芩考。藥湯。

各藥甘草、芩、芍各一錢，厚朴、草豆蔻、煨陳皮分右剉作一貼水煎空心服。

四柱散 治元藏虛冷，臍腹冷痛，大便滑泄耳鳴頭暉。木香白茯苓入參附子炮各一錢，二分半右剉少許水煎空心溫服。

六柱散 治元藏虛冷，臍腹痛泄瀉不止。火剉少許水煎空心溫服。

暑泄 治煩渴尿赤，暴瀉如水，宜薷苓湯加白芍藥車前子。

暑泄 治煩渴尿赤，暴瀉如水，面垢脉虛煩渴自汗，甘露飲門。夏戶暴瀉如水面垢脉虛煩。

薷苓湯 治夏月泄瀉欲成痢澤瀉一錢，二分豬苓赤芍元散六和湯清暑益氣湯匙勦。

薷苓湯 治夏月泄瀉渴泄瀉或霍亂吐瀉滑石二錢，二分豬苓赤芍元散。

桂苓甘露飲 治暑煩渴泄瀉，或霍亂吐瀉滑石二錢，二分豬苓赤芍元散。

四芩散 梅草一錢五分箇燈心一錢右剉作一小入烏

虛泄 固倦無力遇飲食即瀉或腹不痛

升陽加木香縮砂蓮肉陳糯米為末砂糖湯調下空心門飲食入胃即下注或完穀不化者是虛泄宣

升陽除濕湯治氣虛泄瀉又思飲食困弱無力蒼术弱宜參芩蓮麻術散細胡防風氣虛泄瀉四君子湯倍白

升陽除濕湯治氣虛泄瀉又思飲食困弱無力蒼术

升陽除濕湯治氣虛泄瀉又思飲食困弱無力蒼术弱宜參芩蓮麻術散細胡防風氣虛泄瀉四君子湯倍白

參芩蓮术散治氣虛泄瀉人參白朮白芍苓山藥蓮

參芩蓮术散治氣虛泄瀉人參白朮白芍苓山藥蓮

養元散炒極少含糯米一升水侵一宿瀉乾慢火

養元散炒極少含糯米一升水侵一宿瀉乾慢火

加味四君子湯 討子炮各一錢右剉作一貼

加味四君子湯 討子炮各一錢右剉作一貼

滑泄 滑泄不不禁瀉不止大孔如竹筒直出無禁氣陷

滑泄 滑泄不不禁瀉不止大孔如竹筒直出無禁氣陷

八柱散 治滑泄不禁八參白朮肉豆蔻煨乾薑炒訶子炮各一錢右剉作一貼

八柱散 治滑泄不禁八參白朮肉豆蔻煨乾薑炒訶子炮各一錢右剉作一貼

禹餘粮丸 治虛寒滑泄不禁禹餘粮煅赤石脂煅炮龍骨萬全丸

禹餘粮丸 治虛寒滑泄不禁禹餘粮煅赤石脂煅炮龍骨萬全丸

各等分右為末醋糊和丸梧子大空心米飲下上寒滑泄米穀不化上熟下良薑縮砂厚朴各七

木香散治木香癥
各錢二半赤芍藥破寒
錢半亦芍藥陳故滑泄
各錢四半豆蔻皮紙泄米穀不化
猪肝亦豆蔻皮炒各一兩良薑縮上熱下
空心亦桂皮各一兩良薑縮上熱下
冷作熟桂皮各一兩良薑縮上熱下
冷作熟桂皮各一兩良薑縮上熱下
冷食桂皮各一兩良薑縮上熱下
之三重桂皮各一兩良薑縮上熱下
渴初重桂皮各一兩良薑縮上熱下
則微生藥桂皮各一兩良薑縮上熱下
飲酒桂皮各一兩良薑縮上熱下
粥不桂皮各一兩良薑縮上熱下
湯妨桂皮各一兩良薑縮上熱下
經大挑右吳砂冷口瘡各瘦
年同入黃芩為末每七
醋少許煮水欲許

脾泄

寫服急健湯春泄宜脾
亦固澁脾竊。者用泄
是中之丸。脾食蒼者
脾丸用泻入脾泄後白肢
泄多倒未體
宜。石脾久老飽厚重
老脂泄傳入鴻朴木香
入肉豆蔻去即寬乾薑
奉豆蔻久為腸虛謂之脉
養太乾薑不經年生血色
過飲之食類永細宣豆蔻
傷脾愈化砂土宣香
此不鞏腹。氣老宜六軒
常脾已宣君眞翻肚
常泄脫調菜子。微
泄宜宣中更湯脾滿

香砂六君子湯

調中健脾丸

熱不能分而津濕也
調中健脾丸 治肥腎氣虛早晚溏泄 白朮破故紙炒
芍子炮肉豆蔻煨各一兩 赤茯苓陳皮各一錢

各香人錢黃之
木厚朴齒

各各一錢黃連以吳茱萸煎水炒過七錢神曲六錢右為末

固中丸治脾子久

固中丸治脾久泄蒼朮肉豆蔻煨各一兩右為末粥
梧子大空心米飲下五七十九〇若加破粥

山楂麴末丸治

山查炒肉各一兩，瀉水常常泄。山查肉炒各一兩，瀉水常常泄。

卷之三

查麌术丸治老弱。當之宜冷以處二久破似神則腎無而晨紙骨四削泄此宣生弱神五宜名五名燒芍藥丸鼓猪脾味瀼飯藥炒入薑鰲五臍藏腎子泄和酒二丸肉脚味下丸泄散每丸炒兩養桂下子絞門宜棘五梧半夏大薑炒飲山食過查傷肉脾當尺○只靈丸五一湯歸脉腎微色四五更次下五錢炒常主虛泄響慾神更少初此五錢者腹泄陽門洞腎十右各常○是痛一多○泄虛丸為一泄脾也無次足老服感心咽末兩瀉

東國自雪錄

三
三

暴泄下太陽傳如太陰下痢有小便不通者

塘六硬腸物不能禁而卒然而欲

將漿水便藥溫不

散之禁治○暴氣宜○難○一布有累身散息脉下冷○微無汗

脉暴囉聲寒沉泄吐身弱宜此冷空氣漿為旨以水寒汗之不敢泄小便能朝惡便前無真以清湯甚丹童利寒者

背刀子

加廿五分治吐此爲緊病半
草一錢水二盞煎至一盞良
錢水二盞煎至一盞良

夏製
一壺二盞
陽烏
空心
通半雨
熟右乾
服為壺
燒龕末
桂附

真丹

餅弱和疏
丸黃生研
子大宋

白砂
三鎔
煅
亡
錢半
右
為末
水
微

久泄血氣此陰

經證難治，下痢不止，宜

脉沉遲手足厥宜散之用桂枝麻

元氣

○其本陷遂成久世告
世源則後尤肅
是風徵邪內

非補中益氣湯
防風四神丸

氣飲泄剋紙傳經筋
反食宜土肉變絡於
下不參而豆爲外內
降節求成羸瘵無宜
治泄起健亦山宜其麻
風久居脾是藥厚邪
邪則不凡陽則朴則
內太時除澼止枳歲
縮陰損濕肺心實氣渴
久傳其健者○湯安以
泄少胃脾腸火縮矣
不陰氣湯中泄○鞠之
而則溫有洞久之崩
為上脾積泄虛示
腸升散水屬不滑於
璇精訶也於止久四
轉微子和子肝用不勝
之散○經破愈布
○久木故多方

百九
鹽湯下

東醫書局影印

三十四

除濕健脾湯

治久瀉色蒼而齒疎倦怠食減白朮一錢半蒼朮炒白芍芩白芍藥炒各一錢

溫脾散

治久瀉虛冷滑脫米穀不化水穀入口即時直下下元

山藥炒乾薑炮桂附子炮黃連薑汁炒縮砂陳皮厚朴各一分升麻柴胡各五分甘草四分右剉作一貼入

訶子散

治久瀉不上方白芍藥煎服

泄瀉宜用升陽之藥

暑月霖雨時人多病泄寫了濕多

之竭又曰治濕不利小便非其治也。利之則客邪寒濕之勝口外入裏而甚暴若其陽也。茲以升陽之藥是降之又降復益其陰而重渴。各一錢半防風甘草灸各一錢右水煎服卽愈。

瀉與痢不同

泄瀉之證水穀或化或不化並無努責惟

之相雜或腸垢或無糟粕或糟粕相雜雖有痛不痛

痢疾諸證

胃氣則上乘精微之氣反下降是為

由滯衛不和腸胃虛弱冷熱之氣乘虛客於腸胃

之間泄久則太陰傳少陰而為水瀉虛渴身重微滿不知

古方則有青濃血及泄下近世並呼為痢疾

無論諸痢當取尾錢苦根即全正立三箇折半去核水二湯匙煎半和蜜溫服則無不效者

東醫書局影印

三十三

其實一也。○痢有赤痢白痢亦白痢水穀痢疎其
血痢嘔口痢休息痢風痢寒痢濕痢熱痢氣痢虛

赤痢

赤痢自下痢赤積身熱益元散治本門○赤痢卽血痢也。
白术煎加減平胃散地榆散固腸丸清六九坊見

導赤地榆湯

治赤痢及血痢地榆散當歸身酒洗各一錢半赤芍藥炒黃連阿膠珠荆芥穗各六分甘草煎五分右剉作一貼空心水煎服

加減平胃散

治血痢赤痢夫脾胃虛則血不流於四肢却入於胃而為血痢白术厚朴陳皮各一分甘草九分木香殼榔各五分右剉作一貼入薑

地榆散

治血痢赤痢地榆赤芍藥黃連青皮各等分右剉作一貼入薑

心水煎服

治血痢赤痢地榆赤芍藥黃連青皮各等分右剉作一貼空心水煎服

固腸丸

濕治血痢白皮根白皮焙乾方擣根白皮四十兩此藥性涼而燥須炒用梧子大空心米下飲

白痢

白痢於腸胃屬氣自大腸來濕石一兩為末粥用瀨梧子大空心米下飲

白安

白安

溫六丸治白痢益元散一劑加乾薑一兩右為末飯丸梧子大白湯下五十九丸

水煮木香元

治白痢及淡紅痢乾薑二兩鶯粟殼一兩

木香青皮陳皮甘草各一錢半右爲
末蜜丸彈子大熟水化下一丸嫩

寫白安胃飲
蜜炒當归酒洗白术
炙各三分右剉洗各七分
作一五七分
點空木半炒
心香入白芍
水乾參陳藥
煎薰炮皮酒
服甘白炒
薯蕷各一
草連肉黃芪

赤白痢

元固

三五
日三

服門丸治赤白痢吳茱萸黃連各一兩右以好酒同浸三日乃各揀取焙乾為末醋糊和丸梧子

大柴胡丸赤痢則
十粒以甘草乾薑湯
三粒以乾薑湯

子粒以甘草湯吞下自癒則
畫湯吞下赤白痢則各取三

卷之二

卷之三

卷之三

駐車元治赤白痢黃
一兩乾薑五錢

三五十九門
連阿膠元治赤白痢
兩右為末

及熱痢黃連三兩赤芍芩二
水調阿膠炒末一兩和丸梧

子下大空心九米
大五六十
治赤白痢
鷄粟茶
飲

殼 醋炒二錢 白芍藥一錢 半

分作一入參木香各三錢，點空心水煎服。

右劉平陳皮詩子草書各五

人養臘湯治赤白瘡
桂入參當歸白朮藥

及諸藥
八分木香
三分蔻子
一分草元
豆蔻各三分
七分薑
粟殼一錢
分肉九分

石坐作一貼空心水
痢脾胃氣虛則不飮能水

煎消泄亦化溫水服門穀猜柏不聚變而空

痢如煩燥或先便膿也○如惡寒脉

後見血非黃連不止此上部沉或腰痛臍下痛非黃芩不

叢地血門寒紫者泄血之除言也。嘗地除
榆痢下黑故亡稠是芍治蓋屬榆此
散空之色便津粘謂藥法瀆於不中
解施要者膿夜皆重湯也。瀆火除部
毒花知瘀血而屬劑主故而內此血
金湯諸血所火於黃之日便經下也。
花熱痢也謂就火芩暢行膿曰部○
散門皆腹瀉燥夫芍○血血瀆血如
芍導血痛屬腎太藥瀆則者瀆也惡
藥氣瘀後脾惡陰湯瀆便言而暢寒
柏湯惟重而燥濕和而膿病便○脉
皮黃黑異痢居主之便自因膿膿沉
九連為常屬下瀉是膿愈也血血先
赤阿瘀施腎焦少謂血調氣知稠見
石膠甚仁也血陰輕空氣行氣粘血
脂湯耳承_口分主劑大則而行裏後
況導門入氣○其痢老暢黃後血而惡便
人滯○湯熟受是○湯重止血後膿
參湯膿飭積邪先膿下自者止重非

芍藥湯治痢瀉而便膿血令行血則便膿自愈調氣則後重自除此藥是也白芍藥二錢黃連條芩當歸尾各一錢大黃七分木香檳榔各五分右剉作一貼水煎服

大黃湯治熱病膿血稠粘裹惡後重日夜無變大黃
分二次剉好酒二盞浸半日煎至一盞半去渣
蕩邪熱之劑也酒煎者欲上服芍藥湯以和之此滌
者頭外微皮毛也

黃芩芍藥湯治下痢腹痛身熱脈洪數黃芩白芍藥各二錢甘草一錢右剉作一貼水煎服腹痛甚加桂心三錢。一名黃芩湯。

道寸氣湯治下痢
芩白芍藥各一錢
黃連木香梗榔各五分
大黃黃芩各半錢
當歸二錢

主下利濁膠珠黃柏子各一錢二分半右剉作
煎服

分桂心木香檳榔甘草各三分

地榆散

治熟毒下痢血地榆犀角黃連炒葛根黃芩各一錢

荳蔻前

五分水煎服

解毒金花散

治熟毒膿血黃芩赤芍芩赤芍藥各一錢右剉作一貼入薤白五分水煎服

芍藥柏皮丸

治濕熱惡痢下膿血白芍藥黃柏皮各二錢白朮

赤石脂丸

治下痢膿血腹痛赤石脂乾薑各一兩黃連當歸黃連各五錢右為末水丸小

人參散

治酒毒挾熱下痢膿血腹痛久不差百藥無效博根白皮人參各一兩右為末每二錢空門八九克

人參散治酒毒挾熱下痢膿血腹痛久不差百藥無效博根白皮人參各一兩右為末每二錢空門八九克

噤口痢

心米飲調下忘酒類雞猪魚果菜等物

噤口痢

手足溫熱此乃毒氣上衝心肺敗毒散寒涼心煩

噤口痢

錢加蓮肉一錢陳米百粒薑三棗二煎服如過飲苦澀涼藥以致聞食先嘔山藥坐如小豆銀石器

噤口痢

一半炒一半生用爲末連湯罨下卽效

噤口痢

胃口熱甚故也宜參連米飲調下卽效

噤口痢

用溫熱藥及甘味此以火濟火以滯益去山藥加石菖蒲爲末粳米飲調下二錢散方或然入參參之

噤口痢

食鹽口不食亦由此脾虛空以參苓白朮散方或然入參參之

噤口痢

口瘡安倉廩湯開噤膏湯

參連湯

治噤口痢胃口熱甚黃連三錢入參石蓮安

如吐再喫但得一呷

便開仍用罨臍法

水煎

罨脣法

引熱令下行田螺二箇八麝香少許擣爛罨脣中以帛包定

倉廩湯

治噤口痢心煩手足熱頭痛此乃毒氣上衝連一錢石蓮肉七枚陳倉米三百粒入

薑三片棗二枚同煎服

鱠亦治熱痢

開噤湯

治噤口痢細茶五錢縮砂研一錢生薑五片右剉作一貼水煎露宿次早酉

石蓮散

治噤口痢石蓮子梗去蕊留心併肉研為末每服二分共擣罨脣中即食

解噤丸

治噤口痢黃連八兩剉生薑四兩切同炒令借此以通心氣便覺思食仍以東壁七

砂橘皮

為末八薑棗畧煎服佐之

橘皮湯

治噤口痢黃連八兩剉陳米飯和九楂子大下赤白痢陳米橘皮湯下

納臍膏

治噤口痢危重者用之立愈王瓜藤連莖葉經霜者晒乾燒灰香油調納臍中即效

休息痢

不差以致氣血虛而致渴飲八物湯

阿膠珠

黃連黃芩各少許阿膠加陳皮參苓白朮散並見內傷○休息痢

木根刮取白皮各等分右剉

木根蒼耳草根臭樗每服七錢入生

加味養臟湯

治休息痢真人養藏湯

皮烏藥茯苓右剉

薑三片棗二枚煎服

三根飲

治休息久痢如神五倍木根蒼耳草根臭樗木根刮取白皮各等分右剉

詞黎勒丸

治休息痢百藥不效樗根白皮二兩詞子肉五錢母丁香三十粒右為末醋糊和丸

神效丸

治休息痢膿血不止疼痛困弱當歸烏梅肉梧子大陳米飲入醋少許吞下五十九日三粒

神效丸

治休息痢膿血各等分右為末蜜丸梧子大空黃連阿膠珠各等分右為末蜜丸梧子大空

丸心厚朴湯下三十五

風痢

丸病甚者蠟丸
風痢惡風鼻塞身重色青或純下清水空蒼术防

空腹湯

方見吐門○風痢所下似痢非痢似血非血空

露宿湯

治風痢純下清血杏仁去皮尖七箇苦木蒼

皮半箇青皮二箇甘草一寸右剉作一貼

寒痢

方見吐門○風痢

入薑三片煎露星一宿次早空心服

皮大頭皮鷺脣銀烏梅一箇荳果一箇酸石榴

黃連補腸湯

治大渴虛冷痢下青白黃連四錢赤芍

芩川芎各三錢酸石榴皮五片地榆五

錢伏龍肝二錢不剉八錢

作一貼空心水煎服

赤石脂散

治冷痢亦可腸滑泻豆蔻煨一兩縮砂五

錢赤石脂甘草炎各二錢半右為末每二

分煎服

濕痢

調錢粟米飲

下痢如黑豆汁半夏厚朴蒼朮

芩各七分

右剉作一

加味除濕湯

治傷濕下痢如黑豆汁半夏厚朴蒼朮

芩各七分

右剉作一

熟痢

寒面垢或面如塗油齒乾煩冤燥渴引飲皆暑證

芩各七分

右剉作一

戊己丸

治濕痢和元梧子大空心米飲下五七十九丸

芩各七分

右剉作一

熱痢

寒面垢或面如塗油齒乾煩冤燥渴引飲皆暑證

芩各七分

右剉作一

重者

其不空輕用附子等熱藥宜酒蒸黃連丸門方

芩各七分

右剉作一

熟痢

其不空輕用附子等熱藥宜酒蒸黃連丸門方

芩各七分

○熟病者身熱渴小便澁少大便惡痛所下黃赤色門
○下痢壯熱須用黃芩芍藥湯最妙

烏梅丸 治熱積散瘀，治腹痛，下血黃連，和丸米飲，下梅肉當。○熟劑，宜烏梅丸，不寧胃散加白芍，歸元湯，是方湯見前。

牛乳湯治氣痢
空心服效○唐太宗若氣痢百方不差有衛士進此方服之即愈

虛痢 氣弱困倦。穀食難化，腹微痛或大痛並無努責門。○滑痢與虛痢同。虛滑不禁甚，則氣血俱脫，血虛。

○氣虛色白如鼻涕凍膠理中湯加太香肉養
人參白朮地榆桂枝茯苓門入○如力倦自覺氣少惡食此為
虛回而病自止呻吟○痢為
寒虛證空用補氣血之藥虛物易訪覲，涌中益氣陽

防覲內傷。○痢稍久者不可少下胃虛故也。調守氣理。○久痢三虛證危困。剥前後。氣湯加味香連丸擇用之。脉細皮寒氣少泄利。前後如漿粥入胃泄注止則虛者宜大劑下。是也。如飲食不入是也。如飲食不入。

者活矣。○虛寒痢脫肛空訶子皮散
調中理氣湯治虛痢氣弱困倦白朮枳殼白芍藥
木香五分右剉各一錢蒼朮陳皮各八分厚朴七分
辰化台同開里之利水煎

大斷下丸

治久痢滑數消瘦困弱龍骨附子炮白各礬

訶子皮散

治虛寒赤白痢脫肛御米殼蜜炒橘皮各分

積痢

成痢色黃或如魚腦漿腹脹痛惡食入滯氣滯也物積不

欲出氣滯而不與之出所以下墜裏急乍起乍止諸有積者以肚熱經痛推之○飲食傷飽者注下酸臭

感應元

治積痢久痢赤白膿血相雜肉豆蔻煨白薑

炮丁香各一兩巴豆百粒去皮心膜去油為霜杏仁去皮尖雙仁麩炒另研酒煮蠟四兩清油

蘇感元

生熟飲子○食積痢宜保和丸方○傷積滯則糞白

感應元

治積痢久痢赤白膿血相雜肉豆蔻煨白薑

炮丁香各一兩巴豆百粒去皮心膜去油為霜杏仁去皮尖雙仁麩炒另研酒煮蠟四兩清油

令

熔化拌和藥小劑

米飲

調服或作丸藥豆

大白湯

吞下十九丸

蘇感元

治積痢腹內緊痛麝香蘇合元帥門四分感應元

生熟飲子

治大人諸痢及小兒虛積痢日夜無度鷺粟殼大者四箇及去瓢帶半灸半生陳皮一

片半

半煨大生半炒甘草二寸半生半灸烏梅二箇半生

半煨黑豆

六錢作兩片半生半煨訶子大者二箇半生半灸白薑

术二塊半

生半煨當歸二寸半生半煨黃芪二寸半生半灸白薑

體粒

虛此九性燥若滯氣未盡不可遽用丹白薑半夏痢

藥炒白朮

既散腸胃既厚則水穀自分何患瀉痢哉

之七

八穢積已盡猶未實當以炒芍藥

久痢

治久痢已減十之七草陳皮茯苓煎湯下固腸丸三下

體粒

虛此九性燥若滯氣未盡不可遽用丹白薑半夏痢

藥炒白朮

既散腸胃既厚則水穀自分何患瀉痢哉

之七

八穢積已盡猶未實當以炒芍藥

體粒

等藥滻之甚者添壯礪須以陳皮為佐恐太滻亦能作痰也○久痢不止服理中湯益甚此痢在下焦赤石脂禹餘粮湯之勸門理中者理中焦用此以固其下焦故也○久痢宜大斷下元萬全丸治久痢加減益氣湯木香散實腸散治久痢及血痢甘草灸一兩木香黃連各五錢同炒鬚粟殼生薑各五錢同炒右為末入飲調下二錢軀少許空心米

加減益氣湯治久痢疲弱甚不能起床白朮白芍藥縮砂地榆各五分升麻木香白豆蔻御米殼醋炒甘草灸各三分右剉作一貼窄心水煎服驥榔白皮散治久痢諸藥不效榔根白皮一握梗米一合葱白一握甘草一寸政二合右水一升

頓服半升

實腸散治久痢不分赤白四味此藥搜出黃冀來山藥炒一兩炒黃米一合右為末用砂糖調熟湯

疫痢

後用清米湯漱口最效漸

一方一家之內上一下傳染長幼相似是疫毒痢也

董茶湯

治痢疾腹痛老生董春茶葉等分同煎服能助陽茶能助陰况暑毒酒食皆能

靈瘡

解之不問赤白冷熱痢去董皮幹○熱痢留董皮冷痢去董皮幹○靈瘡氣餌於藏府下血如雞肝雜膿瘀久病不已名曰靈瘡○靈瘡氣餌五石湯丸所致其血自百脉

茜根丸

治靈瘡茜根犀角升麻地榆當歸黃連枳殼白芍藥各等分右為末醋糊丸梧子大

米飲下五

元董墨

羚羊角元

治蠱症痢黃連二兩黃柏羚羊角镑各一
兩半白茯苓一兩右為末蜜丸梧子大茶

清下十九錢五分

七

五色痢

痢疾五色俱下乃脾胃食積及四氣相併以至甚盛下痢腹痛大便如膿血雜當先通利之○脾胃為水穀之海無物不受常

兼四藏故痢有五色之兆

散黃連阿膠湯二方見上○五色痢宣

秘方養臟湯

治五色痢黃連不香烏梅厚朴杏仁甘草炙令

絲瓜散

治五色痢及酒痢便血腹痛乾絲瓜一

神效參香散

治下痢五色及噤口痢蘆粟殼各一錢半陳皮枳

七分左剉作一貼入黑豆三

丁粒大棗二枚煎服文交葛

八痢危證

一曰熱亦二日積酸臭五日冷白三日芩青六日芩熱相加赤白四

時行有血

八日瘡口瀉口一曰冷瘡白積

黃白積或見五色

三日冷熱不調積下赤白四日瘡白積

黃白積或見五色

五日驚熱不調積下赤白六日瘡白積

小駐車兒真人養成

七日瘡口瀉口一曰冷瘡白積

痢疾腹痛

下痢腹痛者以苦肺梗經發之氣方

用參芪

白术為佐惡寒者加薑藥甘草為君當歸

粥及肉稍多作痛宜

益元散調胃承氣食以桂皮加黃柏啖

血腹痛

不煎水益元散調胃承氣食以桂皮加黃柏啖

丸薑茶湯

方見上○瘡口瀉口一曰冷瘡白積

香連丸

治走血下痢腹痛及一切諸痢黃連一兩吳茱萸三錢水浸一夜同炒去茱萸木香

見

二錢半右爲末醋糊和丸梧子
大空心米飲下二十丸

神效越橘散治下痢腹中滿痛不可忍此名陰陽反錯不和之甚大羌子仁良薑各三錢石

爲末米飲調下二三錢

痢疾裏惡後重裏惡寒迫惡痛是也後重者大腸墜重而下也其證不一有因火熱者謂火性而急速兩能燥物是也有因氣滯者此大腸之氣壅而不宣通也有因積滯壅盛者是有物結墜也有氣虛者此大腸氣墜而不能升也有血虛者虛坐努責是也治法火熱者清之氣滯者調之積滯者去之氣虛者升之血虛者補之微上而重用本因邪壓大腸而墜下故大腸不能升而其重因大黃橘皮輩治其所壓之邪今邪既鴻而其重因紫劑固其渴收其氣亦愈也明○後重但用木香檳榔調氣及六黃湯下○自古治下積至丹治

痢疾大孔痛連加炒乾薑煎服歸身研之陳皮仁之當歸者虛氣陞下也

煖身病之孔開如空洞沉小空溫之如暴病身熱脉浮洪宜清行
身生瓦官安血虛則裏惡故用當歸身研之陳皮仁之
行溪始用積少但虛坐努責此爲亡血證倍用當歸者虛氣陞下也

腹中不寬快也虛坐而大便不行

固腸之劑如大虛也尾片圓如銅錢大燒紅投童尿
中急取令又乾紙裹安痛處以入參當歸陳皮濃煎
薰之燒因

痢疾宜下痢初得一二日間元氣未虛必推蕩之此通因通用之法用大承氣湯或調胃承氣湯下

謂為胃之氣下痢十脉此後
以下佐滋溫等之已○餘亦看
泄迫甲潤善湯空差下日大氣
立熟者之輕行亦大至痢後累血
非皆於秋清減承其脉亦言調
更殺屬下積氣下氣年反可之理
之火痢行緩之湯月渭下氣五
而熱清即以大糞日者之血日
何所自立甘黃口時當虛弱後
潮為者局章之仲復復有口者不
猶方之寒景發所下雖可
可例目其流者云痢一下
其以飲性痢以下腹二脾
裏熟以善可病之滿日胃
惡藥渴走下乃為不虛
後為液佐者盡愈實可故
重主津以意故脉當下也
經滌滌厚膚也○下實者
所藥腸朴承當下之者○

立效散治熱炒連積二氣兩白後延氣胃去連炒燥其病肉法又者又蒸
滯右以膿乃之及膿則作矣濕毒之桂色曰竭曰病
之為吳血用疾粟為遍劑而微皆初色黑盡之在者
病末藥斷待殼先數入○加良宜黃入者身表宜
黃每莫腹下其龍不自烏刺辛法立山黃和衣者溫
連三二痛之腹骨可跡梅疾熟也效查色之熱發之
清鐵兩裏空水急後礪用礪它以之○一泄地者內在桂
根心拌後重殼黃破酒同炒一服去氣立止黃
此殼治麩連治熱炒連積二氣兩白後延氣胃去連炒燥其病肉法又者又蒸
滯右以膿乃之及膿則作矣濕毒之桂色曰竭曰病
之為吳血用疾粟為遍劑而微皆初色黑盡之在者
病末藥斷待殼先數入○加良宜黃入者身表宜
黃每莫腹下其龍不自烏刺辛法立山黃和衣者溫
連三二痛之腹骨可跡梅疾熟也效查色之熱發之
清鐵兩裏空水急後礪用礪它以之○一泄地者內在桂
根心拌後重殼黃破酒同炒一服去氣立止黃

木香道氣湯

治癆初起腹痛裏急後重亦自消

各一錢二分厚朴 檉榔各一錢當歸尾
赤茯苓各八分右剉作一貼水煎服

痢疾通治藥

或下紫黑血或如魚膩或如皂屋漏水皆裏急後重類

黑豆汁或如魚膩或如皂屋漏水皆裏急後重類
欲登廁日夜無度通用水煮木香膏六神丸香連

丸吉見加味香連丸白术安胃散百中散和中飲
易薦斷下湯寧胃散均見救命延年丸○瘧後痢

黃連木

香湯

水煮木香膏

治一切諸癆 鳥巢殼蜜炒三兩縮砂肉豆蔻煨乳香各七錢半木香丁香诃子

藿香當歸黃連厚朴陳皮青皮白芍藥甘草炙各五錢枳實乾薑炮各二錢半左為末蜜丸彈子大

水一盞棗一枚同煎至七分去棗和滓服

瑞

六神丸

治諸癆要藥黃連木香枳殼赤茯苓補鴉鴉炒麥芽炒各等分右為末神鴉糊和丸梧子大

加味香連丸

治諸病之總司也黃連炒二兩吳茱萸泡炒一兩木香一錢白豆蔻煨一錢半

白朮安胃散

治一切瀉痢無問膿血鴉粟殼蜜炒二錢赤茯苓白朮車前子各一錢五味子

和中飲

治癆無問赤白久近無不效但發熱葉口者不可服鴉粟殼醋炒一錢半陳皮白朮赤茯苓

百中散

治一切癆無問厚朴 薑製各二兩半右為末每二三

烏梅

內各五分右剉作一貼水煎服

芩芍藥各一錢

陳倉米二錢草果仁七分甘草三分砂糖一錢

赤芍藥各一錢

烏梅一箇右剉作一貼薑三片棗二枚

煎服

東坡醫案

易簡齋下湯論

治一功刺尤治虛滑痢
去筋膜帶蕕薈割醋淹炒擣為羹
鶴栗殼

廣雅

二作赤
服一赤
貼爹各
水各
一一

錢草
甘草
桑葉
五分
分草
果一箇
連皮
剝
七箇
煎至
一盞
片
棗
梅各
七箇
分

黃連木香湯

治黃瘧後，炒木香、白芍、砂藥、炒黃芩、炒木香、炒陳皮各一錢，當歸五分，右四味。

救命延年丸

治男女一切重病 黃連乾薑 當歸 阿膠
各等分右三味為末以醋煮阿膠令

卷之三

甚妙事
陰脾經以濕而為水泄之則傳變
為膿血痢是肝傳腎謂之賊邪故

卷之二

○脉寒
下弱難已脉
大急者自脉
小急者○手
為下足
未病溫
二脉易
繫數已
○有繫

卷之三

100

下同三毛

卷之三

泄痢吉凶證

陛下

半病如魚死○髓下者

痢半生

半死

○身

死熟
脉下

○短死不兼體一死爲厥不寒生血筒純
脉目門得微熱時體而冷溫死此身者血
大直○眠喘多死○溼醉若者是熱死者
○視泄汗不汗體腹四時脉乎大則○死者
身昏鴻不食渴○大肢脉不汗死唇○
熟冒久止者甚下而清還還○言身如下
○不不無死小痢脹而手反下之寒朱如半魚
鵝識止脉得便之四泄足微痢必則紅茅死腦躁
屎入手及○不證未真溫喘手兼生者屋○體身足
○皆足目凡利身清脉者者足證○死漏下者熱寒
發死寒利下或涼脫大生死厥詳內肥水痢半者難治
渴證脉不痢手能形是脉景仲冷之經漱者如生
○也虛禁諱足食泄逆不○無方云○死塵半治
咳春回脫身語厥小甚也還下脉可身內○腐死瞤
逆○頰熱直脊便是不者痢者豈熱經大
○痢躁脉視灸通逆過死脉灸無則口孔
互不發實反之易也十脉絕之熟死腸開
色治无者厥不安不五○手灸生寒辟如
○證氣皆躁溫差及日腹足而則便於脉下大

○食身有身體空結半者散熱之
○黃通脉當與風利之手沉用燥之氣太宜氣
○風利通於筋脉，當用沉按之手，沉則便也。太宜氣，太在挑，難明。
○燥陰血仁行。如氣陽老陽，當陽湯，歸之滌厚，見秘者，辛燥者，溫潤者，反硬陰，本曰。
○躁以俱為仁虛氣，杏仁入也。仁地類，腸補七者，秘辛燥者，不潤結之者，之陰。
○潤不仁衣陳入也。仁皮大宜俱，俱在裏，宜俱用治。桃也，開主九也，可之者，一結大陽結。
○腸通泄裏，皮大宜俱，俱所便用治。杏大仁寒方，胃結之主胃，一結大陽結。
○丸者實也，所以通泄，以燥杏大仁寒方，俱秘仁便麻鳴軟暢之實，際屬便結經陰。
○皂角郁之，元李風应用脉夜秘仁虛堅。胃而論太秘宜日結。
○活仁燥燥陳浮則當條則如秘虛秘有陰澁大結者實有不通也。黃牽牛散之期者丁四日。
○血毫以皮在便以萃宜大結而者實有不黃牽牛散之治。當潤角麻桃者氣難氣潤滋黃之秘能燥通也。
○燥仁子仁以杏行血燥養芒證者飲有糞以虛以食，虛以少結陽氣。
○丸潤仁酒手仁陰分湯陰硝有不食虛以燥散之，屬陰法劇。
○之加大陽陳血之之血枳虛能小秘苦實泄少結陽氣。
○血燥大黃明皮也，畫類潤實有飲便實泄少結陽氣。

燥宜潤腸丸潤麻丸蕎溟丸五仁丸小麻仁丸通
○風潤腸丸三和湯四磨湯六磨湯○氣帶參仁丸搜

大黃牽牛散治相火遊走藏府大便秘結大黃一兩

是冷者蜜湯調下解
熟者蜜湯調下解

半硫丸治老人痰結大便秘泄半夏薑製為末硫黃
研極細以柳木大便秘結大黃一兩木香檳榔

七宣丸治熱留腸胃大便秘結大黃一兩木香檳榔
和九梧子各五錢桃仁十二箇右為末蜜丸梧

予下溫水下
藥湯下五十丸

厚朴湯治大便虛秘白术二錢厚朴一錢三分陳皮
甘草各一錢半夏蔻九分枳實八分半桃仁

一貼入薑三片囊

二枚水煎服

當歸潤燥湯一名潤燥湯治血燥大便秘泄當歸大
地黃熟地黃桃仁生甘草各一錢生
貼煎將至半乃入桃仁麻仁煎至半空心服明
躁風潤腸丸治風熱鬱滯大便閉塞乾燥須潤燥和
仁二兩皂角燒存性一兩三錢大黃羌活各二兩半桃
仁二十丸有熱加大黃
防風當歸各三錢右為末蜜丸梧子大白湯下五兩

九角丸

九丸

皂角元專治風火大便秘泄羌活防風猪牙皂角根
殼桑白皮檳榔杏仁麻仁白芷陳皮各等分
右為末蜜丸梧子大溫湯下

活血潤燥丸治風秘血秘大便常常燥結此
潤腸丸治大便秘泄杏仁枳殼麻仁陳皮各五錢阿
下肚者荆芥蘇子子湯下

五十丸老入蘇子子湯下

九丸

潤麻丸

治血燥大便不通能潤之
當歸枳殼各一兩右為末蜜丸梧子大白湯

蕤沉丸

當歸枳殼各一兩右為末蜜丸梧子大白湯

和丸

心米飲吞下
丸空心米飲吞下

五仁丸

人產後便秘丸宜橘紅四兩另為末桃仁杏仁各一兩稻子仁五錢郁李仁炒二錢松子仁一錢二分半右各另研為末蜜丸梧子大空心米飯

小麻仁丸

治血燥大便秘結此
方與上潤麻丸同

通幽湯

治幽門不通大便難宜以辛潤之
泥當歸身各一錢半生地黃熟地黃各七分

灸甘草

水煎去滓調楨榔細末半錢服

和血潤腸湯

治大便燥結不通升麻挑二麻仁各一錢半大黃熟地黃當歸梢各七分生地黃各一錢半大黃各三兩當歸身各一錢半大黃各五分

和血潤腸湯

治大便燥結不通升麻挑二麻仁各一錢半大黃熟地黃當歸梢各七分生地黃各一錢半大黃各五分

參仁丸

治氣壅大便秘麻子仁大黃各三兩當歸身各一錢半大黃各五分

搜風潤腸丸

治三焦不和氣不下降胃腹痞滿大便秘澁郁李仁一兩木香楨榔青皮陳皮各一錢半大黃各五分

三和湯

治氣門大便祕也游滯大便祕麻子仁大黃各五分各濃磨水取二分盞煎三五沸微

六磨湯

治大便祕滯有熱者四磨湯加
大茴枳殼如上法濃磨汁服

溫服空心

腹惡心不食。正是老人風秘藏府壅滯氣聚。胃兩脹心惡心不欲食。上至於巔則頭痛。神不清服此。

三仁粥

枝藏兩府流暢諸疾自去矣。糞十餘粒。治大便秘結老人虛人皆可服。桃仁海松子許。

脾約

證必傷脾。云胃強難寒陽明病。自汗出小便數則津液內竭。大便

日便數。則津液之不四布。但輸膀胱。而無藏也。清化脾土。清健而運行津液。則陽氣得。而陰火不熾。肺失傳送之職。宜大便燥。則肺耗則虛。故小便通矣。今此力用之於熱甚而氣實。與西北人與熱雖盛。而氣血壯。為須知在

不實者

將見

脾愈弱

而腸愈燥

以潤燥

矣。須知在

脾約丸

一名麻仁丸。治小便數大便難。名爲脾約證。

大便不通

大黃蒸四兩枳實厚朴赤芍藥各二兩麻子仁一兩半杏仁一兩二錢半石烏末一錢半。水大空心溫湯下五十九丸。

胃有燥龜三焦伏熱。則津液中乾。此大腸之挾熱滯也。腸胃受風。潤燥秘滿。此風氣燔灼也。若氣不下降。則大腸之挾冷然也。腹脹痛閼。胃痞滿。必有其證矣。熟者三黃丸。大腸之虛者。半硫丸。宿食宜脾積元風。宣麻仁花。通潤腸九微利之。不可用峻利之藥。○古方通大便。皆用降氣之劑。蓋肺氣不降。則大便難。於傳送用本仁枳殼沉香。訶子等。氣不降。則老人虛人。津液少。而秘者。宜以藥滑子。

之津液走氣血耗雖暫通而即復秘或更生他病矣
呻○大便不通宜靈寶丹蘇感元上方見潤腸湯大
黃飲子老人虛人宜潤腸丸潤腸湯婦人宜通神
散方見調導飲○外治宣積丸提盒散

脾積元治飲食停積腹脹吞酸大便秘結蓬木一兩
半三稜一兩青皮五錢良薑以醋煮切片焙

乾木香百草霜巴豆霜各二錢半右爲末
麵糊和丸麻子大橘皮湯下五七十九粒

靈寶丹錢巴豆去皮心油二錢右爲末大棗三枚蒸
治大便不通推下積滯木香沉香乳香各半

如欲利行先煎涼水三口然後用涼水送下如欲內和
取內和勻擣作丸如菉豆大每服一丸涼水送下如欲五行六行微數喫水

潤腸湯治大便秘滌火不通麻子仁一錢半細研水
浸瀝去皮取汁脂麻半錢細研水浸納取汁

桃仁一兩研爲泥荆芥穗一兩擣爲末右和合入鹽少許同煎代茶飲之以大便通利爲度

潤腸湯治大便不逕生地黃二錢大黃煨杏仁一錢半細研水

枳殼挑仁麻仁各等分右爲末蜜九分右剉作一貼入薑五片煎

潤腸丸治老人血少腸胃乾燥大便閉結甚至七八日難下色如猪糞少如羊糞者當歸生地黃

枳殼挑仁麻仁各等分右爲末蜜九分右剉作一貼入薑五片煎

潤腸丸治老人虛火大便閉結峰蜜一兩香油五分右剉作一貼入薑五片煎

潤腸湯治老人虛火大便閉結峰蜜一兩香油五分右剉作一貼入薑五片煎

枳殼挑仁麻仁各等分右爲末蜜九分右剉作一貼入薑五片煎

宣積丸治大便閉塞巴豆去殼乾薑韭子良薑硫黃甘遂白檳榔等分右爲末飯丸如鷄子黃大

早朝先以椒湯洗手麻油塗手掌握藥一粒移時便瀉飲止則以冷水洗手

提盆散治大便不通草烏爲極細末葱白一枚根其頭上有汁濕蘸草烏末納肛門中即通

○即霹靂箭能治
大小便不通

凡大小便不行也。又曰：大小便不通者，陰陽關格，乃三焦約約者不散。○推氣丸○大小便不通宜三一承氣湯。車狗膏散。

推氣丸

治氣不升降，大便秘澁。丁香散掩臍法導便法。

大黃

檳榔根實陳皮黃芩各等分，右為末。

三一承氣湯

治傷寒及雜病，熱盛大便不通，膏腹滿痛，頭暉。

腸潤燥軟堅瀉熱

以在下言之，便尿俱陰以前後言之則前氣後血，以腎言之，捻主大小便難。夫尿

車狗散

治大小便久不通，須瀉死。推車客七箇土佐以告故用芒硝大黃相須為使也。

甘遂散

治大小便不通，赤皮甘遂二兩，煉蜜二合，和水調服。

鐵脚丸

治大小便不通，大皂角燒存性，為末，大酒下三十丸。

顛倒散

治大小便不通或小便不通，或大便不通，滑石皂角各三錢，如小便不通，滑石加三錢。

溫酒調

大黃滑石各加三錢，如大便不通，大黃加三錢，如小便俱通。

貼臍膏

治大小便不通，甘遂為末，麵調作糊，貼臍中，硬處別煎甘草湯服之，以通為度。

倒換散

治大小便不通，如大便不通，大黃三錢杏仁一兩，右剉。

煎服二顆水

蜣螂散

一名二妙散治大小便不通六七月間尋牛馬糞中蜣螂不以多小用線串起陰乾收貯

用時取一箇要全者放淨壇上四面以灰火燒乾半截二便俱閉全用爲細

半截

二便俱閉全用爲細

末新汲水調服即通

廻生神膏

急勿用壯藥陳粉乾薑炮各一兩右爲細治陰證大小便不通數日危急者用之非

宋男病用女人唾調手內擦熱緊掩二卵上得汗出愈女病用男子唾調手內擦熱緊掩二乳上得汗

之根帶坎窩之分屬也

香散

治大小便不通如神苦丁香五錢川烏炮草烏炮白芷僵牙皂角炮細辛各三錢胡椒一

錢麝香少許

大禹細末用竹筒將藥吹入肛門內即通

罨臍法

治大小便不通以言藥末一匙安臍中冷水滴之令透噴內即通

葱一二莖

七生薑一塊淡豆豉二十粒鹽一匙同研作糊熱連臍中以帛繫定良久氣透自

通

之令透噴內即通

通便法

治大小便不通方同上

大便不通巴豆肉

○蠅牛膏治大小便不通作餅掩臍治

小便不通巴豆肉

○蠅牛膏治大小便不通作餅掩臍治

通便不通巴豆肉

○蠅牛膏治大小便不通作餅掩臍治

將醬蚯筒大內深射用。猪
狎香蚓一便撓入八竹管膽
入油漸箇不入大內管膽
肛指漸套通竹腸少相汁
內和上入多管內時接道
亦灌行肛目將以即套法
通肛片門有病香通入猪
口內時吹万人油回糓膽
蜜即下油不倒。一道一
導通黑入敷放坐中箇
非或糞肛今脚溫油以領
息以而內入向水導手去
角主安病口上一法指汁
則苦輕者半半用撻少
不竟自香時同竹之許
通浸俗油立入管令入
取油方其以通猪膽膽
以油小翻尿葱汁在直
精如竹。靜汗

單方凡十種

卷之三

硫黃等分為末溫瀉所調下如水石硝立止滑石
焰硝治關格大小便不通塞一鍾即通細硝二錢
錢白湯泄痢亦白瘧痛下血止

1

好黃土 煮三五沸去滓
煖服一二升
水

目錄

卷之三

THE JOURNAL OF CLIMATE

1

蒼术煎治白朮治一芍藥切之濕泄若泄自泄傷風或發瘍煎前服，汗之。同服，汗之。薑末服止，汗之。尤佳。桂湯或煎服。

卷之三

車前草 治熱泄取莖葉搗取汁一盞入蜜一合溫分二服
車前子 治一切泄瀉鴉夢禾空心

二

木香治諸米飲調下最妙或水煎服亦良
或合黃連為丸治赤白諸痢末服甚佳

三

白芍湯
甘草酸治
收泄
甘瀉緩
一劑煎
服下必服
四夫
之服
藥丸也服

三一

之義若熱病血痢則不可用草本主冷泄冷痢煎服水服立佳若血

四

草書則燒存性為末每
土爪根治大便不通擣取一錢以米
竹管吹入肛內即通。

馬蘭子

治水痢。熬麪等分米飲黃為末同柏

萱草根

治大便不通取汁服之立通脚同生

黃芩

主腸澼。煎取汁服之立通脚同生

艾葉

主赤白痢。煎服丸服身熱與芍

地榆

治痢。煎用白痢腹痛身熱與芍

肉豆蔻

主空心性沉寒。入下焦赤白痢及膿血痢

縮砂

治冷泄及休息痢。取米飲調下研末

大黃

通利大小便。水煎服熱痢酒煎服之脚

黑牽牛子

通利大小便。如大便不通半生半炒為末

每二錢

薑湯調下。如未通再以熟茶清調

下五錢

蜜丸梧子大溫水下三十丸

萹蓄

主大便不通。開紫荳水邊生者為佳

榆皮

取根擣取汁不一盞服之得通即止脚

檳榔

取細剉末大便不通。又治心火上炎

五倍子

治細利末大便不通。又治心火上炎

訶子皮

主泄瀉及赤白諸痢。訶子三箇兩枚炮取皮

樗根白皮

主久痢及久癥。煎取皮一錢

橡實

主心火上炎。頓服一錢

空心

主心火上炎。頓服一錢

槿花

主赤白痢作末和米飲服

蜜

治痢為最蜜與薑汁各一合溫水和頓服

蠟

主下痢膿血黃蠟不拘多少用銀篦挑於膏油燈上燒落水碗內如此七次為丸蘿富子大每三十丸白痢甘草湯下赤痢烏梅湯下腳

牡蠣粉

止大小便治遺尿不覺牡蠣粉白礬桔等分蒸末酒服二錢正三亦治遺尿脚

鱉

治痢後脫肛一人患痢月餘糟柏不寶晝夜五次又脫肛取鱉一條治如食法用生薑末搗作囊入砂糖一小塊不用鹽醬熟煮一二次三日而愈蓋乃介虫屬金而補肺與大腸故有效焉

鮒魚膾

主赤白痢腸澼和醋醬蒜薑食之
及禁口痢魚肚釀白礬灰為末飲調

下或入白礬蒸熟
和鹽醋喫即效

蠅蛆

治噤口痢甚效取蛆焙為末清米飲調下一錢

蓮子肉

止痢又治噤口痢去皮研末清米飲調下二錢

烏梅

沃服之一啜而差○赤痢及久痢烏梅水煎和蜜漬

蓮子肉

止痢又治噤口痢去皮研末清米飲調下二錢

烏梅

沃服之一啜而差○赤痢及久痢烏梅水煎和蜜漬

蓮子肉

止痢又治噤口痢去皮研末清米飲調下二錢

桃仁

利大小便不通取大升即通大便取小升即通大便

酸石榴殼

止赤白痢燒赤為末米飲下二錢亦治暴瀉不止○冷熱不調或下赤白青黃者石

榴五枚合殼杵絞取汁每取一合

服即斷或取殼杵絞取汁每取一合數服即得

大麻仁

治大小便不通及風秘熱秘血秘研取汁作粥食之或與蘇子取汁作粥名蘇麻粥
餅

生脂麻油

治熱秘大便不通每服一合取利為度
餅

赤小豆

止泄痢半生半熟和蠅一兩頓服差
餅

糯米

煮粥食甚效
餅

神麴

止泄痢熬爲末栗米飲調下二錢日三
餅○暑時暴泄神麴炒蒼木製等分爲末
餅糊和丸梧子大米飲下三十

鶩粟殼

主一切痢若日久腹中無痛當瀉腸則去
餅蒂醋炒爲末米飲調一錢服搘○此物治痢

如神

但用早則性緊滯多令人嘔逆或成噤口痢
餅○久痢虛滑一日百行取殼薑汁浸一宿炒乾

冬葵子

治大小便不通腹滿欲死取二升水四升
煮取一升入猪脂一合調服即通
餅

下即效

名百中散下

馬齒莧

利大小便和米飲服極效
餅

雞腸草

主小兒赤白痢取汁一合和蜜服之良
餅

薺菜

主赤白痢取根葉燒灰爲末和米飲服之
餅

葱白

治大小便不通取白葱白一握細切和米
餅

韭菜

治赤白痢取根葉燒灰和米飲服之
餅

薤白

治久痢冷瘽常煮食之
餅

獨頭蒜

治大便不通取一枚煨熟去皮納下部冷則易
餅通
餅

馬齒莧

利大小便和米糲五味作羹食之○赤白痢
餅

亂髮

主大小便不通燒爲灰取一錢調溫水一
鍾煎立止
餅

白蘿蔔

治久痢取汁一鍾服立止
餅

亂髮

主大小便不通燒爲灰取一錢調溫水一
鍒或作丸服
餅

黃雌雞 治赤白久痢取一隻治如食法作羹常食之

之又灸令燥空腹用蠟一錢熔化拌勻炒食之又取黃和胡粉燒

雞子 治久赤白痢醋煮熟空心食之或取一箇打破

食之名灸雞散韓成末酒服

一錢韓食之

烏骨鷄 治小兒噤口病取一隻治如食法

煮取清汁頻與服之病止胃開銷

家鴨 止痢治如食法煮爛飲

汁食內或作羹食之

雉 橘主久痢腸滑不下食治如食法着

椒葱鹽醬調和作餽餌食之

牛肝 治痢醋煮

食之

牛角總 主亦自痢及冷痢瀉血燒存性為末溫酒

或米飲調下二錢或蜜和作丸服之

黃雄狗頭骨 主久痢勞病休息痢取腦骨灸黃為末

米飲調二錢服或蜜和作丸服之

狗肝 治下痢臍腹痛狗肝一具細切米

升和煮粥着葱椒鹽醬與之

豬肝 主冷泄濕泄滑水入即泄泄而復飲此無

火灸大便不通大渴飲水多為滑泄

當灸大便不通大渴飲水多為滑泄

下大便痢皆可灸。取照大都五
里白鷗之澁○大便祕○取灸大
氣海○天環○大便不_通○壯
便停正○海○天環○大便_通○商
氣海○天環○大便_通○陰_通
取氣海○天環○大便_通○陰_通
足婦人產後○天環○大便_通○支
三里○天環○大便_通○陰_通
關後○天環○大便_通○陰_通
元腹○天環○大便_通○陰_通
三七壯○天環○大便_通○陰_通
關格○天環○大便_通○陰_通
吐止○天環○大便_通○陰_通
然後用益○天環○大便_通○陰_通
陰大○天環○大便_通○陰_通
陰小○天環○大便_通○陰_通
陰便○天環○大便_通○陰_通
陰谷○天環○大便_通○陰_通

東醫寶鑑內景篇卷之四

