





東醫寶鑑雜病篇卷之五

御醫心勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰



霍亂

霍亂之因 內經曰土鬱之發民病吐嘔吐霍亂注下又曰
 太陰所至為中滿霍亂吐下又曰歲土不及
 風乃大行民病飢泄霍亂吐下又曰歲土不及
 霍亂之病皆因飲食非關鬼邪○內有所積外
 有所感陽不升陰不降乖隔而成非因鬼邪皆欲
 食所感此先哲確論也○霍亂者揮霍變亂也
 凡人所飲食有節熱外又感寒一時陰陽錯亂然病
 本因飲食失節生冷過度以致濕熱內甚中焦失
 運不能升降是以上下吐瀉○霍亂或動胃氣令人
 或冒寒或失飢或以大怒或乘舟車傷動胃氣於
 吐瀉併作用藥遲緩須臾不救○霍亂多責於
 熱故夏秋為盛○霍亂之病由風濕濁三氣之
 合筋也風者肝木也濕者脾土也濁者心火也故
 主筋故風急甚則轉筋也吐者腸也心火上也故

東醫寶鑑雜病篇卷之五

身醫... 卷之五

霍亂

霍亂形證 霍亂證 霍亂證 霍亂證

脈法

霍亂脈法 霍亂脈法 霍亂脈法 霍亂脈法

乳霍亂用乳青魚二箇燉煮去渣服隨發隨服三次快差

霍亂

霍亂有乾有濕 霍亂有乾有濕 霍亂有乾有濕

乾霍亂

乾霍亂治法 乾霍亂治法 乾霍亂治法

赤芩 乾霍亂 乾霍亂 乾霍亂

加解以散藥川芎蒼朮防風白芷之類兼用薑湯

手足○絞腸沙者乃乾霍亂一各也腹痛不可忍或
正○乾霍亂者氣痞於中吐利不得急用鹽湯吐之
中○欲出無氣服治中湯見方
或○霍香正氣散必效
薑鹽湯治乾霍亂欲死一兩生薑切半兩右同炒
色變以童尿二盞同煎至一盞分二次服

濕霍亂治法

散寒多不飲水宜理中湯
濕熱無風木為害治宜散風寒
用藿香正氣散
月煩渴宜黃連香薷散
以分消上下更合益元散
亂吐瀉宜用木薑散
生煎不加減正氣散
事南星末三錢棗三枚薑五片煎極大錢沸湯點
效或半夏末三錢棗三枚薑五片煎極大錢沸湯點

木萸散

藥同煎至二錢分
白礬末一錢沸湯調服
酸等物皆可煮服
二香黃連散治伏暑霍亂腹痛躁悶脈沉手足冷
各一錢黃連厚朴半夏赤茯苓陳皮白扁豆香薷
到作一貼水煎入薑汁一分甘草三分

加味薑附湯

煎甘草一分
回生散治霍亂吐瀉各五錢右剉作一貼水煎服
回生散治霍亂吐瀉各五錢右剉作一貼水煎服

加減正氣散 或異鄉人初到他方不伏水土遂成霍亂

香薷散 治中暑霍亂吐瀉腹痛轉筋不能救逆

益元散 一名六一散 治霍亂吐瀉腹痛轉筋不能救逆

霍亂後轉筋 治霍亂後轉筋

而巳重者以鹽填臍中灸手足厥冷危甚風燭矣

倉卒之際以鹽填臍中灸手足厥冷危甚風燭矣

草紫蘇葉煎服再研大蒜兩兩散坊見加二香甘

厥入腹者亦效 治霍亂吐瀉腹痛轉筋

次投附子理中湯 治霍亂吐瀉腹痛轉筋

白朮加酒 治霍亂吐瀉腹痛轉筋

筋脈弦者木克土也 治霍亂吐瀉腹痛轉筋

煎服 治霍亂吐瀉腹痛轉筋

木瓜湯 治霍亂吐瀉腹痛轉筋

蘇一筒 治霍亂吐瀉腹痛轉筋

一法 治霍亂吐瀉腹痛轉筋

霍亂後煩渴 治霍亂吐瀉腹痛轉筋

湯止渴 治霍亂吐瀉腹痛轉筋

桂苓白朮散 治霍亂吐瀉腹痛轉筋

人參 治霍亂吐瀉腹痛轉筋

麥門冬湯 治霍亂吐瀉腹痛轉筋

五分煎服 治霍亂吐瀉腹痛轉筋

筒水煎服 治霍亂吐瀉腹痛轉筋

九君子湯 治霍亂吐瀉腹痛轉筋

陳皮甘草 治霍亂吐瀉腹痛轉筋

白芍 治霍亂吐瀉腹痛轉筋

白朮 治霍亂吐瀉腹痛轉筋

白朮 治霍亂吐瀉腹痛轉筋

椒豆散 治霍亂吐瀉後煩渴不能服藥或水藥不入

七水調下或水煎服 粒調下或水煎服

加減薏苡湯 治霍亂熱渴 香薷乾葛各七分黃連白朮

甘草各五分 右剉作

止渴湯 治同 藜蘆根甘草各五錢 右為末蜜水調二錢服

心丹

霍亂後虛煩 霍亂後虛煩不得眠或熱渴宜竹葉

參胡三白湯 治霍亂後煩 參胡三白芍藥當歸陳皮麥門

冬施子仁 治霍亂後虛煩 冬施子仁一貼入棗二梅一人參五分團煎服

既濟湯 治霍亂後虛煩 既濟湯 葉半夏附子炮甘草炙各一錢 右剉作一貼

霍亂吐法 治乾霍亂心腹刺痛煩冤吐利不得氣欲絕

飲以升中湯 霍亂吐瀉後氣散乃止 飲以升中湯 霍亂吐瀉後氣散乃止

霍亂熨法 治霍亂吐瀉後腹痛 霍亂熨法 治霍亂吐瀉後腹痛

則熨法 治霍亂吐瀉後腹痛 則熨法 治霍亂吐瀉後腹痛

霍亂鍼法 治霍亂吐瀉後腹痛 霍亂鍼法 治霍亂吐瀉後腹痛

可忍以手刺 治霍亂吐瀉後腹痛 可忍以手刺 治霍亂吐瀉後腹痛

霍亂者乃寒濕太甚 治霍亂吐瀉後腹痛 霍亂者乃寒濕太甚 治霍亂吐瀉後腹痛

言痛之甚也 治霍亂吐瀉後腹痛 言痛之甚也 治霍亂吐瀉後腹痛

不能行所以卒痛 治霍亂吐瀉後腹痛 不能行所以卒痛 治霍亂吐瀉後腹痛

言痛之甚也 治霍亂吐瀉後腹痛 言痛之甚也 治霍亂吐瀉後腹痛

手足為愈也。行氣血，俱能散病。然出血法，詳見救急門。

霍亂灸法

霍亂大艾炷灸入腹，不計壯數，立效。絕以蓋填臍，灸而腹中有煖氣者，依上法，灸之亦甦。霍亂者，灸承筋七壯，立甦。

禁忌法

霍亂吐瀉之時，切勿與穀食，雖米湯一啣，亦不可。氣必死，將息，則死。霍亂吐瀉，時慎勿與粟米粥，以助邪。

不治證

霍亂如轉筋，腹痛四肢厥冷，欲絕，其脈共大，不可治。

水疾

渴者，大煎渴者，大煎。亦好瀉，已乘熱亦大吐瀉，渴者，大煎。亦好瀉，已乘熱亦大吐瀉，渴者，大煎。

單方

一丸，二種。升霍亂，和鹽一匙，煎服。下即愈。

鹽

升霍亂，和鹽一匙，煎服。下即愈。

鍋底墨

投霍亂中，急攪服。吐瀉立止。

甘爛水

治霍亂，入藥煎。

生熟湯

和鹽陰陽，治乾霍亂。能吐宿食，惡毒之物。

生薑 治霍亂欲死生薑五兩切取牛屎一升同煎取汁服即效
天南星 治吐瀉不止四肢逆冷不省人事南星為末每三錢入大棗三枚同煎服四肢漸煖神識

蘆花 取一名蓬蘽治霍亂氣息危急者取汁頓服即差
皂角 乾少許調服探吐即效

木瓜 治霍亂吐瀉轉筋不止煮汁飲之
烏梅 和蜜飲之妙

林檎 青色者治霍亂吐瀉甚妙
秫藷葉 搗不可忍取葉濃煎湯飲之

粟米 治霍亂煩渴飲數升立差
栗米 治霍亂煩渴飲數升立差

糯米 治霍亂煩渴飲之

香薷 治霍亂吐瀉轉筋不可闕也

小蒜 治霍亂吐瀉

牛糞 治霍亂吐瀉四肢逆冷黃牛糞必
烟鹿皮 取汁頓服治霍亂吐瀉

醋 治霍亂吐瀉
牛涎 治霍亂吐瀉

嘔吐之因 甚則為嘔火氣炎上之象也

經曰諸嘔吐逆衝上皆屬於火

嘔吐者

俱屬於胃明者多血多氣故有聲有物少為異耳
 者陽明也胃胃明者多血多氣故有聲有物少為異耳
 也吐者太入則太有食已則少吐氣故有物無聲
 病也者有食入則多吐有食已則少吐氣故有物無聲
 少陽也其少者少血故有聲無物或病也
 半夏胃因飲食所傷之源皆因脾氣虛弱或因寒
 氣客胃或生飲食所傷之源皆因脾氣虛弱或因寒
 茯苓陳皮生薑之類主之致濕嘔者有物有聲
 食已則嘔乾重也○嘔無物○濕嘔者有物有聲
 故嘔比吐為重也○嘔無物○濕嘔者有物有聲
 此特一端耳有痰者中食滯心不得下者有氣逆者
 有寒氣鬱於胃中者有食滯心不得下者有氣逆者
 下而反出者有胃中者有食滯心不得下者有氣逆者
 嘔家雖有陽明證慎不可下○與痰而嘔者○
脉法
 寸緊尺瀦其入胃滿不能食而吐者○
 寸緊尺瀦其入胃滿不能食而吐者○
 寸緊尺瀦其入胃滿不能食而吐者○
 寸緊尺瀦其入胃滿不能食而吐者○

吐則有痰忌瀦○
 吐則有痰忌瀦○
 吐則有痰忌瀦○
 吐則有痰忌瀦○

治法
 乃吐宜冷熱二證冷者面青手足厥冷食中
 湯梗○熱者面赤手足熱食已即吐宜保中湯和
 加味橘皮竹茹湯○
 葉石膏湯○
 木或芍藥散○
 吐宜抑青九○
 若胃虛主之○
 君子湯○

寸脈瀦者死而弱氣不足血不澀○
 寸脈瀦者死而弱氣不足血不澀○
 寸脈瀦者死而弱氣不足血不澀○
 寸脈瀦者死而弱氣不足血不澀○

醫部全錄卷之五

藿香平胃散比和飲○痰飲嘔吐宜茯苓半夏湯
小半夏湯○大半夏湯○而嘔者心下怔忡先治嘔吐清
水如神○赤茯苓湯○方觀先嘔後渴者宜猪苓散木入
即吐者宜五苓散○然氣逆作嘔○生薑散之痰水作嘔
千金之說信矣○然氣逆作嘔○生薑散之痰水作嘔
半夏逐之○生薑散之痰水作嘔
梅也○嘔吐宜寒證最佳○若遇家有癰膿不須
治愈矣○

加味二陳湯 治胃冷嘔吐二陳湯五分也○
治胃冷嘔吐二陳湯五分也○

丁香安胃湯 治嘔吐胃寒所致黃芪二錢吳茱萸
草豆蔻人參蒼朮各一錢丁香柴胡升

加減理中湯 治胃寒嘔吐清冷脈沉遲人參
白朮赤茯苓乾薑炮陳皮藿香丁香半

保中湯 因痰火致嘔吐不下飲食白朮炒二錢黃
芩黃連並土炒藿香施子薑汁炒各一錢半

和中桔梗湯 治上焦熱食已暴吐脈浮而洪半夏
實赤茯苓各一錢右剉作一貼入薑三片以長流水和黃泥澄清取水煎
調赤茯苓各一錢右剉作一貼入薑三片以長流水和黃泥澄清取水煎
木香檳榔末各一錢右剉作一貼入薑三片以長流水和黃泥澄清取水煎
二錢黃芩末一錢半煎芍藥心服三服後吐漸止除

黃連竹茹湯 治胃熱嘔吐煩渴脈數黃連薑汁炒
赤茯苓白芍藥陳皮麥冬各一錢五分

清熱二陳湯 治痰火嘔吐出涎半夏陳皮赤茯苓
各一錢右剉作一貼入薑三片以長流水和黃泥澄清取水煎

三棗二梅一水煎服

葛根竹茹湯 治胃熱嘔吐 葛根三錢 甘草一錢 半夏一錢 竹茹一錢 煎服 尤妙 凡欲知胃中有熱 手足心皆熱者是也 胃熱也

加味橘皮竹茹湯 治胃熱多渴 嘔噦不食 橘皮竹茹 錢人參 甘草 各五分 右剉作一貼 薑三片 水煎服 無枇杷葉 則以蜜炙桑白皮代之 凡

四味藿香湯 治夏各二嘔吐 粥藥不停 藿香 人參 橘皮 錢人參 甘草 各五分 右剉作一貼 薑三片 水煎服 無枇杷葉 則以蜜炙桑白皮代之 凡

加減四君子湯 治久病胃弱 全不納食 聞食氣即嘔 香附子 各一錢 右剉作一貼 薑三片 水煎服 凡

藿香安胃散 治胃虛弱 嘔吐飲食不待腐熟 橘紅 每取二錢 薑三片 同煎 溫服 凡

藿香平胃散 治同上 蒼朮 二錢 藿香 厚朴 陳皮 各一錢 甘草 炙七分 右

比和飲 治胃虛嘔吐 月餘不納 水穀不化 氣即嘔 香陳皮 縮砂 甘草 各五分 陳倉米 一合 右剉作一

茯苓半夏湯 治痰飲停胃 嘔吐不止 半夏 二錢 茯苓 一錢 藿香 八分 縮

豬苓散 治先嘔後渴 嘔吐而思水 解者急與之 豬苓 赤茯苓 白朮 各等分 右剉作一貼 薑三片 水煎服 凡

吃井華水 一口即止 用此藥即愈 凡

大半反湯治惡心半反
降下茯苓各二錢半生
差二錢半為六分合飲

薤白粥 治嘔最效 薤白三莖 雞子三箇 去黃粟米三升

煎取參湯相和攪勻頓服即止 效得入

惡心乾嘔 惡心者欲吐不吐也 胃口有熱有痰二陳湯加薑

炒者連明乾嘔者有聲無物也 乾嘔或手足厥

中九宜然無奈欲吐不吐欲嘔不嘔雖曰惡心實

非心經之病皆在胃口上宜用生薑又曰惡心吐

清水胃口有痰有熱有虛皆用生薑宜生薑半夏

湯有熱惡心乾嘔吐沫宜半夏乾薑散 剉○胃中

生薑橘皮湯 治乾嘔或手足厥冷極皮四兩生薑八

乾嘔服最妙下咽即愈 剉湯治

生薑半夏湯 治胃中憤憤然無奈者半夏五錢水一

盞半煎至半盞入薑汁半盞和勻緩緩服之

半夏乾薑散 治乾嘔吐沫三錢水煎緩緩服等分

梔子竹茹湯 治胃熱惡心乾嘔一錢半右剉作一貼水

煎和薑汁服

食痺吐食 忍也吐食已心下痛陰然不可名也 不行也

故痛而嘔也 寒經云寒氣客於腸胃厥逆上也

風痰其羈絆于脾胃之問故惡心欲吐飲食不下當

先實其脾土宜茯苓半夏湯 麥天湯 白朮茯苓湯

茯苓半夏湯 治風痰羈絆於脾胃之間惡心欲吐宜

夏神剉作一貼為錢三分橘紅天麻各一

錢右剉作一貼為錢三分橘紅天麻各一

白朮茯苓湯 治同上 錢麥芽麩五分 右剉作一貼 薑五

服片水煎

金花丸 治同上 半夏末薑汁浸蒸餅和丸 梧子大薑湯

食下三五丸 用此以治吐止 為度 風痰羈絆 不安 脾胃故飲

水煮金花丸 治風痰羈絆 脾胃不和 寒食不化 石燒各一兩

每取百五錢 雄黃一錢 半星 並湯洗 寒水石 燒各一兩

薑湯吞下 食前 楊水 沸下 藥煮 令浮 為度 鹿出 生

水全不入 食宜不換 金正氣散 麩 限 或安 脾胃丸 不

湯宜輕 限加青皮 白芍藥 柴胡 升麻 川芎 砂仁 神麩

麥天湯 治風邪羈絆 脾胃有痰 惡心欲吐 麥門冬一

陳皮各一錢 右剉作

吐病有三 氣為上 膈屬上 焦食已暴吐者 今世謂之嘔

出之屬反胃也 焦在胃口 上通天氣 主腐熟 水穀 下出

三焦論之 上焦在胃口 上通天氣 主腐熟 水穀 下出

焦在膈下 通天氣 主腐熟 水穀 下出

在膈下 通天氣 主腐熟 水穀 下出

於氣下 通天氣 主腐熟 水穀 下出

渴飲水 大便燥結 氣浮而納 洪其證 食已暴吐

相假痛積而痛 其脈浮而弦 其證或先積而後痛

或先痛而後積 其脈浮而弦 其證或先積而後痛

其脈沉而遲 其證或先積而後痛

大便而通 復以中焦藥和之 不令大府結閉而

也 自安 楊

夏時金匱雜論卷五

三

噎膈反胃病因

大腸熱結則小內經俱熱也蓋謂之膈注曰三陽者燥
 行所以噎食不經曰少陽所復出乃嘔涌溢上行而下
 降也○內經曰少陽所復出乃嘔涌溢上行而下
 俱耗胃腕乾○其曰食不下者胃腕膈也○飲可下
 與胃相問或雖可入入難盡入胃之曰噎○其行在下
 一膈亦曰反胃大便秘少若羊屎然當心而痛須出
 難盡入胃良久復出此焦之幽門此中焦之噎膈
 吐其或朝食暮吐暮食朝吐而大便不通○噎膈有五
 也其或朝食暮吐暮食朝吐而大便不通○噎膈有五
 之噎者有拒格之意即膈食反胃也○噎膈有五
 五膈者有憂患寒熱氣妨礙食之不出○噎膈有五
 結於咽喉時覺有五噎者妨礙食之不出○噎膈有五
 氣鬱痰結而然五噎者妨礙食之不出○噎膈有五

噎膈反胃治法

阻滯而不下反胃也噎膈也蓋謂之膈注曰三陽者燥
 難言深中病乃神氣中膈一噎之證不屬虛實之
 屬冷不屬熱乃神氣中膈一噎之證不屬虛實之
 於血枯者丹溪一燥人而病已情病耳○噎膈皆生
 合經旨者丹溪一燥人而病已情病耳○噎膈皆生
 氣有養陰血自生靜則藏之血者陰氣也陰主靜
 御米以潤毒竹瀝以清痰正乾薑以養血○噎膈皆生
 胃蜜以潤毒竹瀝以清痰正乾薑以養血○噎膈皆生
 子率屬血虛二陳湯有痰用解毒竹瀝以清痰正乾薑以養血○噎膈皆生
 八物湯主之必和不可童便解毒竹瀝以清痰正乾薑以養血○噎膈皆生
 牛乳為上策但不可童便解毒竹瀝以清痰正乾薑以養血○噎膈皆生
 者加砂糖也切不可童便解毒竹瀝以清痰正乾薑以養血○噎膈皆生
 平加砂糖也切不可童便解毒竹瀝以清痰正乾薑以養血○噎膈皆生
 肉平加砂糖也切不可童便解毒竹瀝以清痰正乾薑以養血○噎膈皆生

津補血湯聖灰散八仙膏○反胃宜用疏汞丸狗
米平胃九杵糠丸九仙奪命丹順氣和中湯安中

平鯽丸治膈氣不食大鯽魚一箇去腸留鱗以大蒜
去鱗切片填魚腹內濕紙包黃泥固濟慢火煨熟

神仙奪命丹治氣鬱嘔吐或噎食不下百草霜研五
黑豆各四十九粒右為末烏梅三十箇水浸去核

取肉和藥末擣勻彈子大朱砂二錢為衣每禽一
丸以茶泡熱飲下良久不吐乃藥之效若吐再

丁香透膈湯治五噎十膈痞塞不通白朮一錢三分
七分沉香藿香陳皮厚朴各五分丁香縮砂各四分

青皮肉豆蔻白豆蔻各三分草果神麴半夏各二

五膈寬中散治五膈食不下厚朴丁香附子各一錢半

瓜蒌實丸治噎膈半夏製糖楮微背兩右為末薑汁米

神音散治噎膈反胃血虛有火三陽枯渴當歸川芎

當歸養血湯治老地黃白茯苓各一錢當歸白芍藥

麥同炒去菜莖八分貝母炒瓜蒌仁枳實陳皮厚

麥同炒去菜莖八分貝母炒瓜蒌仁枳實陳皮厚

麥同炒去菜莖八分貝母炒瓜蒌仁枳實陳皮厚

麥同炒去菜莖八分貝母炒瓜蒌仁枳實陳皮厚

麥同炒去菜莖八分貝母炒瓜蒌仁枳實陳皮厚

麥同炒去菜莖八分貝母炒瓜蒌仁枳實陳皮厚

麥同炒去菜莖八分貝母炒瓜蒌仁枳實陳皮厚

麥同炒去菜莖八分貝母炒瓜蒌仁枳實陳皮厚

麥同炒去菜莖八分貝母炒瓜蒌仁枳實陳皮厚

麥同炒去菜莖八分貝母炒瓜蒌仁枳實陳皮厚

麥同炒去菜莖八分貝母炒瓜蒌仁枳實陳皮厚

麥同炒去菜莖八分貝母炒瓜蒌仁枳實陳皮厚

麥同炒去菜莖八分貝母炒瓜蒌仁枳實陳皮厚

麥同炒去菜莖八分貝母炒瓜蒌仁枳實陳皮厚

麥同炒去菜莖八分貝母炒瓜蒌仁枳實陳皮厚

麥同炒去菜莖八分貝母炒瓜蒌仁枳實陳皮厚

身醫寶錄卷之五

二四

煎入剉作一貼薑二棗二水
生津補血湯治年少人噎膈乃胃脘血燥不潤故便
地黃七分縮茯苓各一錢枳實陳皮黃連炒蘇子貝母
各七分白茯苓砂沉香水磨取汁各五分右剉作一貼

聖灰散治噎食病及回食病
乾炒勿令泄氣過一二年則無用矣凡用年四餘
壯健者用四分壯年者用三分老弱者用四分或吐或出或下好燒

八仙膏治噎食生薑汁梨汁生薑汁
右和勻盛食之細煎
熟任意食之細煎

狗米平胃丸治反胃吐逆水銀八錢生硫黃末二錢同入
白煎湯煮丸用生栗米飼之不效黃雄天一口餓數日
勻得所作丸梧子大每五七九錢平胃散末和

杵糠丸治五疳母牛口轉和砂糖三兩為丸
大入鍋內慢火煮丸中迤和砂糖三兩為丸
二次入鍋內慢火煮丸中迤和砂糖三兩為丸

九仙奪命丹治反胃噎食其效如神
南星薑製各二錢厚朴並薑製各五錢木香
兩右為末夜睛露過以參厚朴煎湯調糊作餅

順氣和中湯治腹痛陳皮益水沙香附子醋炒菟子
薑湯調平胃散送下忌生冷酒麪噎以

硫汞丹治反胃吐逆水銀八錢生硫黃末二錢同入
候結成砂子再研為末以炒有焰起以醋酒之

狗米平胃丸治反胃吐逆水銀八錢生硫黃末二錢同入
白煎湯煮丸用生栗米飼之不效黃雄天一口餓數日

杵糠丸治五疳母牛口轉和砂糖三兩為丸
大入鍋內慢火煮丸中迤和砂糖三兩為丸
二次入鍋內慢火煮丸中迤和砂糖三兩為丸

九仙奪命丹治反胃噎食其效如神
南星薑製各二錢厚朴並薑製各五錢木香
兩右為末夜睛露過以參厚朴煎湯調糊作餅

順氣和中湯治腹痛陳皮益水沙香附子醋炒菟子
薑湯調平胃散送下忌生冷酒麪噎以

順氣和中湯治腹痛陳皮益水沙香附子醋炒菟子
薑湯調平胃散送下忌生冷酒麪噎以

薑汁炒黑各一錢白朮土炒八分白茯苓七分
夏神麴黃連薑汁浸晒乾猪膽汁拌炒各六分
實五分維砂三分泥攪澄清水煎入竹瀝童便薑
三長流水入黃土泥攪澄清水煎入竹瀝童便薑
服汁温

安中調氣丸

製油炒白茯苓神枳實神麴炒黃連薑汁浸猪膽汁
拌炒各一兩白芍藥八錢蘇子炒羅當子炒各六
錢川芎當歸酒洗白豆蔻炒各五錢甘草炙三錢
木香一錢右為末以竹瀝薑汁打神麴為糊和丸
下菜豆一百九錢湯

回生養胃丹

之證蒼朮換小脾胃土虛寒聚成痰涎以致大便燥澀
壯一箇以壁土揉擦六日蓮肉酒浸各四兩取積猪
肝搗細捏作小餅烘乾洗淨入蒼蓮線一宿伏龍
肝同炒去三半夏湯洗醋浸七切龍

肝同炒去土粟米薑汁浸蒸焙各四兩人參白朮
白茯苓厚朴蓬朮三稜二味並醋炒革澄茄縮砂木
香豆蔻穀芽炒麥芽炒甘草各一兩丁香木香吞
六錢右為末稀麩糊和丸梧子兩大米飲吞下
九醫七十

定生丹

各五分烏梅肉和搗作丸彈子大百箇湯泡去核右為
末以烏梅肉和搗作丸彈子大百箇湯泡去核右為
每細爵壓下化藥即燃官香一炷如香盡藥未化
者難治藥先化香
未盡者可愈

安胃湯

縮砂各五分甘草一錢黃連薑汁炒當歸陳皮牛夏
貼入薑三五分二烏梅一分煎服
太倉丸治反胃噎膈白豆蔻縮砂各二兩陳倉米一

東醫圖書集成卷五

湯下百丸

奪命丹

治反胃有起死回生之功
分裝一箇麝香一分
四分秋六分冬八分
皆有用彈中白糖
如墻一糞土之下
破內并彈蓋佳
存性不要燒焦
小入藥內并彈
心服如覺飢用
進一匙半足矣
不可多吃一日
治矣忌生冷厚
味葱蒜酒麪氣
惱五十以後一
服即效

附子散

治反胃大附子
一箇坐於磚上
許擣為末或加
粟米香飲一錢
下同為末過

嘔吐噎膈反胃宜通大便

順今逆而上行
謹不可泄固也
然嘔吐者每利
便秘結上下壅
遏氣不流行盍
思所以區畫而
利

導之道不陰虛邪氣
此地不陰虛邪氣
草微加○大黃芒硝
止矣○大黃芒硝
大熱結不通
熱結不通
則嘔吐何由
意○吐何由
厚○吐何由
中湯香白附子
秘結虛冷者
結用蜜導法

紫沉丸
治中焦吐食
肉各三錢
各一錢
生薑一大塊
大便秘不通
吐則止

紫沉丸
治中焦吐食
肉各三錢
各一錢
生薑一大塊
大便秘不通
吐則止

紫沉丸
治中焦吐食
肉各三錢
各一錢
生薑一大塊
大便秘不通
吐則止

紫沉丸
治中焦吐食
肉各三錢
各一錢
生薑一大塊
大便秘不通
吐則止

紫沉丸
治中焦吐食
肉各三錢
各一錢
生薑一大塊
大便秘不通
吐則止

紫沉丸

紫沉丸

紫沉丸

厚朴丸

治同上方與萬病紫苑九同賦

附子丸

治下焦吐食胡食暮吐食朝吐大便不通

人參利膈丸

治噎膈大便燥結喘滿壅塞治膈氣之

三一承氣湯

治嘔吐大便秘三陽結而

四子調中湯

治反胃痰盛二便澀半夏二錢桃仁芥

香白元

治痰涎壅盛嘔吐不止大便澀滯青州白元

潤腸膏

治腸澀服為妙非

大黃湯

治冷瀉反胃其候欲發時先流冷迤次則吐

難治不治證

嘔吐非反胃比也九吐如清菜汁者熟而厥者虛極

食不

斷房室者不治必死

末但

見沫多出者必死

難治

不治證

潤腸膏

治腸澀服為妙非

大黃湯

治冷瀉反胃其候欲發時先流冷迤次則吐

難治

不治證

食不

斷房室者不治必死

末但

見沫多出者必死

難治

不治證

潤腸膏

治腸澀服為妙非

大黃湯

治冷瀉反胃其候欲發時先流冷迤次則吐

難治

不治證

食不

斷房室者不治必死

末但

見沫多出者必死

難治

不治證

潤腸膏

治腸澀服為妙非

大黃湯

治冷瀉反胃其候欲發時先流冷迤次則吐

難治

不治證

單方

有九螺三不吐黃沫者
泥十種

黃丹

治反胃黃丹和九梧子大温酒下五九至七九

黑鈔

等分而嘔者黑鈔炒成灰檳榔

滑石

治反胃積飲滑石末生薑自然汁澄清白脚和

赤石脂

治痰飲吐水成反胃石脂水飛每一錢空心

人參

治反胃毒死昔人參末三錢薑汁五合粟米一

生薑

凡嘔吐皆因氣逆故用生薑之辛以散之○反

半夏

凡嘔噦用半夏者散結氣也○反胃嘔吐半夏

蘆根

治乾嘔服一及五噎煩悶蘆根五兩

竹茹

主嘔噦取青竹茹一升水煎服

鯽魚

治反胃取每大鯽魚去腸留膽入○諸魚灰並

蚌蛤粉

治反胃吐食取爛粉米飲下二錢○蠅爛

夏月宜食此藥

九

九

服

蝟

皮主反胃吐逆取肉淹五味灸食

橘皮

治反胃嘔吐橘皮末每二錢淡薑湯煎服

木瓜

止嘔逆煮汁飲之乾薑煎服之

蒲萄根

細嘔噎飲之佳煎取汁和薑汁服之

獼猴桃

治熱壅反胃取汁和薑汁服之

杵頭糠

主噎塞取細糠蜜九彈子大

鬻子粟

煮反胃食之佳和竹瀝

老牛口

中涎壅反胃中噎膈取少許和水服之

驢尿

再服便之七日止朝夕垂絕取熟尿服之

牛乳

治反胃噎膈生薑半斤取汁和牛乳服之

田螺

治反胃大田螺篩上取皮紙覆之待吐

螃蛤

治反胃噎膈入水殺食無效

馬剝兒

一名馬乾兒即瓜也治噎膈反胃燒存性

食則

燒可存性後隨證調服二錢

方只

燒可存性後隨證調服二錢

燒可

存性後隨證調服二錢

存性

後隨證調服二錢

後隨

證調服二錢

證調

服二錢

服二

錢

錢

身醫寶鑑卷之五

炊乾飯

治膈噎久不納穀取隔年炊乾飯以急流順水煮爛取汁不時飲之待能食以藥調治

雞穀袋

治噎膈取袋不納穀少不可失包內一物用泥固濟火煨存性每袋一箇入薑炒香附末半兩神麴和九心子

貓胎衣

治反胃取貓生子胎衣陰乾燒為末酒調服甚效

狗膽

治反胃黃沫末麩糊和九括子大空為末狗膽浸二日乾再為末麩糊和九括子大空為末狗膽

蝎虎

治噎膈去蝎虎飲酒即愈入燒酒內浸七日焙乾取蝎虎末每一錢燒酒調下其糞

鍼灸法

善厥冷嘔吐有苦者邪在膽逆在胃取三里陽陵泉經

育吐食不化取上腕中三腕各灸七壯
中膈膈中巨腕中腕各灸五壯
心膈膈中腕中腕各灸五壯
里膈膈中腕中腕各灸五壯
取膈膈中腕中腕各灸五壯
海膈膈中腕中腕各灸五壯

咳嗽

嗽病因內經曰人感於寒微則為咳甚者為泄痛而發為傷於濕冬必咳飲者蓋秋傷於濕積於脾也大抵素秋之氣宜清而肅若反動之則氣必上衝而為咳傷肺氣甚則動脾濕而為痰也少熱多留濕則雖傷肺氣亦不為痰若痰而寒少熱多故咳則雖傷肺氣亦不為痰若痰而寒少熱多

身醫寶鑑卷之五

三一

傳以與之也所病不等寒燥濕風火皆能令人咳嗽
 惟濕病在胃留之熱痰濕在肝經謂之寒痰所治不同
 假令經謂之心經謂之熱痰在腎經謂之寒痰所治不同
 在肺經謂之氣痰在脾經謂之痰動而有聲肺氣傷而
 清也嗽謂無聲而有痰動而有聲肺氣傷而咳嗽者不
 有痰而有聲因傷肺氣動於脾濕而為痰也咳嗽者不
 寒飲冷則傷之使氣上而不逆者是也肺主氣形
 咽今喉中滯滯如痺習習如梗是冷嗽甚者續續
 不己連連不息坐卧不安言語
 不竟動引百骸聲聞四隣矣
 咳嗽所因浮風緊寒熱極濕房勞瀆難右罷當
 者飲食傷脾左關弦短疲極肝衰浮短肺傷法當
 咳多痰弦流少血形盛部浮不虛寒沉數實熱洪
 滑多痰弦流少血形盛部浮不虛寒沉數實熱洪
 皆死關脈惟浮大而數者生外證為寒○參考浮
 停○死關脈惟浮大而數者生外證為寒○參考浮
 烏○死關脈惟浮大而數者生外證為寒○參考浮
 沉數為實熱○洪滑為多痰○脈浮軟者生沉飲小

脈法

伏匿者死而實滑身溫脈沉肺脹停水氣逆填胃脈
 必伏取死而實滑身溫脈沉肺脹停水氣逆填胃脈
 細○喘脈滑而浮者主溢而數者死大也緩則宜浮遲
 則死○數者亦喘脈滑而浮者主溢而數者死大也緩則宜浮遲
 者死○數者亦喘脈滑而浮者主溢而數者死大也緩則宜浮遲
 緩者易治○弦急而脈者危○古難治○弦急而脈者危○古難治
 促或微治○可治○脈代者危○古難治○弦急而脈者危○古難治
 土位難治○刑金必死○脈代者危○古難治○弦急而脈者危○古難治
 脈數為火○刑金必死○脈代者危○古難治○弦急而脈者危○古難治
 痰數實為生○寸數虛痿喘血脈緊強者
 死○寸數虛痿喘血脈緊強者
 咳雖屬肺亦有臟腑之異
 中內經曰咳在手陽明上氣太陰在胃
 令帝曰非獨肺令人咳也何也岐伯對曰五臟六腑皆
 肺之合也皮毛先受邪氣則肺氣以寒其合也其寒
 飲食入胃從肺系上至於肺則各以其時受病非其
 邪因各傳以與之乘秋則肺先受邪乘春則肝先
 時則各傳以與之乘秋則肺先受邪乘春則肝先

去半夏加貝母瓜萎青黛梔子黃芩桑白皮湯加
嗽用降陰分火明○風寒鬱熱夜嗽者三拗湯加
知母黃芩
生薑

桔梗湯 除痰止咳 又治心咳 桔梗半夏製陳皮去
白各一兩 枳實三錢 右為龕末 每三錢薑五

二母散 治諸般咳嗽 兼治痰喘 知母貝母各一兩 巴
豆十粒 粒作霜 右為末 每服一字 與薑三片 臨

嗽即定 亦治久咳不愈 肺氣動則咳 脾濕動則咳 脾肺二歲俱動則咳 痰

咳嗽諸證 有風嗽 寒嗽 熱嗽 濕嗽 鬱嗽 勞嗽 食積嗽 氣
嗽 通治咳嗽 乾嗽 血嗽 酒嗽 久嗽 火嗽 夜嗽 天行

肺氣動則咳 脾濕動則咳 脾肺二歲俱動則咳 痰

風嗽 傷風乘肺 則鼻塞聲重 口乾喉痒 語未竟而咳 鼻

風嗽 傷風乘肺 則鼻塞聲重 口乾喉痒 語未竟而咳 鼻
傷風乘肺 則鼻塞聲重 口乾喉痒 語未竟而咳 鼻

流涕欲語未竟而咳 鬱○傷風咳嗽宜神木散
款冬花散 欲語未竟而咳 鬱○傷風咳嗽宜神木散

神木散 治傷風頭痛 鼻塞聲重 咳嗽 蒼朮二錢 羌活
三錢 葱一

款冬花散 治寒痰相交 肺氣不利 咳嗽 痰盛 麻黃
母桑白皮半斤 夏款冬花各五錢 杏仁甘草炙各一錢 知

金沸草散 治肺熱風寒 咳嗽 聲重 痰涎 黃濁 痰盛 荆
右剉作一貼 薑三錢 煎服

三拗湯 治感風寒 咳嗽 痰多 鼻塞 聲重 痰涎 黃濁 痰盛 荆
作一貼 薑三錢 煎服

三拗湯 治感風寒 咳嗽 痰多 鼻塞 聲重 痰涎 黃濁 痰盛 荆
作一貼 薑三錢 煎服

三拗湯 治感風寒 咳嗽 痰多 鼻塞 聲重 痰涎 黃濁 痰盛 荆
作一貼 薑三錢 煎服

三拗湯 治感風寒 咳嗽 痰多 鼻塞 聲重 痰涎 黃濁 痰盛 荆
作一貼 薑三錢 煎服

三拗湯 治感風寒 咳嗽 痰多 鼻塞 聲重 痰涎 黃濁 痰盛 荆
作一貼 薑三錢 煎服

三拗湯 治感風寒 咳嗽 痰多 鼻塞 聲重 痰涎 黃濁 痰盛 荆
作一貼 薑三錢 煎服

三拗湯 治感風寒 咳嗽 痰多 鼻塞 聲重 痰涎 黃濁 痰盛 荆
作一貼 薑三錢 煎服

三拗湯 治感風寒 咳嗽 痰多 鼻塞 聲重 痰涎 黃濁 痰盛 荆
作一貼 薑三錢 煎服

三拗湯 治感風寒 咳嗽 痰多 鼻塞 聲重 痰涎 黃濁 痰盛 荆
作一貼 薑三錢 煎服

三拗湯 治感風寒 咳嗽 痰多 鼻塞 聲重 痰涎 黃濁 痰盛 荆
作一貼 薑三錢 煎服

三拗湯 治感風寒 咳嗽 痰多 鼻塞 聲重 痰涎 黃濁 痰盛 荆
作一貼 薑三錢 煎服

五物湯 治感風寒 咳聲重咽痛 三拗湯加
加減三拗湯 治風枯喘咳 各一錢 煎服如法
片水煎服 入薑三

寒嗽

寒傷肺者 咳則胃緊聲啞 脈緊者 發熱無
汗惡寒 煩燥 渴 遇寒 咳 喘 咳
重惡寒 則發 乃寒 加麻 杏 仁 陳 皮 紫 蘇 葉 木 通 枳 梗 湯
每遇寒 則發 乃寒 加麻 杏 仁 陳 皮 紫 蘇 葉 木 通 枳 梗 湯
抑 肺 加 麻 杏 仁 陳 皮 紫 蘇 葉 木 通 枳 梗 湯
反侮中寒 於胃 不和 以辛甘 熱去之 咳 喘 咳
者 胃 中 寒 而 不 和 以 辛 甘 熱 去 之 咳 喘 咳
寶飲 華蓋散 杏子湯 參款花膏 半夏溫肺湯 蘇飲子 橘蘇散 薑桂丸
湯 款 花 膏 半 夏 溫 肺 湯 蘇 飲 子 橘 蘇 散 薑 桂 丸
味 款 花 膏 半 夏 溫 肺 湯 蘇 飲 子 橘 蘇 散 薑 桂 丸
九寶飲 治諸般咳嗽 及寒嗽 杏仁大腹皮 薄荷 麻黃 桂
皮 桑 白 皮 紫 蘇 葉 杏 仁 大 腹 皮 薄 荷 麻 黃 桂

華蓋散

治肺感寒 咳聲重咽痛 三拗湯加
三片 棗二枚 水煎服 入薑

杏子湯

治感風寒 咳聲重咽痛 三拗湯加
一錢 甘草五分 白芍藥 乾薑 桂皮 杏仁 五味子 各

紫蘇飲子

治肺感寒 咳聲重咽痛 三拗湯加
一貼 入薑 各六分 杏仁 五片 蘇子 麻黃 陳皮 甘草 各一錢 入

橘蘇散

治傷寒 咳聲重咽痛 三拗湯加
白皮 貝母 五味子 各一錢 煎服 入薑

薑桂丸

治寒痰 咳聲重咽痛 三拗湯加
兩石 為末 薑汁 浸蒸餅 和丸 黍豆 大薑 湯下

三五十九

人參款花膏

治肺胃虛寒久嗽不已款冬花人參五

湯實大每化亦得淡薑

半夏溫肺湯

治虛寒咳嗽中脘有痰水冷氣心下汪

藥冷也半夏一錢辛桂心旋覆花陳皮人參桔梗白芍

杏蘇湯

治傷風寒咳嗽痰盛杏仁紫蘇葉桑白皮陳

薑五水煎服入

人參潤肺湯

治傷寒咳嗽人參乾葛桔梗白芷麻黃

煎服

溫肺湯

治肺虛客寒喘咳吐痰沫薑桂皮半夏

薑五分棗二右水煎服入

加味理中湯

治肺胃俱寒咳嗽入參白朮乾薑甘草

右對作一貼入薑

八味款冬花散

治肺經寒熱不調逆嗽不已桑白皮

煎紫苑茸五味子甘草杏仁錢右對作一貼入薑

飴薑元

治冷嗽黑糖和勻待凝作片常服之

熱嗽者於暑熱而得咳則口燥或吐沫聲嘶

肺滿

肺滿者熱痰在內也宜砂中湯芥散半丸小黃丸

煎服

痰九四

洗肺散 治咳痰盛有熱肺氣不清利半夏三錢黃

仁一錢甘草五分右對作

入參瀉肺湯 治熱嗽即涼膈散枳殼杏仁桑白皮等分對煎加入

貝母散 治火嗽貝母久嗽桑白皮五錢款冬花二錢知母一

片作一貼入薑三

參朮調中湯 除熱補氣止咳定喘和脾胃進飲食桑

甘草各六分地骨皮麥冬陳皮各四分青皮

芩半丸 治熱嗽和生痰黃芩半兩夏一兩右為末薑汁浸蒸餅和

小黃丸 治熱痰並製各一兩右為末薑汁浸蒸餅和

九梧子大薑湯

黃連化痰丸 治熱痰咳嗽黃連吳茱萸各一錢半陳

九菴豆大薑湯

四汁膏 止嗽消痰降火雪梨汁藕汁生薑汁生

服以匙抄

濕嗽 者濕脈細骨節煩疼身重骨節煩疼或有汗小便不刺

散○濕嗽宜不換金正氣

白朮湯 治濕嗽紅痰多身重着脈濡細白朮三錢半

薑右剉作煎貼入

白朮丸 治濕痰咳嗽身重末薑汁糊和九薑湯下五

欬嗽

七
九

即火咳甚者乾咳而無痰乃腎水焦枯邪火獨熒

於肺宜瀉白散砂靚清化丸訶黎勒丸霞天膏見

清化丸

治肺鬱痰嗽睡不安貝母一兩杏仁五錢言

者附是也宜用清金降火湯

訶黎勒丸

治勞嗽乾咳及肺脹喘急訶子皮五錢海

清金降火湯

治熱嗽能瀉肺胃之火大降則痰消嗽

櫻桃大含化徐徐燕下門

甘草三分右剉作一貼入生薑三片水煎服食後

勞嗽

虛勞咳也勞嗽者盜汗出兼痰多作寒熱宜

補陰清金四物湯加竹瀝薑汁○陰虛火動而嗽

治虛勞乾咳元氣虛弱○勞嗽不愈宜參朮散潤肺湯加

補肺湯溫金散大寧嗽湯加味人參紫苑散潤肺丸

元使燥熱乘肺咯唾膿血上氣涎潮其嗽連續而

人參清肺湯

治人參清肺湯加地骨皮知母阿膠珠鬻粟殼蜜炒

杏一仁桔梗木煎去滓入蜜一匙攪勻澄清吸服

清肺飲

加味二母丸

治久嗽勞嗽食積嗽知母貝母同巴豆

味等分或加為末和薑汁入蜜為丸亦好

人參芎歸湯

治乾嗽因虛勞少血歸川芎白芍藥各

一錢半赤茯苓人參半夏陳皮阿膠珠細辛五味

加味人參紫苑散

治虛勞咳嗽人參紫苑貝母桑白皮白茯苓

各一錢杏仁甘草七分右剉作一分貼薑五棗二海一水煎

潤肺丸

治燥痰乾嗽勞嗽貝母一兩瓜蒌仁青黛

補肺湯

治勞嗽桑白皮蜜炙熟地黃各三錢人參紫苑

溫金散

治勞嗽防風桑白皮黃芩甘草各五錢麥門冬

服法

二錢半右取前五味入半升水浸一宿曬乾次入

大寧嗽湯

治勞嗽神效半夏陳皮枳殼杏仁阿膠珠鬻栗

知母湯

治虛勞咳嗽生乾地黃肺有熱黃芪蜜炙一

寧嗽膏

治陰虛火動咳嗽小麥天一撮水煎服

大阿膠元

治虛勞咳嗽吐衄血發熱消瘦山藥五味

紫苑

三兩右取三升煎如流合取汁入煎糖八兩

新水

煎取三升煎如流合取汁入煎糖八兩

四兩

和勻成膏每服三四匙不以時

大阿膠元

子熟地黃阿膠吐衄血發熱消瘦山藥五味

子熟地

黃阿膠吐衄血發熱消瘦山藥五味

黃阿膠

吐衄血發熱消瘦山藥五味

吐衄血

發熱消瘦山藥五味

發熱消

瘦山藥五味

瘦山藥

五味

五味

丹參貝母防風神相子仁百部根杜冲各五錢
遠志人參各二錢半右為末蜜和作丸彈子大每

食積

嗽因食積生痰咳胃積噎酸宜二陳湯加厚朴
煎和滓呷服水咯

又云有食積人面青白黃色不常面上如蟹爪路
一黃一白者是也○食積痰嗽發熱者半夏南星

並製為丸服瓜萸實蘿當子為臣青黛石礮為使薑
汁糊為丸服研○一方三補丸極健加二母炒躑
願為末水丸九椒核大二以竹瀝藕汁吞之呷○食積
嗽宜瓜萸九青金九二母寧嗽湯温脾湯香附九

瓜萸丸

治食痰壅滯喘嗽瓜萸實半夏麴山查子神
麴各等分右為末瓜萸水煎丸

青金丸

治食積火鬱嗽劫藥也貝母知母各五錢巴
豆霜五分右末薑汁糊和丸青黛為衣白湯

下二七
丸

二母寧嗽湯

治傷飲食胃火上炎衝逼肺氣痰嗽
一錢半梔子黃芩各一錢枳實七分生甘草二分五味子

十粒右煎服
一錢半梔子黃芩各一錢枳實七分生甘草二分五味子

温脾湯

治食飽則咳甘草四兩大棗二十枚
右剉水五升煮至二升分三服

香附丸

治食積痰嗽蒼朮三兩夏各一兩黃芩赤茯苓
各五錢川芎三錢杏仁半夏各一兩

氣嗽

七氣積傷成咳不出燕不疑結或如敗絮或如梅核
宜蘇子降氣湯鮫鮫加味四七湯粉丸星香丸橘薑

青龍散三子養親湯蘇子煎玉粉丸星香丸橘薑

團參飲子

治七情勞傷肺脾多唾膿血漸成肺痿將作勞瘵人參半夏紫苑阿膠珠百各款冬花天門冬杏仁經霜桑葉各一錢五分五味子十五粒右對作一貼薑三煎服

青龍散

治咳上氣不得卧人參陳皮紫蘇葉五味子右對一兩薑三水煎服

三子養親湯

治咳氣急養脾進食紫蘇子蘿蔔子芥子各一錢紙上微炒研煮湯飲勿煎太過味苦

蘇子煎

治老虛人上氣咳紫蘇子一斤另擣烏末杏仁去皮尖雙仁一升另研烏泥生薑汁生地黃汁白蜜各一升蘇杏二味以二汁澆之絞取汁其滓再擣再絞令味盡出乃合蜜攪勻盛器中或去地黃汁代竹瀝亦佳

玉粉丸

治氣痰末以薑汁浸蒸餅和九薑湯下五七

星香丸

治氣嗽生痰南星夏各三兩白礬一兩取三兩香附子三兩皂角水浸一晝夜去不見火為末薑汁糊和丸梧子大薑湯下五七十

橘薑丸

治久患氣嗽聖藥陳皮生薑同擣焙乾各二兩右為末神麴二兩作糊和丸梧子大米飲

痰嗽

者必作咳止胃膈多滿蓋痰在胃上干於肺則必咳出嗽止胃膈多滿蓋痰在胃上干於肺則

半瓜丸

治痰嗽聖藥藍漆煎安肺散入參散

肺散

治痰嗽聖藥藍漆煎安肺散入參散

痰嗽

者必作咳止胃膈多滿蓋痰在胃上干於肺則必咳出嗽止胃膈多滿蓋痰在胃上干於肺則

餅和丸 須久浸 薑汁炒 黃色 否則 辣喉 腫
橘甘散 治氣嗽 痰甚效 橘皮生薑 焙乾 神麩 炒各
十九日 再傳

滴油散 治痰嗽 面浮如盤 蚌粉 新尾 上炒 令通 紅放
滴入 麻油 數點 調服 卽愈

玉芝元 治風熱 痰盛 嗽聲 重半 夏麩 六兩 入參 薄
未薑汁 煮麩 糊和 九梧子 大薑湯 下五七

澄清飲 治痰嗽 服他藥 不效者 南星 半夏 並製 蚌粉
徐服 糊

三聖丹 治久痰 極效 半夏 製二兩 南星 煨一兩 甘
草 生半兩 右以 半星 二味 為末 薑汁 拌勻 會

作麩冬十夏五春秋七日取出再為末入甘草末
和勻竹瀝一椀拌和作餅子焙乾又將竹瀝沃濕
焙乾如此十數次以竹瀝盡為度再研為末煉蜜
調和如餛飩臥抄一匙於口內噙化以竹瀝漱口
燕下

藍漆煎元 治痰嗽 藍漆 二兩 人參 杏仁 胡桃肉 各一
兩 右為末 蜜九 彈子 大每一九 薑湯 或米

安肺散 治痰嗽 不問新久 鷲栗殼 炒黃色 四兩 麻黃
甘草 炒各二兩 右麩末 每三錢 烏梅 一箇 同
煎服

人參散 痰嗽 通用 半夏 麩二錢 人參 桔梗 五味子 細
辛 枳殼 赤茯苓 杏仁 各一錢 甘草 五分 右剉
作一貼 入薑五
梅一水煎服

白圓子 治風痰 嗽有一 種咳 直至 頓吐 飲食 痰物
俱出 盡方 小定 此乃 肝木 尅脾 土風 痰壅 盛

乾嗽

香致宜以白元子方作生料煎和薑汁服之
乾嗽者無痰有聲是也此證本於氣逆聲微者
連咳十數聲方有痰也此係火鬱之證乃痰鬱火邪
痰出是為乾嗽極難治也此係火鬱之證乃痰鬱火邪
在肺中用苦桔梗以開之不得志者有之用四劑不
已則成勞須行倒倉法此不得志者有之用四劑不
湯加竹瀝煎生薑黃柏之類陳皮湯燒生薑胡椒水
吐之無痰而嗽者以辛甘潤其肺也薑胡椒水
治無痰而嗽者以辛甘潤其肺也薑胡椒水
肺生地黃二斤洗淨杏仁二兩生薑各四兩
右搗如泥盛磁斤洗淨杏仁二兩生薑各四兩
三匙燕下轉○器置飯上蒸七度每於五更挑
秤銅器知斤兩訖內蜜復秤一斤生薑二斤取汁先
火煮令薑汁盡惟蜜斤兩在則數次內薑汁以微
含化日三針母○乾嗽宜用瓊玉膏丸
肺散加味二母九訖黎勒九抑痰丸
血嗽損而致四物湯加大黃蘇木為末酒調服或水煎

人參百合湯

服嗽宜服人參七粒以非汁送下最佳
人參百合湯治勞嗽吐紅白痰茯苓人參五味子黃
芪半夏杏仁各七分細辛紅花桂皮
甘草各三分右剉作一貼水煎服
桑皮散治上焦有熱血壅脛悶嗽聲連併氣不得透
芥前胡紫蘇葉柴胡赤茯苓枳殼各八分
右剉作一貼入薑三片藥各等分右為末每三錢

當歸飲

服温酒調
當歸飲因打撲損傷肺氣咳吐黑血大黃蘇木生
乾地黃當歸赤芍藥各等分右為末每三錢

酒嗽

濕性大熱因傷引飲冷與熱疑於胃中不散而成
為末薑汁煉蜜和丸飲酒多咳嗽青黛瓜蒌仁右
○酒傷肺成痰嗽以竹瀝煎紫蘇入韭汁就吞瓜
宜蔓杏連薑九又

醫方類聚卷之五

三三

瓜蒌杏連丸 治酒痰未咳以竹瀝薑湯杏仁黃連各等分

蜂薑丸 治酒痰及積痰久咳留肺粉瓜蒌仁氣

久嗽 乃積痰久咳宜蜂薑丸加氣不升或挾濕與

貝母湯 治諸般久咳胡桂心各五錢黃芩桑白皮各二

九仙散 治久嗽乃收功後藥收斂之劑也鴛粟殼蜜

人參款花散 治久嗽各五錢知母貝母半夏製各三錢

天鼠散 治久嗽足燒令焦鳥末和飲服不差

清肺湯 治久嗽及痰陳皮貝母各一錢當歸天門冬

馬兜鈴丸 治久嗽神效一馬兜鈴半夏杏仁各一兩另

加味百花膏 治久嗽不愈紫苑冬花各一兩煎湯

潤肺除嗽飲 治遠年咳嗽如神款冬花紫苑章麻黃

梅肉 鷓鴣栗殼各七分 八參 杏 仁 薄 荷 生 甘 草 各 五
分 五 味 子 九 粒 右 剉 作 一 貼 薑 三 片 細 茶 一 撮 同
煎 服

火嗽

火嗽有聲痰少而赤者是或煩渴引飲脉洪數研
湯二母宜貝母散清肺飲柴胡枳桔湯清金降火
膏人參清鎮九滋陰清化膏

清肺飲

治肺熱咳嗽前胡荊芥桑白皮枳殼各一錢
杏仁貼入門冬甘草薄荷赤茯苓桔梗紫蘇葉阿膠珠
杏一貼天門冬三梅各七分右剉

柴胡枳桔湯

治傷寒胃腸痛潮熱咳嗽痰盛麻黃杏
乾葛各一錢甘草煎五分右剉
作一貼入薑三水煎服

抑心清肺丸

治肺熱咳嗽咯血即黃連阿膠元也助
則嗽白
止則嗽白

玄霜雪梨膏

治勞嗽久不愈消痰止咳生津止渴
者勿用藕汁十鍾生地黃汁十鍾麥門冬煎取汁
五鍾生蘿藦汁十鍾茅根汁十鍾右汁重濾去滓

人參清鎮丸

治熱止嗽消痰定喘柴胡人參各一兩
半盞火上再熬如稀糊則成膏矣每服三五匙
三錢陳皮五梧子大白湯下三錢六錢右末

滋陰清化膏

治咳嗽清痰化源肺腎乃人身之
麥門冬各二兩黃柏地黃熟地黃並酒浸天門冬
枸杞子白芍藥酒炒知母鹽炒玄參薏苡仁炒

海青丸

治火鬱嗽及肺脹氣急重訶子皮海蛤末
瓜蒌仁青黛半夏製便香附各一兩右為末

瓜蒌仁青黛半夏製便香附各一兩右為末

三五

夜嗽

以薑汁浸蒸餅和丸菜豆
大薑湯下三五丸
屬陰虛治之屬陰虛宜降
也。研。凡夜嗽須用六味
津液。而為痰。須用六味
母。天。門。冬。貝。母。橘。紅。以。滋。陰。化。源。黃。元。虧。損。火。炎。水。潤。或
亦。佳。翻。○。夜。嗽。宜。用。滋。陰。化。源。膏。麻。黃。蒼。朮。湯。坊。知
麻黃蒼朮湯

麻黃蒼朮湯

治秋夜咳嗽
亦佳翻。○。夜。嗽。宜。用。滋。陰。化。源。膏。麻。黃。蒼。朮。湯。坊。知

分五錢黃芪一痛痰涎不絕至曉方緩口苦胃痞
分防風當歸一痛痰涎不絕至曉方緩口苦胃痞
分五錢黃芪一痛痰涎不絕至曉方緩口苦胃痞

天行嗽

時令不正人多感冒咳嗽宜服參蘇飲子一服散
○。四。時。感。冒。咳。嗽。宜。服。參。蘇。飲。子。一。服。散

人參飲子

赤茯苓天行咳嗽各一錢半枳殼甘草各七分
○。赤。茯。苓。天。行。咳。嗽。各。一。錢。半。枳。殼。甘。草。各。七。分

厚右剉作一貼盛微熱此藥最宜若作感冒發其汗
厚。右。剉。作。一。貼。盛。微。熱。此。藥。最。宜。若。作。感。冒。發。其。汗

一服散

治時行暴嗽六分阿膠二片生薑十片紫蘇十
○。治。時。行。暴。嗽。六。分。阿。膠。二。片。生。薑。十。片。紫。蘇。十

通治咳嗽藥

為先治無痰者以辛甘潤其肺故星半夏治痰
○。為。先。治。無。痰。者。以。辛。甘。潤。其。肺。故。星。半。夏。治。痰

其痰而食者小愈氣積殼橘紅利其氣而痰不能食
○。其。痰。而。食。者。小。愈。氣。積。殼。橘。紅。利。其。氣。而。痰。不。能。食
者。厚。能。食。者。小。愈。氣。積。殼。橘。紅。利。其。氣。而。痰。不。能。食
嗽。者。厚。能。食。者。小。愈。氣。積。殼。橘。紅。利。其。氣。而。痰。不。能。食
而。發。寒。者。謂。之。寒。嗽。小。病。有。二。龍。一。兩。知。母。五。錢。者。謂。之。熱。嗽。
大。體。也。○。謂。之。寒。嗽。小。病。有。二。龍。一。兩。知。母。五。錢。者。謂。之。熱。嗽。
而。痰。滑。也。○。謂。之。寒。嗽。小。病。有。二。龍。一。兩。知。母。五。錢。者。謂。之。熱。嗽。
也。滑。者。宜。有。星。連。咳。嗽。十。數。不。能。出。痰。者。脾。燥。者。宜
枳。殼。紫。蘇。杏。仁。之。屬。利。其。肺。燥。者。脾。燥。者。宜
內。傷。久。則。火。炎。俱。宜。開。鬱。潤。燥。○。外。感。而。胸。下。痛
宜。以。青。皮。附。青。皮。青。黛。薑。汁。胡。為。丸。後。以。二。陳。湯
加。南。星。香。附。青。皮。青。黛。薑。汁。胡。為。丸。後。以。二。陳。湯

湯治咳者勿用去痰伐病根之藥除陰虛血虛火盛乾
咳者勿用去痰伐病根之藥除陰虛血虛火盛乾
清金飲治諸般咳嗽杏仁白茯苓各一錢半橘紅一
貼水煎服子服一名

備急五嗽元嗽五日氣嗽二日飲嗽三日燥嗽四日冷
末下肉桂乾薑白茯苓下十五分丸為

喘證有八喘者火者氣因火鬱而成稠痰在肺胃也
促者謂之喘者火者氣因火鬱而成稠痰在肺胃也

冬寒水鳥病寒則氣衰而息微病熱則氣盛而息粗
而不得隨經上居下故也音者乃肺之絡脈逆

風寒喘尋常感冒風寒內鬱肺脹逆而為喘宜全滯
蘇溫宜加味三物湯參定喘湯小青龙湯止喘元

麻黃散治傷風咳嗽急痰壅涕唾稠粘麻黃二錢桂皮
六分右錢二分款冬花訶子皮甘草各一錢杏仁

人參潤肺散治感冒風寒咳嗽急痰壅鼻塞麻黃二
錢桔梗阿膠各五分橘紅二片同煎服

三二

三二

人參定喘湯 治肺感寒邪喘急亦治咳嗽驚栗痰夏

五錢阿膠珠炒甘草各一錢薑三煎桑白皮半麻黃人參半夏

參蘇溫肺湯 治形寒飲冷則傷肺喘喝煩心胃滿短

草五分桑白皮剉作一木參紫蘇葉肉桂木香五味子陳皮

五味子湯 治寒喘生薑黃桂皮甘草各一錢右剉作一

貼紫蘇三葉煎服

加味三拗湯 治寒喘一錢二分桂皮一錢甘草五分

薑三煎服

九味理中湯 治寒喘蘇子厚朴桂皮陳皮甘草炙

各一錢沉香水煎入沉香木香汁調服

五虎湯 治傷寒喘急麻黃三錢石膏五錢杏仁二錢

白一貼入薑三片葱

止喘元 治喘和兩作三胡椒人參胡肉各等分

痰喘 胃滿外關上炎之狀鬮心痰喘宜千縉湯千縉導

痰化湯加減三奇湯貝母散平肺散紫蘇半夏湯定

乃痰在正發之時閉塞不通而喘當其時却吐痰者

路則易安宜拮梗瓜蒌仁枳殼杏仁蘇葉前胡等

引虛者補以

千縉湯 治痰喘數服即安半夏七枚炮四破皂角炙

服五水煎

干縉導痰湯

治痰喘不能卧一服即安半夏七枚

錢皂角甘草各一寸並灸右

加減三奇湯

治咳嗽喘上氣痰涎不利半夏二錢桔梗

味子各一錢甘草五分

貝母散

治熱嗽及痰喘二母散也

平肺散

治喘嗽痰盛寒熱往來咽乾口燥陳皮一錢

桑白皮五味子杏仁桔梗各七分

紫蘇半夏湯

治喘嗽痰盛寒熱往來桑白皮二錢杏

苑各一錢右剉作

定喘小痰湯

治咳嗽痰喘陳皮二錢五味子甘草各八

分款冬花各七分

潤肺膏

治同上紫苑杏仁款冬花各一兩麻黃桔梗

生薑二兩取汁清油八兩蜜一每斤右先將油煉熟

調下照

蘇子導痰降氣湯

治痰喘上氣蘇子二錢半夏當歸

厚朴枳實赤茯苓各七分甘草五分

大蘿皂丸

治氣喘痰喘風痰食痰酒痰麩毒等證羅

並製杏仁瓜蒌仁便香附青黛陳皮各五錢右為

祛痰丸

治風痰喘嗽人參木香天麻陳皮赤茯苓各七

錢半石鳥末薑汁或薑湯吞下

氣喘

七情所傷氣急而無聲響○驚憂氣鬱湯湯門悶
引息鼻張呼吸不能以息之謂也○驚者是也○喘者

不可用苦寒之藥火盛故也○宜用人參蜜炙黃而喘
而喘門冬地骨皮之類○以瀉其氣○因人參黃芪過多

四磨湯加味○白朮散○磨湯○杏仁半夏湯○蘇子降氣湯
沉香降氣湯○四君子湯

四磨湯治七情鬱結上氣喘急人參攪榔沉香烏藥
右各等分濃磨水取七分盞煎三五沸微溫

六磨湯治同上又治胃中氣膈甚當四磨湯
加木香枳殼等分製法服法同上

清金湯治咳嗽喘急胃滿氣逆坐卧不安陳皮赤茯苓
杏仁阿膠珠珀五味子桑白皮薏苡仁紫蘇

加味白朮散治氣虛喘急飲食不進又治喘飲酒
夏各一錢右作一服○薑三片桑白皮七寸同煎

定肺湯治白皮喘紫菀甘草各一錢右剉作一貼
入薑五片煎服

杏仁半夏湯治肺氣不足喘咳杏仁半夏各一錢
薄荷各五分薑三分甘草一分煎服

杏蘇飲治上氣喘浮腫紫蘇葉二錢紫苑甘草各
一錢陳皮桔梗麻黃桑白皮阿膠珠各七分

調降湯治喘嗽上氣枳殼陳皮蘇子各一錢半夏
半五錢右剉作一服

調降湯治喘嗽上氣枳殼陳皮蘇子各一錢半夏
半五錢右剉作一服

調降湯治喘嗽上氣枳殼陳皮蘇子各一錢半夏
半五錢右剉作一服

調降湯治喘嗽上氣枳殼陳皮蘇子各一錢半夏
半五錢右剉作一服

調降湯治喘嗽上氣枳殼陳皮蘇子各一錢半夏
半五錢右剉作一服

調降湯治喘嗽上氣枳殼陳皮蘇子各一錢半夏
半五錢右剉作一服

調降湯治喘嗽上氣枳殼陳皮蘇子各一錢半夏
半五錢右剉作一服

調降湯治喘嗽上氣枳殼陳皮蘇子各一錢半夏
半五錢右剉作一服

調降湯治喘嗽上氣枳殼陳皮蘇子各一錢半夏
半五錢右剉作一服

調降湯治喘嗽上氣枳殼陳皮蘇子各一錢半夏
半五錢右剉作一服

調降湯治喘嗽上氣枳殼陳皮蘇子各一錢半夏
半五錢右剉作一服

調降湯治喘嗽上氣枳殼陳皮蘇子各一錢半夏
半五錢右剉作一服

調降湯治喘嗽上氣枳殼陳皮蘇子各一錢半夏
半五錢右剉作一服

調降湯治喘嗽上氣枳殼陳皮蘇子各一錢半夏
半五錢右剉作一服

調降湯治喘嗽上氣枳殼陳皮蘇子各一錢半夏
半五錢右剉作一服

調降湯治喘嗽上氣枳殼陳皮蘇子各一錢半夏
半五錢右剉作一服

調降湯治喘嗽上氣枳殼陳皮蘇子各一錢半夏
半五錢右剉作一服

各七分白豆蔻木香縮砂紫蘇葉各五分右剉作一貼當歸八分赤茯苓陳皮厚朴甘草
加味四君子湯 治氣喘人參白朮茯苓陳皮各一分香附五分
 取砂蘇子桑白皮各六分薑三棗二木香各五分煎和香汁調

火喘

者手太陰之脈是動則心胃脹滿膨而喘咳所生病
 行于胃中而作也火攻也則有老人素行動則或吐
 而喘者是衝脈之動也稍行動則氣促喘急以滋腎
 九唾血痰平居則不喘稍行動則大減此泄衝脈之
 火邪故如此其效也喘大於胃而有實火者
 進邪退得食則減食已喘大於胃而有實火者
 已上稠痰食入於咽再升上稠痰反大皆葉都督患
 此作胃虛治以燥藥再升上稠痰反大皆葉都督患
 此諸藥不愈後以導水九防利五六次而安明

寒方○熱喘者發于夏不發于冬
 效○門加瓜蒌仁以清金降火消痰
 萎○仁以清金降火消痰
 減○湯以清金降火消痰
 肺○枯活人書云發喘者氣有餘則當清肅下看文字
 得○本意肺氣若盛而有餘則當清肅下看文字
 以○其大入于肺衰與不足而為喘焉故言盛者瀉
 肺○中火入于肺衰與不足而為喘焉故言盛者瀉
 劑○實補肺也寒之
雙玉散 治熱喘未痰每取如泉寒水石湯石膏各等分
麥門冬湯 治火喘末痰每取如泉寒水石湯石膏各等分
 貼水煎服日二匙○肺脹滿膨而喘者多用
 五○味子煎服日二匙○肺脹滿膨而喘者多用
 則○交參若氣盛去五味子入參加黃芩荆芥穗
 味○子交參若氣盛去五味子入參加黃芩荆芥穗

如油一婦素有痰忽一日大喘痰出如泉身汗
漸少再五加瓜一錢半煎服一貼當歸芍藥黃芩各
一錢五分再服二錢餘貼而安此
門冬五服二錢餘貼而安此

加減瀉白散治陰氣在下陽氣在上咳嘔喘促桑白
各三分八分陳皮一錢半地骨皮赤茯苓各一錢二分

加味生脉散治三脉伏喘促手足厥逆用此救之五味
單人判作湯一貼入薑五棗二水煎服或元氣素
脈虛傷寒汗下後氣短氣促生不煎服或元氣素

瀉火清肺湯治火喘赤茯苓蘇子枳實桑白皮陳
作分沉香五分水煎入沉香汁朱砂末竹瀝調服

玉液散治喘嗽口乾煩渴瓜蒌根知母貝母炒各一
同調服之入米飲

玉華散治咳嗽上喘清肺氣利咽甜葶藶炒桑白
合人參各一錢百部根甘草半夏紫苑杏仁貝母百

水喘 肺湯必生喘二效新暴喘有聲怔忡喘息宜葶藶散
必生喘二效新暴喘有聲怔忡喘息宜葶藶散

水喘 肺湯必生喘二效新暴喘有聲怔忡喘息宜葶藶散
必生喘二效新暴喘有聲怔忡喘息宜葶藶散

水喘 肺湯必生喘二效新暴喘有聲怔忡喘息宜葶藶散
必生喘二效新暴喘有聲怔忡喘息宜葶藶散

水喘 肺湯必生喘二效新暴喘有聲怔忡喘息宜葶藶散
必生喘二效新暴喘有聲怔忡喘息宜葶藶散

水喘 肺湯必生喘二效新暴喘有聲怔忡喘息宜葶藶散
必生喘二效新暴喘有聲怔忡喘息宜葶藶散

水喘 肺湯必生喘二效新暴喘有聲怔忡喘息宜葶藶散
必生喘二效新暴喘有聲怔忡喘息宜葶藶散

葶藶散

治水喘或面浮葶藶子炒黃芩末

葶藶大棗瀉肺湯

葶藶子炒黃芩色烏未蜜和飲如喘急

丸以六棗二十枝水三升煎取二升去棗入一丸

更煎取一升喘咳不已服此孫兆治一人吐痰頃間已

神效湯治上氣喘急不得卧則喘者水氣逆行上

神效湯治上氣喘急不得卧則喘者水氣逆行上

平氣散治濕熱喘急白牽牛頭末二兩半生半炒大

因濕熱太盛而為喘邪氣盛則實實者宜緩下之用

因飲酒及渣乳得腹脹滿聲聞舍外不得安臥

因飲酒及渣乳得腹脹滿聲聞舍外不得安臥

加減瀉白散

乾時時咳減半再服喘止但有胃滿

平肺湯

肺與腎皆至陰積水喘急咳

久喘

或入益氣湯短不能接續似喘非喘者單入參湯或調

單入參湯

治氣虛喘急入參一兩到水煎與獨參湯

至二斤乃愈

東晉書卷之五

四十一

小蘿兒丸 治久喘最妙 蘿子蒸二兩 薑仁海粉各一兩

右烏末薑汁入蜜和勻 嚙

人參半夏丸 化痰墜涎 止咳喘 治風痰 食痰

寒水石各一兩 人參赤茯苓薄荷南星 凡薑白礬

十九日 三錢

人參紫苑湯 治咳嗽喘急 久不愈 鴛粟殼 豆製二錢

子桂枝各五分 人參紫苑甘草各四分

定喘湯 治肺虛久喘 歌日 和劑須投定喘 勿阿膠半

強鴛粟二錢 須蜜炙三錢 煎服 此方與 人參定

喘湯同但兩錢 之數異宜考

蠟煎散 治虛勞久喘 嗽或咯膿血 杏仁參麥門冬

灸各等分 右為鹿末每三錢 入

金不換散 治喘嗽 甘草各三錢 煎服 此方與 人參定

服梅一煎

人參潤肺丸 治肺虛咳嗽 日久成勞 知母三兩 桔梗

甘草各二兩 右為鹿末每三錢 煎服

胃虛喘 加杏仁極 則氣上逆 撞肩 腹喘而身熱 煩散

云胃為氣逆 又云 凡服 胃虛喘 則身熱 煩散

陽明厥則喘逆 連歲則死 連經則生 此胃喘宜加

減白虎湯

之類 類 類

陰虛喘 加血虛則湯無所以附而奔宜四者氣倍下藥

直補清道而益精血四物湯合二陳湯加枳殼黃芩

知母黃柏霜雪梨膏緩則治其本宜滋陰清化膏

其標宜玄霜雪梨膏緩則治其本宜滋陰清化膏

去死凡喘慎不得臥其必死宜按四物湯加竹瀝童便

寧肺湯 治肺虛潤肺五子痰寧嗽發熱自汗五味子麥冬川

分人參桑白皮一貼入薑五煎服及痰嗽陳皮半夏熟

潤肺豁痰寧嗽湯 治陰虛喘急及痰嗽陳皮半夏熟

分酒洗款冬七花分黃芩酒洗梔母天門冬麥門冬紫

三作水煎服薑

人參五味子散 治氣血勞傷虛損喘嗽膿血寒熱盜

地黃當歸甘草胡各五分右剉作一貼入薑三煎服

煎服日 諸傷發喘 凡夜行則喘出於腎有驚恐肺有所墮

肺者氣傷則已怯者着而為病也骨當是之

宜致嗽宜食熱致打撲致紫苑茸湯

甘膽丸 治吃酸搶喉因成寸段中半劈開用猪膽汁

五服四五天取茶清吞下臥服神效曾有人患此

病諸藥不效用 葶藶散 治過食煎炒及酒以致喘急不得臥及肺

葶藶散 治過食煎炒及酒以致喘急不得臥及肺

葛根 右剉作一便各一錢 薑三錢 水煎服五分

紫苑 湯急治過食煎紫苑 邪熱傷肺 咳嗽 咽痺 痰多 喘

杏參散 治腹墮驚恐 渡水 跌仆 喘急 不安 杏仁 紫苑

喘嗽通治藥 宜散杏參 膠散 含膏 九定 喘化

杏參散 通治錢半 嗽右 剉急 杏仁 人參 桑白皮 煎服

含膏丸 通治各一 喘右 剉急 杏仁 人參 桑白皮 煎服

定喘化痰散 治喘至乾 每納半 夏白 磐各 一字 入

杏膠飲 夏製入 參散 煎服 每兩 錢半

雞鳴丸 治兩八 般咳嗽 喘吐 血諸 證如 神知 母炒

子大 杏仁 葶藶 子炒 薑棗 煎湯 胃咳 小腸 六八

者肝 咳心 咳脾 咳肺 咳腎 咳胃 咳小 腸六 八

本草綱目卷之五

四十六

雞鳴丸 內膽咳因咳氣咳三焦咳內因咳外因咳不
皮通治喘嗽咳知母酒熟咳暴咳也翻春
皮蜜炒款冬花旋覆花天門冬麥門冬人參
各等分右為末蜜杏仁麩子炒大以烏梅湯或薑湯化

下劑一
喘嗽宜辨寒熱 因風者遇風則嗽甚因寒者值寒則嗽
的但問遇夜飲酒夜間如何若酒後嗽甚則黃
熱也喫酒了嗽減則有寒也此清白者有寒也黃
濁者有

喘嗽宜分虛實 治法最要分肺虛實若肺虛久嗽宜五
肺實有火邪或新嗽宜黃芩天粉桑白皮葶藶
子之類馮之傷久病氣虛而喘宜葶藶阿膠人參五
味子新病氣實而喘則實桑皮夏則虛若實則面赤
生新病大抵秋冬則實春夏則虛若實則面赤

飲水身熱痰盛涕唾稠粘或咽乾而腫若虛則面
白脫色氣少不語喉中病嗽者
寒八九月間肺氣大宜瀉之嗽者
病必實非久病也宜瀉之嗽者

喘嗽聲嘶 常喘聲嘶乃血虛受熱連四物湯
喘嗽上氣出於腎虛 夫腎虛而上病不能納諸氣以歸元
髓虛多唾足冷骨痿胃腹受病之俱為之牽掣其嗽
愈重其聲愈乾君子當於受病之處圖之可也
抑猶有說焉凡咳嗽暴動引氣也肺氣之可也
為氣之藏凡咳嗽暴動引氣也肺氣之可也
逆奔而上此腎虛不能收氣也當以補骨脂安腎
元虧而主之毋徒從事於寧肺也當以補骨脂安腎
氣不得歸元上空心氣急宜安腎元氣之逆也
人參湯吞下元上空心氣急宜安腎元氣之逆也

喘嗽切藥 諸喘不止後因痰治痰因火治火虛弱湯勿調用
止之止後因痰治痰因火治火虛弱湯勿調用

喘嗽切藥 諸喘不止後因痰治痰因火治火虛弱湯勿調用
止之止後因痰治痰因火治火虛弱湯勿調用

喘嗽切藥 諸喘不止後因痰治痰因火治火虛弱湯勿調用
止之止後因痰治痰因火治火虛弱湯勿調用

喘嗽切藥 諸喘不止後因痰治痰因火治火虛弱湯勿調用
止之止後因痰治痰因火治火虛弱湯勿調用

喘嗽切藥 諸喘不止後因痰治痰因火治火虛弱湯勿調用
止之止後因痰治痰因火治火虛弱湯勿調用

喘嗽切藥 諸喘不止後因痰治痰因火治火虛弱湯勿調用
止之止後因痰治痰因火治火虛弱湯勿調用

喘嗽切藥 諸喘不止後因痰治痰因火治火虛弱湯勿調用
止之止後因痰治痰因火治火虛弱湯勿調用

喘嗽切藥 諸喘不止後因痰治痰因火治火虛弱湯勿調用
止之止後因痰治痰因火治火虛弱湯勿調用

喘嗽

研○諸喘切藥蘿葑子蒸熟一兩皂角燒灰三五錢
右為末薑汁加蜜九倍子服○熟治嗽切藥五味子五錢
錢甘草一錢末蜜九倍子服○熟治嗽切藥五味子五錢
硝各一錢末蜜九倍子服○熟治嗽切藥五味子五錢

留舌上代佛耳草雄黃等分星末拌艾以生薑一礮
草有鬱金用艾燒之須令烟入喉中一方無佛耳
之花○三錢為末每取二錢管石艾捲筒子燒烟吸
潤之口中有茶常呷下燒藥却以冬花如雞子大蜜拌
紫苑甚效如翹上○法無款冬花則用
紫苑甚效如翹上○法無款冬花則用

哮喘

者以聲響言喘以氣息言○哮喘即痰喘甚而常發
乎痰宜吐法也必須薄滋味研不可用涼藥必帶表
散此寒包熱也必須薄滋味研不可用涼藥必帶表
坊者見一二者屬寒包熱也必須薄滋味研不可用涼藥必帶表

劑防其熱至冬預於八日未寒之時用承氣湯
下病者十宜溫散一黃正當每貼用一月之為此
年得汗吐泄宜溫散一黃正當每貼用一月之為此
末入薑汁煎服○喘促候中如雞小響者謂之喘
九津連續下○喘促候中如雞小響者謂之喘
促而連續下○喘促候中如雞小響者謂之喘
用紫金丹二不能九以息者謂之喘虛者止○喘
不吐因臨發時用水蓄於肺為痰宜去豆豉更妙
考者因臨發時用水蓄於肺為痰宜去豆豉更妙
青龍湯○欲斷根者宜服○定○散○解○表○二○陳○湯○五○虎○二
坊見○湯○欲斷根者宜服○定○散○解○表○二○陳○湯○五○虎○二
○遇厚○宜用奪命丹立○定○散○解○表○二○陳○湯○五○虎○二
○喘厚○宜用奪命丹立○定○散○解○表○二○陳○湯○五○虎○二
陳湯三
白丸
紫金丹
治哮喘不得臥須三年後者可服此末
并和分作三分用紙筋泥包裹肉細切四兩三味
火煨青烟出盡為度放地上宿出火毒取為末

湯浸蒸餅和丸九菜豆一大食後冷茶清下類人
紫金丹凡遇不進氣欲作兩便發積有冷痰至天陰不得

氣從背口鼻而入則肺發即服此病有苦至終身
者亦有子母相傳者每發即服不過七八次覺痰
腥臭吐白沫相傳者每發即服不過七八次覺痰
白礬三錢另研淡豆豉其根本也白礬一錢生用枯
右末合和煨作丸如菜豆大冷茶送下七丸甚者
九丸以不喘為愈不必多服久服之奏效必矣

細
定喘湯歌曰諸病原來有藥方惟愁窮喘最難當麻

同半夏水煮百沸不須薑病人遇此良甘草黃芩
方知定喘湯○治哮喘神方麻黃三錢杏仁一錢後
煎服不
果御銀二下夏桑白皮蘇子款冬花甘草各一貼水

清金丸治哮喘遇厚味發者羅當子淘洗蒸熟晒乾
浸蒸餅和丸如蘿蔔子大每取三四錢右末薑汁
九淡薑湯吞下○一名清金丹

兜鈴丸治兩信此喉喘促不得臥馬兜鈴杏仁蟬退各一
送下以冷葱茶清

奪命丹治三錢胎喘嗽上氣信砒半錢白礬二錢白附
白礬於石器內煨星四錢半夏五錢右先將信砒
鐵器却入餘藥末勻薑汁麩糊和丸如黍米大
朱砂為衣每服七丸小兒三丸井吞下忌食熱
毒物○此方治痰喘劫劑也病安之後即知母
茯苓湯以補虛可也明寧

立定散治哮喘秘方大皂角一箇劈開去子入巴豆
仁各一錢香油煮黃俱為細末每柿餅
一錢香細嚼服之溫水送下

仁各一錢香油煮黃俱為細末每柿餅

一錢香細嚼服之溫水送下

一錢香細嚼服之溫水送下

一錢香細嚼服之溫水送下

一錢香細嚼服之溫水送下

一錢香細嚼服之溫水送下

面浮者葶藶散坊見大槩養肺養氣養血清金降
火門○肺痿將變為癰宜紫菀散散○咳嗽有濁
唾涎沫或咳嗽中紅線膿血名曰肺痿熱在
上焦故也宜門冬清肺飲人參養肺湯切勞散
方化諸

生薑甘草湯治肺痿咳吐涎沫生薑五錢人參二錢
煎服日

甘草乾薑湯治肺痿吐涎沫而不咳甘草炙四錢
乾薑炮二錢右剉作一貼水煎服

知母茯苓湯治肺痿喘咳寒熱往來自汗知母赤茯苓
各六分川芎阿膠珠各四分薄荷三分右剉作一

人參平肺散治心火刑肺傳為肺痿咳喘
服貼水煎

地骨皮甘草炙各一錢
皮青皮各五分五味子二錢
服水煎

紫菀散治肺痿咳喘血痰成癰紫菀知母貝母
右剉作一貼五味子三錢
服水煎

門冬清肺飲治肺痿證紫菀氣促黃芪白芍藥甘草
各一錢半人參麥冬各一錢當歸身六
分五味子十五粒右剉作一貼水煎服

人參養肺湯治肺痿證桑白皮一錢後熱并聲
貝母杏仁枳實桔梗各七分人參阿膠珠甘
草各五分右剉作一貼水煎服

切勞散治心腎俱虛勞嗽二股倦急飲食減少
黃瘦不治便成羸劣之疾也
服水煎

東醫寶鑑卷之五

五十一

擒化仙方 治痰盛咳喘吐膿血名曰肺痿甜梨汁生

參各二兩五和九彈子兩大臨卧去滓成膏入
咳逆證 咳逆口而作聲之逆乃氣病也內經曰諸自膈下直衝上出

火所乘不胃為養胃之未審孰為降火且以丁香補虛人
逆上言胃弱陰守木挾相火乘之故直衝清道而

其聲逆是為也宛耳大抵人所謂乾嘔是也所謂病甚者
逆過尋方論無此名虛蓋逆者經是也所謂病甚者

或三五聲上衝而作聲八聲而止或發連逆額上
出氣不連聲者或有病最久脾胃衰敗不治之證也

咳逆與噦為一曰噦東垣海藏以許學士謂之噦陳無擇是以

為已無息也疾逆引靈樞經云大噦以草刺鼻可已詳此
而三法正立止或閉口鼻氣無息亦立已或作

皆因病聲之輕重而名也謂之噦者噦聲為得經也
○咳逆古人之謂之噦而名也謂之噦者噦聲為得經也

外感凡吐利後大怒而發其證有餘不足者因內傷及大病
或至八九聲相連收氣不逆至胃中虛人者若傷寒

下虛極宜插皮乾薑湯或香散○夏生薑湯或香散
苦胃滿脈數宜小柴胡湯或香散○夏生薑湯或香散

皮竹茹湯半夏生薑湯或香散○夏生薑湯或香散
失下而發急者宜調而肺陰不納何其當哉故便秘

者大承氣湯又有雜病咳逆者馮心湯主之

痢後咳逆 痢後咳逆 痢後咳逆 痢後咳逆 痢後咳逆

片煎者宜補氣從膈下逆上夜分轉甚者四物湯加

後由中氣虛甚也補中益氣湯調中益氣湯於

食塞咳逆 飲食填塞胃中或食物太甚噎而不下發

入于胃散胃氣上注于肺今有故寒氣與新穀氣俱

痰閉咳逆 痰閉咳逆 痰閉咳逆 痰閉咳逆 痰閉咳逆

薑汁炒肺前服或人參蘆煎湯而吐之痰挾氣虛

蘆瀉肺前服或人參蘆煎湯而吐之痰挾氣虛

發咳宜六君子 湯方現 痰閉咳逆

水結咳逆 水結咳逆 水結咳逆 水結咳逆 水結咳逆

飲水過多而吃逆者別無惡候五苓散主之

過笑咳逆 過笑咳逆 過笑咳逆 過笑咳逆 過笑咳逆

咳逆易治難治證 咳逆易治難治證 咳逆易治難治證

收氣不回者難治 收氣不回者難治 收氣不回者難治

橘皮乾薑湯 橘皮乾薑湯 橘皮乾薑湯 橘皮乾薑湯

橘皮半夏生薑湯 橘皮半夏生薑湯 橘皮半夏生薑湯

貼水煎 貼水煎 貼水煎 貼水煎 貼水煎

服法 服法 服法 服法 服法

人參通草各一錢右剉作一貼水

陳皮半夏各一錢右剉作一貼水

乾薑生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

煎服之

丁香柿蒂散

治大病後胃中虛寒咳逆丁香柿蒂人

草二錢半生薑七錢半右烏龍末每方七味各一

錢甘草半錢劉煎服亦可

羌活附子湯

治同上羌活附子炮苗香炒乾薑炮木

同煎服

三香散

治胃冷咳逆沉香白豆蔻紫蘇葉各等

橘皮竹茹湯

治胃虛嘔吐而咳逆橘皮三錢人參二

殼入薑五棗二水煎服加白芍

半夏生薑湯

治入青竹茹雞子大水煎服

鮮陳湯

取嚏法

一人患傷寒將愈忽患咳逆吃又吹又止凡百

嗅法

合靈樞草刺鼻嚏之法同

硫黃嗅法

急令患人當鼻下嗅其氣

雄黃嗅法

急令患人嗅其熱氣

一方

治咳逆久不止將乳香紙捲

禁忌法

凡大嗽忌用鷲粟殼肉豆蔻等燥藥

嗽喘咳逆不治證

發熱脈小堅急者死

乾咽燥有痰者不可用南星半夏

母若飲水者又不宜瓜蒌恐泥膈不鬆快耳

更醫寶鑑卷五

五十四

咳逆多論有餘不足米
泔水一咒同飲即效

單方

人參

參凡二二三種有人
參湯主肺虛氣短氣促
喘急人參膏人參一
寸獨參

救矣
惡候服藥不效則宜灸之
黃而微散者死
見沉微散者死
者不治翻者死
尋常行多壅逆而喘
氣盛目之壅逆而喘
譫語喘滿者肺絕
潤喘者為肺絕
前高起手足厥冷
汗如油汗出如珠
難治如油汗出如珠
不治如油汗出如珠
血上氣不得臥者必死
肺脹有咽瘡失音者必死
上氣不得臥者必死

桃二箇去殼不去皮
胡桃湯一名參桃湯
也胡桃湯一名參桃湯
鬱熱不可用反增而滿
嗽劇宜以沙參或玄參代

五味子

主咳嗽上氣身熱
用之藥味參五
味子麥門冬治肺虛自

汗或法然驟用之恐閉
東垣之法然驟用之恐閉
無用可

生薑

主咳嗽上氣
生薑以辛氣能發散
升半生薑汁半合蜜煎
逆生薑汁半合蜜煎

瓜蒌實

治痰嗽利胃
切焙子為末用瓜蒌湯
九切焙子為末用瓜蒌湯

東醫寶鑑卷之五
五十五

潤能降氣宜為
治嗽要藥也

半夏 治痰嗽生薑切及形寒飲冷傷肺而咳

葶藶子 炒主肺氣壅上切各半煎服即效

苧麻根 治哮喘取根和砂糖爛煮時

馬兜鈴 主取裏面子童便拌炒甘草灸一兩去殼

桑白皮 治肺氣喘滿去肺熱補肺也

皂莢 主九咳者當戒蓋以出肺氣然性不純良

鯉魚肉 或取肉作膾以薑醋食之亦佳

橘皮 治咳上氣橘紅四兩甘草炙一兩為末每二

胡桃 與生薑三片臨取細嚼以溫湯呷下

杏仁 便浸半月上氣喘促及咳出研取每服一棗子

梨 主熱嗽○杏仁散便浸梨一仁取其利肺氣潤劑也

紫蘇子 治肺氣喘急之咳蘇子水擣取汁和

鷓鴣粟殼 欬肺止咳素壯人久嗽即效粟殼蜜炒為末

醫藥寶鑑卷之五

五十一

雞子 調下錢蜜湯 經治三日臨夜暫煮食之連日服蓋能去風痰故

猪肺 治咳嗽喘急肺痿吐血猪肺一箇洗去血水若

阿膠 須治肺虛損極咳嗽垂膿血非阿膠不補

猫頭骨 治哮喘喘不得睡取頭骨燒為

人尿 童子尿尤好又主久嗽失音尿飲

鍼灸法

五乳下黑肉際各百壯夜不咳聲破喉亦衣袂天突
背灸肺俞病也急灸之而愈十壯久嗽宜灸膏肓
穴傷寒如不愈灸天突不可治矣遠年咳嗽灸直骨
三壯男左女右氣喘不可治矣遠年咳嗽灸直骨
璇璣喘不得發取雲門中膻中膻中膻中膻中膻中
缺關逆氣逆得發取雲門中膻中膻中膻中膻中膻中
逆灸關元七壯無效灸中膻中膻中膻中膻中膻中
乳相直骨間壯立愈灸中膻中膻中膻中膻中膻中
齊處是穴艾炷如小婦人即屈三乳頭向下一指許正與
肌逆不一云其穴當二取穴即下骨動脈處是也
海五壯或七壯亦立止灸右足三陰交可右側者
可海五壯或七壯亦立止灸右足三陰交可右側者

灸左足三陰
交立安研

東醫寶鑑卷之五

五十一

東醫寶鑑雜病篇卷之五

