



東醫百寶鑑

癰疽
疔毒
瘰癧
癩瘡

雜考篇

ヤ 9
773
17





東醫寶鑑雜病篇卷之七

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君 臣許浚奉 教撰



痲瘧

瘧病之源

瘧病之源者內經曰夏傷於暑秋為痲瘧。又曰暑氣內傷，則痲瘧。蓋形弱而氣燄，穴俞以閉，發熱為痲瘧。風瘧者，風氣內傷，則痲瘧。寒瘧者，寒氣內傷，則痲瘧。暑瘧者，暑氣內傷，則痲瘧。濕瘧者，濕氣內傷，則痲瘧。燥瘧者，燥氣內傷，則痲瘧。火瘧者，火氣內傷，則痲瘧。水瘧者，水氣內傷，則痲瘧。

瘧病之起，由於氣血不和。血氣不和，則百病叢生。瘧病之起，由於氣血不和。血氣不和，則百病叢生。瘧病之起，由於氣血不和。血氣不和，則百病叢生。

瘧病之起，由於氣血不和。血氣不和，則百病叢生。瘧病之起，由於氣血不和。血氣不和，則百病叢生。瘧病之起，由於氣血不和。血氣不和，則百病叢生。



日溫瘧納其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨
發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘧瘧謂熱

寒熱往來

足假令寸脈微名曰陽不足陰氣上乘之何謂陽不
新惡寒何謂陰中不足發熱也尺脈弱名曰陰不足陽
則發熱大抵陰中不足發熱也尺脈弱名曰陰不足陽
不足則陰邪入裏而與陽爭乃陰勝而為寒也陽
不足則陽邪入裏而與陰爭乃陽勝而為熱也若
邪入而正氣不與之爭則但熱而無寒矣陽不足若
熱先寒表陰不足則先寒後熱也
寒順行則發熱也少陽者東方之氣也逆之則發
明身後大陽金燥也少陽之氣也
明者大陽金燥也少陽之氣也

瘧發日數多少

則惡寒近前失守真邪不分陰陽迭勝寒熱互起
○則甚者內外失守真邪不分陰陽迭勝寒熱互起
定時矣
皮之氣得而外居者得之於皮膚之內腸胃
於陰此氣得而外居者得之於皮膚之內腸胃
以日作○於陰此氣得而外居者得之於皮膚之內腸胃
病其併○於陰此氣得而外居者得之於皮膚之內腸胃
離其間日發熱已至次日又集於五藏則復病也
○離其間日發熱已至次日又集於五藏則復病也
其道遠其行遲不能與邪氣俱行數日發或渴或
不渴其故何也○其道遠其行遲不能與邪氣俱行數日發或渴或
府而有時相失不能相得故邪氣與日乃作也○府而有時相失不能相得故邪氣與日乃作也
陰陽更勝也或甚或不甚故邪氣與日乃作也○陰陽更勝也或甚或不甚故邪氣與日乃作也
發者受病一月二日連發也○發者受病一月二日連發也
也又曰三日一月二日連發也○也又曰三日一月二日連發也

夏傷於暑熱氣盛於皮膚之內腸胃

三

煎服

麻黃羌活湯

治太陽瘧無汗即前法去桂枝

柴胡桂枝湯

治少陽瘧寒熱往來柴胡二錢

柴胡加桂湯

治少陽瘧往來寒熱極驗柴胡三錢

白虎桂枝湯

治溫瘧者其脈如平身無寒但熱骨節煩

麻黃白朮湯

治風瘧麻黃桂枝皮青皮陳皮川芎白芷

柴胡四物湯

治三陰經溫瘧或夜發者柴胡甘草川芎當

桂枝芍藥湯

治大瘧寒熱大作此太陽陽明合病也謂

桂枝石膏湯

治太陽陽明合病問日瘧熱多寒少石

桂枝黃芩湯

治陽明病後寒熱轉甚者知太

瘧書發夜發宜分治

益氣湯發宜加半君子湯發宜加血

瘧書發夜發宜分治

五

五

煎服

麻黃羌活湯

治太陽瘧無汗即前法去桂枝

柴胡桂枝湯

治少陽瘧寒熱往來柴胡二錢

柴胡加桂湯

治少陽瘧往來寒熱極驗柴胡三錢

白虎桂枝湯

治溫瘧者其脈如平身無寒但熱骨節煩

麻黃白朮湯

治風瘧麻黃桂枝皮青皮陳皮川芎白芷

柴胡四物湯

治三陰經溫瘧或夜發者柴胡甘草川芎當

桂枝芍藥湯

治大瘧寒熱大作此太陽陽明合病也謂

桂枝石膏湯

治太陽陽明合病問日瘧熱多寒少石

桂枝黃芩湯

治陽明病後寒熱轉甚者知太

瘧書發夜發宜分治

益氣湯發宜加半君子湯發宜加血

瘧書發夜發宜分治

五

五

夏時金匱要略卷之六

五

五

麻黃黃芩湯

夜發熱宜柴胡四物湯見桃仁承氣湯
錢夜發熱心一錢黃芩三錢黃芩二錢甘草一

受邪水煎臨服○辨仁味苦甘辛肝者以緩之海血

有邪散血緩肝氣燥經所謂肝苦急食甘以緩之陰經

柴胡芎歸湯

梗當歸赤芍藥人參厚朴白朮茯苓陳皮各七分
紅花甘草各三分五分剉碎一貼入薑三棗二梅一

服水煎

諸瘧證治

瘧有風瘧寒瘧熱瘧濕瘧痰瘧老瘧食瘧
諸瘧證治瘧有風瘧寒瘧熱瘧濕瘧痰瘧老瘧食瘧

風瘧

自汗感風而得先熱後寒宜麻黃白朮湯

寒瘧

自感寒而得寒多熱少宜人參養胃湯

熱瘧

因暑勝熱多得一見一名瘧疾齊曰暑瘧宜人參白

濕瘧

因冒襲而濕汗出濕得之寒相半小便

痰瘧

因外感內傷鬱聚成痰頭眩或四獸飲食嘔吐甚則

食瘧

一名復寒因飲食失節飢飽不能傷所食則吐復熱

勞瘧

即久瘧也寒熱微寒中熱中寒最難經

勞瘧

治即久瘧也寒熱微寒中熱中寒最難經

白帶實監注西卷之二

五

年不差不宜露歸驚甲散常山飲五勞元六和湯烏
 頭七乘湯露歸驚甲散常山飲五勞元六和湯烏
 砂元養胃丹喘久虛屬元氣虛寒蓋氣虛則寒
 血虛則熱胃虛則惡寒脾虛則發熱陰火下流則
 寒熱交作或吐涎不食或泄瀉腹中益氣湯酌
 戰如慄皆胃虛弱也但服補中益氣湯酌
 證愈愈若不投清脾
 截瘧多致不起
 辟邪丹雄客丹或燒人湯土作九塞男左女右鼻

疫瘧 藥宜不換金正氣散寒門如意丹五瘟丹瘧瘧丸
 瘧疾宜不換金正氣散寒門如意丹五瘟丹瘧瘧丸

瘴瘧 扶山溪嵐瘴蒸毒之氣令人迷罔發狂或作寒
 九羌活蒼朮湯瘧瘧丸

瘵瘧 者老瘵也以其隔三日一發纏綿不去也
 日一作瘵者邪入於三陰經也作於子午卯酉日者
 少陰經也作於寅申巳亥日者
 於辰戌丑未日者
 解夫感胃與風皆外邪也故非汗多不解必汗
 參而虛又行補為君加柴葛等發散藥而收汗得
 汗出至足方是佳兆○屬陰瘵最難得汗暑之邪入
 陰分宜用血藥引出病極深而散古方多用峻劑恐
 非所宜○若感病極深而散古方多用峻劑恐
 自後實之府其發無時必亂而失期若發於午
 佳兆故治此病者血受病也易秋冬為難愈漸發於
 汗之難易為優劣也○易秋冬為難愈漸發於
 瘵必有痰水瘵血結成痞塊於腹不能除但製
 乃瘵母也雖內虛非成痞塊於腹不能除但製
 熱則不損胃老瘵元補脾化血虛者宜驚甲丸有
 癖者暫用消癖元補脾化血虛者宜驚甲丸有
 實用老瘵散○老瘵宜七棗湯驚甲飲子
 參歸驚甲散○老瘵宜七棗湯驚甲飲子

參歸驚甲散○老瘵宜七棗湯驚甲飲子
 實用老瘵散○老瘵宜七棗湯驚甲飲子
 癖者暫用消癖元補脾化血虛者宜驚甲丸有
 熱則不損胃老瘵元補脾化血虛者宜驚甲丸有
 乃瘵母也雖內虛非成痞塊於腹不能除但製
 瘵必有痰水瘵血結成痞塊於腹不能除但製
 汗之難易為優劣也○易秋冬為難愈漸發於
 佳兆故治此病者血受病也易秋冬為難愈漸發於
 自後實之府其發無時必亂而失期若發於午
 非所宜○若感病極深而散古方多用峻劑恐
 陰分宜用血藥引出病極深而散古方多用峻劑恐
 於辰戌丑未日者
 解夫感胃與風皆外邪也故非汗多不解必汗
 參而虛又行補為君加柴葛等發散藥而收汗得
 汗出至足方是佳兆○屬陰瘵最難得汗暑之邪入
 陰分宜用血藥引出病極深而散古方多用峻劑恐
 非所宜○若感病極深而散古方多用峻劑恐
 自後實之府其發無時必亂而失期若發於午
 佳兆故治此病者血受病也易秋冬為難愈漸發於
 汗之難易為優劣也○易秋冬為難愈漸發於
 瘵必有痰水瘵血結成痞塊於腹不能除但製
 乃瘵母也雖內虛非成痞塊於腹不能除但製
 熱則不損胃老瘵元補脾化血虛者宜驚甲丸有
 癖者暫用消癖元補脾化血虛者宜驚甲丸有
 實用老瘵散○老瘵宜七棗湯驚甲飲子
 參歸驚甲散○老瘵宜七棗湯驚甲飲子

散邪湯 治風癩初起川芎白芷麻黃白芍藥防風荆芥紫蘊葉羌活各一錢甘草五分右剉作一

貼入薑三葱白三薑煎

正氣湯 治同上柴胡前胡川芎白芷半夏麥門冬檳榔草果青皮赤茯苓各一錢掛枝甘草各五

分右剉作一貼入薑三棗二水煎服

交解飲 治寒癩即雙解 飲子也防見解 面青振寒草果附子炮各二

果附湯 治脾寒癩疾 錢半右剉作一貼入薑七棗二水煎服

草果飲 治寒癩 藥甘草各一錢右剉作一貼水煎服

柴胡桂薑湯 治邪在半表裏寒熱往來極驗柴胡三錢桂枝各一錢半天花粉黃芩各

右剉作一貼水煎服

柴胡知母湯 治熱癩及瘡癩柴胡知母各一錢半蒼朮黃芩乾葛陳皮半夏川芎各一錢甘

草灸七分右剉作一貼入薑三梅二水煎 清晨服午前一服久癩加入參常歸

爭功散 治熱癩多效知母貝母柴胡常山梔子檳榔地骨皮甘草各一錢蟬退二七箇右剉作一

貼入過路葛藤五寸煎服未效

龍虎湯 治熱癩火盛舌卷焦鼻如烟熏六脉洪緊石膏二錢半柴胡黃連各一錢半黃芩知母

粒右剉作一錢梔子八分半夏七分粳米百

柴陳湯 治痰癩各一錢胡半夏各二錢人參黃芩陳皮赤茯苓各一錢甘草五分古剉作一貼薑三棗

服二水煎

四獸飲 治七情聚痰五藏氣虛癩久不巳入參白朮白茯苓冬陳皮半夏草果甘草烏梅生薑大棗

各一錢右剉作一貼拌鹽少許淹食頃以皮紙包

數水浸濕慢火煨香熟取出水煎服未發前連進

效數貼即

冷附湯

五更疾無過是痰實而脾胃弱停于胃膈所以

子一箇炮去皮臍右切片五分二貼每入

露薑飲

治痰癰生薑四兩連皮搗爛止取自然汁約

初澄者一上飲之或有痰吐任之即安

平陳湯

治食癰蒼木半夏各二錢厚朴陳皮赤茯苓

煎服二水

清脾飲

治食癰柴胡半夏黃芩草果白朮赤茯苓厚

三棗二水煎服○此方乃小柴胡平胃二陳合而

為一也一方加常山二錢煎之露服五更截癰令

小清脾湯

治胃癰厚朴二錢烏梅肉半夏青皮良薑

煎服二水

芎歸鱉甲散

治勞癰鱉甲二錢芎歸當歸赤茯苓

右剉作一貼入薑

常山飲

治勞癰常山知母草果各一錢半良薑一錢

煎服二水

五癆元

治勞癰及瘴癘常山三兩半烏梅肉二兩

日乾為末蜜丸梧子大空

六和湯

治癰久不愈常山二錢知母貝母入參草果

薑三棗二酒水相半同煎

烏頭七棗湯

治勞癰及寒癰大川芎一箇以薑水浸

炮七次去皮臍右剉分二貼每貼入薑

七棗仁葱白三水煎稍

露薑養胃湯 治久瘧三日一發者先以生薑四兩

煎湯去滓觀一貼八棗二梅一宿次早將人參養胃

十將軍丸 治久瘧及瘧母縮砂檳榔常山草果各二

兩先持常山草果酒醋各一椀浸一宿後入八味

一補一發丹 治久瘧內傷挾外感問發內治痰外發

補一發丹 治久瘧內傷挾外感問發內治痰外發

辰砂元 治久瘧下損元氣辰砂角子大空心以人參湯

九化 治久瘧下損元氣辰砂角子大空心以人參湯

養胃丹 治久瘧二三日不愈者蒼朮常山酒蒸各二

果各一兩甘苦炙五錢烏梅四十九箇取肉右為

辟邪丹 治瘧疾另研黃丹一錢朱砂二錢右為末滴水

和勻分作三十粒每粒一錢取東兩挑七枚研汁

雄朱丹 治鬼瘧大黑豆四十九粒去皮曬乾入信砂

末一錢再研勻麩糊和勻作丸少壯人晒乾子收貯

雙解飲子 治瘧瘧及寒瘧神效肉豆蔻草豆蔻各二

灸一寸生用甘草大者二兩一分二貼入棗二梅一水

煎空溫服生熟飲類

地龍飲 治瘡癰大熱煩燥生地龍六者三條研細入
少許龍腦

兔活蒼木湯 治感冒嵐瘴成寒熱瘧活一錢半蒼
木柴胡黃芩枳實橘紅半夏川芎甘草

觀音元 治瘡癰半夏生烏梅肉母丁香巴豆肉各十
枚晒右為末薑汁糊和丸麻子大每五丸臨

老瘡丸 治瘡癰久不差腹痛有母與上一將軍丸同
法並同

驚甲丸 治瘡癰有瘡母久不差驚甲醋煮一兩三稜
蓬木香附子青皮桃二紅花神麩麥芽海粉

消癰元 治瘡癰年經汗吐下榮衛虧損邪氣伏藏
去癰須用芫花大戟破水之劑數○一名芫花丸

老瘡飲 治老瘡結成癰癰在腹脇諸藥不愈蒼朮草
果桔梗青皮陳皮良薑各七分白芷赤茯苓

七棗湯 治五藏氣虛陰陽相勝作高瘧瘧不問遠近
悉主之附子一箇炮裂以鹽水浸煎如

驚甲飲子 治老瘡腹中結癰瘕名曰瘧母驚甲二錢
白朮黃芩草果檳榔川芎陳皮厚朴白芍

七次去皮臍古剉作一貼入薑三七棗七水
一梳煎至半空心溫服仍契棗三五枚

名瘡瘡 四分夏枳殼桂心乾薑甘草各五分煎空心服

飲名瘡瘡 四分夏枳殼桂心乾薑甘草各五分煎空心服

飲名瘡瘡 四分夏枳殼桂心乾薑甘草各五分煎空心服

飲名瘡瘡 四分夏枳殼桂心乾薑甘草各五分煎空心服

飲名瘡瘡 四分夏枳殼桂心乾薑甘草各五分煎空心服

藥各一錢甘草五分右對作一
 貼入薑三棗二梅一分煎
參歸鱉甲飲 錢治老瘡腹脇有塊成瘡
 白朮厚朴川芎香附子各八分
 枳實各五分甘草三分右對作一
 點入薑三棗二子
 空梅心服煎

秘方清脾丸 治瘡三日一發或十日一發
 果蓬朮厚朴各五錢薑黃甘草各一兩
 為末飯丸梧子大白湯下六七丸
 右

經效瘡丹 錢治瘡母結癖寒熱無已真阿魏雄黃各二
 為末和勻挑和丸梧子每沸湯泡阿魏雄黃各二
 空末瘡勻挑和丸梧子每沸湯泡阿魏雄黃各二
 指直

黃甲丸 治瘡母成塊久不愈朱砂阿魏穿山甲酥灸
 頁椰各五錢雄黃木香各二錢半右為末泡

黑豆去皮搗成泥和九
 大空心薑湯下王十丸
瘡寒熱不歇有根 瘡之寒熱不歇者有根在也
 母惟敗血為暑熱之毒惟飲與水皆生寒熱為瘡之何
 法挾水飲者為暑熱之毒惟飲與水皆生寒熱為瘡之何
 攻瘡敗血因停蓄黃水或於脇間結癖寒熱自除矣
 九瘡皆因停蓄黃水或於脇間結癖寒熱自除矣
 寒熱若取山下蓋水在上則吐之寒熱自解所以瘡
 劑多瘡用常山蓋水在上則吐之寒熱自解所以瘡
 破其瘡也下

寒熱似瘡 帝曰火熱復惡寒發熱有瘡狀或一日發
 之時或多或少也陰氣多而陽氣少則復相薄盛衰之
 氣多而陰氣少則其發日近此勝復相薄盛衰之
 節瘡亦同法細感冒之熱皆似瘡證不必脈
 鼓感瘡區不能食未幾轉而發熱皆似瘡證不必脈
 弦但隨之內傷虛者補中益氣湯防觀加山渣麥芽
 和解之傷虛者補中益氣湯防觀加山渣麥芽

和弦鼓節氣之寒熱似瘡其破劑寒九攻法母大黑
 解但隨之內傷虛者補中益氣湯防觀加山渣麥芽
 之傷虛者補中益氣湯防觀加山渣麥芽
 傷虛者補中益氣湯防觀加山渣麥芽
 虛者補中益氣湯防觀加山渣麥芽
 者補中益氣湯防觀加山渣麥芽
 補中益氣湯防觀加山渣麥芽
 中益氣湯防觀加山渣麥芽
 益氣湯防觀加山渣麥芽
 氣湯防觀加山渣麥芽
 湯防觀加山渣麥芽
 防觀加山渣麥芽
 觀加山渣麥芽
 加山渣麥芽
 山渣麥芽
 渣麥芽
 麥芽

瘧疾治法

白豆蔻扶脾
 自止矣
 雖內經主於暑風局方主於傷食丹溪主於痰
 為要通甚用二陳湯至暑風局方主於傷食丹溪主於痰
 參術熱甚加苓連痰多無汗加葛根胡蘆加
 無汗者要帶散邪散邪散邪正氣有汗者要無汗扶
 正氣為主帶散邪散邪散邪正氣有汗者要無汗扶
 草果厚朴不能散邪散邪散邪正氣有汗者要無汗扶
 陽瘧無汗須用柴胡散邪散邪散邪正氣有汗者要無汗扶
 胡後升麻宜小芎芩胡須用白術烏梅以之汗須用柴
 熱但熱宜小芎芩胡須用白術烏梅以之汗須用柴
 熱○但熱宜小芎芩胡須用白術烏梅以之汗須用柴
 寒熱之劑度其收效矣寒多者先投以半時進以抵
 去其痰水則收效矣寒多者先投以半時進以抵
 進食之劑次以居則無復少之疾矣○疾愈後須
 令慎飲食謹起居則無復少之疾矣○疾愈後須
 治太陽合二陳湯治食積合平胃散尿澀合五苓散
 顯扶痰合二陳湯治食積合平胃散尿澀合五苓散

便閉合大柴胡湯無汗加乾葛蒼朮有汗加黃芪
 白木夜發加挑仁赤芍藥日久加常山攢椰吐之
 盡瘧之法

柴平湯

治諸瘧疾
 二梅一煎服一錢
 名平胡飲子一

草果平胃散

治諸瘧疾
 二錢厚朴陳皮青皮大腹皮攢椰草果
 各一錢甘草五分煎服

加減清脾湯

治諸瘧疾
 多入薑五棗二胡湯柳枝寒三寸水煎服
 入薑五棗二胡湯柳枝寒三寸水煎服

四將軍飲

治瘧疾
 二箇煨去核陳皮四箇全者甘附子一炮心服
 二箇煨去核陳皮四箇全者甘附子一炮心服

裁得

驅瘧湯

治諸瘧久瘧草果青皮陳皮人參赤茯苓各五分
右劉梅一作水煎入薑

驅邪湯

治諸瘧柴胡一錢陳皮七分甘草五分乾葛一錢
一貼水煎服空二木湯

人參竹瀝飲

治瘧疾者陰陽交爭寒熱乃收
分棗仁炒麥門冬入棗二梅一水煎調竹瀝薑汁服

治瘧須用分陰陽之藥

瘧疾者陰陽交爭寒熱乃收
生十全之功所以分陰陽解寒熱也

知瘧將差

少陽證知可解者寒熱日不移之時而作邪未
地之干早氣移之柴胡而移其時早移之於晏晏移

截瘧法

九瘧發之後便宜截而除之
輕用二日早截則邪氣閉塞而成瘧
可一用二日早截則邪氣閉塞而成瘧
為好須待熱退身涼方可飲食
須分利陰陽柴胡湯散成最效者
二飲勝金九之類截之愈乃氣大
烏木露薑養胃湯養胃丹之類
瘧謂之瘧母瘧起瘧七寶飲截瘧飲子
瘧者用藥截瘧起瘧七寶飲截瘧飲子

笑丹 勝金丹 歸養榮湯

截瘡常山飲 常山草果 一錢 右剉作一貼 酒半煎

溫服一宿 吐為順 早晨

截瘡七寶飲 常山 一錢 右剉作一貼 酒半煎 須

吐而愈 露一宿 早晨 實湯 必

截瘡飲子 治久瘡 不愈 一錢 丁香 半錢 烏梅 一箇 右

剉作一貼 好酒 一盞 浸一宿 臨發日

人參截瘡飲 虛人 截瘡 宜用 一切瘡 並可 截人參 白

母常山 酒浸 草果 薑甲 醋炙 各八分 桂枝 甘草 各

三分 右剉作一貼 入薑 三棗 二梅 一分 桃仁 七箇 水

鬼哭丹 治痲瘋 常山 一斤 剉 醋浸 春五夏三 秋七冬

三為末 九雞 隔夜 臨入 藥末 拌勻 作丸 梧子 大每

勝金丹 治諸瘡 久不愈 可截之 常山 四兩 再一子 大每

十五時 取三 椰九 兩為末 醋糊 和丸 菜豆 大兩 於酒 蒸晒 乾

不二飲 治諸瘡 疾一劑 截住 神效 雞心 擯椰 要一 雌

母各等 不分 右剉 一作 一宿 臨發 日五 更煎 至八 服勿 令婦 人過

勝金丹 治一切 瘡能 截去 常山 四兩 酒浸 一宿 晒乾

常山 餘酒 煮糊 和丸 梧子 六每 日雞 鳴時 服七 十日

九忌生 冷 酒送 下便 臥至 當發 日雞 鳴時 服七 十日

參歸養榮湯 治瘡疾截住後以此調養氣血人參白朮

禳法 宜用神一貼入棗二水煎服 瘡

神仙碧霞丹 治各處依方排定勿令狗犬婦人見之至其日

治時取五家粽尖和勻九如捺子大令患者綿裹

息勿食 飲食勿 禁食

斷瘡如聖丸 治今夜北斗下先獻過次早以綿裹一二丸於男

禁忌法 瘡發時切不飽食 遇發日食飽病愈加重瘡塊也

兩時○九瘡方來與正發不可服藥服藥在於未發
○未發以前兩時之先或遇發日凌晨空服藥於
○患瘡人切勿再發食豬寒遠酒色慎起居無不愈服

難治不治證 脊強急瘰癧者不可治 瘡病久復

單方 脫形而脈堅搏是為逆死不治 瘡

牛膝 治老瘡久不愈取肥牛膝一

茵陳 治瘡瘰癧並可食之 煮

葛根 煎瘡取一兩 煎

麻黃 湯治瘡無汗 煎

啄木鳥治三日瘡灸令香熟任食之

東醫寶鑑卷之七

唐瘡手大指內廉白肉際大
節中節中同少近下次指中節
指中廉白肉際是付上屈是陷
處一指上陽明經以經絡鐵
刺次左右同早朝日出時東
向受鐵母過三次凡瘡只鐵
手三穴

知母 主熱瘡煎湯
服之良靴

半夏 治痰瘡取一兩煎
湯和薑汁服之

松蘿 療溫瘡煎湯服
可為吐痰煎服

蛇蛻 耳主瘡當發日取皮塞兩
耳又手瘡持少許良靴

鱉甲 主溫瘡調下連三服無不
錢溫酒調下連三服無不

蜈蚣 主溫瘡服半錢為末
調溫酒服半錢為末

鼠婦 主溫瘡服小兒三枚研和
溫酒服小兒三枚研和

白葵花 主瘡末酒調服一陰錢
為末酒調服一陰錢

烏梅 主熱瘡煩渴
煮湯飲熱瘡煩渴

虎頭骨 又治溫瘡煎食之
又取皮覆身上二錢

狸糞 主鬼瘡燒灰和酒服
又頭骨亦主瘡用如虎骨法

狐肉 主寒熱瘡取五藏及腸
食法取五藏及腸治如

燕屎 人治瘡發日朝兩手捧
於發日朝兩手捧

夜明砂 取一錢冷茶調下立效
每

小蒜 治瘡取蒜研極爛和黃丹
每七丸取蒜研極爛和黃丹

鐵灸法 孫絡已傷陰從發也
絡已傷陰從發也

瘰癧 使為妙身之瘰癧赤如大豆
使為妙身之瘰癧赤如大豆

瘰癧

十一

瘟疫之因

不修重蒸而成者或地多死氣鬱發而不成者或官
吏枉抑怨讟而成者或地多死氣鬱發而不成者或官
社溫山溫海溫家溫大溫則歲行天溫地溫則一不
不究旺○疫氣之發大則歲行天溫地溫則一不
則正退位則所偏也○悉由氣運發者春應暖而復
遷寒夏應熱而反涼秋應涼而反熱冬應寒而反
反非其時而有其氣是以一歲之中病無不應而
溫多相時而此則行瘟似疫之俗謂之天行是也
活○多疫疾如鬼厲之氣厲之而有其氣厲之而
天○地不正之氣也又謂鬼厲之氣厲之而有其氣
率病者時氣也又謂鬼厲之氣厲之而有其氣厲之
厲爾若天地鬼厲之氣也又謂鬼厲之氣厲之而有
云謂雜其鬼厲之氣也又謂鬼厲之氣厲之而有其

瘟疫形證

冬合寒反暖春發溫疫其證發熱腰痠痛強急
脚縮不伸脘中欲折目中生花或瀉瀉增寒

脈法

復熱○春合暖反涼夏發燥疫其證發熱腰痠痛強急
能自禁或內熱口乾舌破咽塞其證發熱腰痠痛強急
寒起於咽喉項之側重直皮肉強痺或蘊而結
核○秋暴涼反陰或體熱發濕斑喘咳引氣壯
肺○氣暴嗽嘔逆或痰涎壅盛起居依舊甚至聲啞
壯熱項強睛疼或飲食如常起居依舊甚至聲啞
或赤眼口瘡大或小腮腫
喉痺咳嗽稠粘噴嚏
尺膚熱甚思乃得未可輕議
極時熱甚思乃得未可輕議
之極時熱甚思乃得未可輕議
隨氣變為直而疾○散
溫如故脈直而疾○散
飲而吐脈直而疾○散
滿而不來細而強○散
身不痛目赤而強○散
舉時大心厥逆汗自出脈堅強急病者生虛軟者死

東坡先生瘟疫論卷之二

瀰○温病攘攘○大熱脈細小者死○温病下利者
中瀰○温病者死○大熱脈細小者死○温病下利者
死及大熱者死○亦死○熱病脈靜汗已出脈盛一反不
得死汗脈絕者死○亦死○熱病脈靜汗已出脈盛一反不
治也死不一

瘟疫

治法温病謂之伏氣傷寒所發為温病夏至後發為熱
是也○天行時疫治有三法宜疾宜散宜降○一
者切不可作傷寒治○二經治少汗大柴胡湯當從乎中
法而用少陽陽明二經治之○小柴胡湯當從乎中
治而用少陽陽明二經治之○小柴胡湯當從乎中
麻葛根湯夏發燥疫宜調治之○秋發春發温疫宜
根解肌湯夏發燥疫宜調治之○秋發春發温疫宜
防敗毒散半表裏證用柴胡湯裏證用大柴胡湯
湯未端宜先補以散毒治之○看歸九在何經隨病
證未端宜先補以散毒治之○看歸九在何經隨病
取效如神○方現寒○治疫之看歸九在何經隨病
取效如神○方現寒○治疫之看歸九在何經隨病

瘟別有條在下○瘟疫宜用聖散子十神湯芽胡
升麻湯解肌湯香蘇散芍蘇散芍蘇散芍蘇散芍蘇散
蘇乙散五瘟丹茵陳九人中黃九如意丹黑奴丸
諸太

葛根解肌湯

治春疫發熱而渴葛根三錢麻黃黃芩
各二錢芍藥一錢甘草八分

調中湯

治夏發燥疫口乾咽塞大黃一錢半黃芩芍
藥各一錢

荆防敗毒散

治瘟疫及大頭瘟羌活獨活柴胡前胡
各一錢

聖散子

治温濕温等證草豆蔻煨猪苓石菖蒲赤茯苓
各一錢

監生

芩良薑獨活赤芍藥附子麻黃厚朴藁本枳殼柴
 胡澤瀉細辛防風白朮藿香半夏吳茱萸蒼朮
 平朝各五分之一釜右對作一貼各飲一盃則時氣不入
十神湯 治時令不正瘟疫疾妄行葛根二錢赤芍藥升
 方各一錢右對作一貼入薑五蘇散加麻黃發汗之
 劑也

柴胡升麻湯 治時行瘟疫頭痛壯熱柴胡前胡葛根
 各七分升麻五分芍藥五分方煎服一貼

清熱解肌湯 治天行瘟疫頭痛壯熱葛根三錢黃芩
 一貼水煎服湯明

香蘇散 治四時瘟疫香附子三錢紫蘇葉二錢半陳
 皮一錢水煎服湯明

薑三葱白二水煎服
 與一富人令其施城中大有白髮老人授此皆愈
 此疫問富人富人以實告退

十味芍蘇散 治溫熱瘟疫病川芎一錢半半錢
 陳皮枳殼甘草各七分桔梗五分水煎服湯明

清熱解毒散 治瘟疫之月民病天行瘟疫熱病宜清熱
 甘草七分黃連酒炒生地黃酒洗各五分右對作

加味敗毒散 治瘟疫及發斑羌活獨活前胡柴胡
 木白朮赤芍藥歸生地黃各六分薄荷甘草

神授太乙散 治瘟疫流行不問陰陽兩感頭痛寒熱
 赤芍藥羌活香細辛青皮川芎白芷

各桔梗枳殼柴胡陳皮香附子蒼朮防風蒿本貼入
薑七棗七服七蔥
五瘟丹 戊治流年為瘟君○及傷寒熱病熱瘡○黃連為火

五瘟丹 戊治流年為瘟君○及傷寒熱病熱瘡○黃連為火
香附屬金乙庚年為君○甘草屬土甲巳年為君○
倍煎入右皆生用冬至日製為末用錦紋大黃三兩
濃煎湯去渣熬成膏和丸彈子大朱砂雄黃末為
丸再貼水磨服每

茵陳丸 治時行瘟疫及瘴瘧黃疸溫熱病即黃
人中黃丸 治四時疫癘大黃連黃芩人參桔梗蒼
末神麴糊和湯九多二陳湯作湯送下氣虛四君子湯
血虛四物湯痰多二陳湯作湯送下氣虛四君子湯
用糞缸岸代之或以
砂雄黃為衣亦好

如意丹 專治瘟疫及一切鬼祟伏尸勞瘵癩狂失志
鐵金石藥毒不伏水等認川烏炮八錢槓榔人
肉桂當歸桔梗白胡椒石菖蒲各五錢黃連紫菀厚朴
半右澤吉日於不聞雞犬處淨室修合為末煉蜜

黑奴丸 治瘟疫熱病脈洪數大熱狂走渴甚棄
水丸下○此方乃溫白元加檳榔當歸也
謂之疫癘大抵足陽明邪熱多在少陽或在他氣所着
為濕熱為腫木盛為痛多於耳前後○陽明相火

大頭瘟證 以成此疾至感天地四時非節瘟疫之氣所着
謂之疫癘大抵足陽明邪熱多在少陽或在他氣所着
為濕熱為腫木盛為痛多於耳前後○陽明相火

也者頭腫大腫少陽為邪出於耳前後○陽明相火
病者頭腫大腫少陽為邪出於耳前後○陽明相火
明者頭腫大腫少陽為邪出於耳前後○陽明相火
也者頭腫大腫少陽為邪出於耳前後○陽明相火
大頭瘟證 以成此疾至感天地四時非節瘟疫之氣所着
謂之疫癘大抵足陽明邪熱多在少陽或在他氣所着
為濕熱為腫木盛為痛多於耳前後○陽明相火

東晉書 監在病第

喉者寒害人最速冬溫後多有此病。喉之發時初發狀如傷寒五七日之間乃能殺。喉者寒害人最速冬溫後多有此病。喉之發時初發狀如傷寒五七日之間乃能殺。喉者寒害人最速冬溫後多有此病。喉之發時初發狀如傷寒五七日之間乃能殺。

大頭疽治法

多者荆防敗毒散裏證多者防風通聖散。惡實氣上俱用酒炒微下之。使藥氣上行。○治法當先緩而後急。於無形之處至高之分當用緩徐服之。則酒形之處至高之分當用緩徐服之。高所此為客邪當去之。○大頭疽病此熱氣在。大頭疽俗謂之疔。○治法當先緩而後急。嚏之作效若搖藥不時嚏者不可治也。如嚏出膿血者。治之必愈。每日用嚏藥三五次。以泄毒氣。此是良法。左右看病人日。用嚏藥三五次。以泄毒氣。此是良法。

普濟消毒飲子

甘草各二錢。鼠粘子五分。馬勃三分。板藍根。桔梗。玄參。柴胡。和時。下或加。防風。薄荷。川芎。當歸。取一兩。水煎。分二三服。或加。防風。薄荷。川芎。當歸。取一兩。水煎。不。能。開。上。喘。咽。喉。不。利。舌。乾。口。燥。俗。云。天。行。染。之。氣。也。此。邪。熱。客。於。心。肺。之。間。上。攻。頭。面。而。為。腫。盛。也。此。邪。熱。客。於。心。肺。之。間。上。攻。頭。面。而。為。腫。盛。也。此。邪。熱。客。於。心。肺。之。間。上。攻。頭。面。而。為。腫。盛。也。

謂之仙方謂天仙所製也

既濟解毒湯治天行大頭瘟頭面赤腫而痛大黃酒

升麻柴胡連翹當歸身各五分

茶連消毒飲治大行大頭病風腫痛黃連黃芩柴

射干白芷甘草各七分右剉作一貼入竹歷薑汁調服

牛蒡茶連湯治大頭瘟兼治啞瘡黃芩酒蒸石膏各一錢

連翹實玄參甘草各一錢荊芥防風羌活各五分右剉作一貼薑三錢煎徐服之

漏蘆散治時毒疔瘡瘰癧二兩漏蘆升麻六黃芩各一

兩右為麤末每三錢水煎徐服

二黃湯治大頭瘟初起黃芩黃連並酒炒甘草生各

錢水煎徐服

炒煎成湯入芒硝等

消毒丸治時毒疔瘡瘰癧大黃牡蠣白礬炒各

兩右為末密丸彈子大每服一丸新井水化

殭黃丸治大頭病及喉痺歌曰人間治疫有仙方一

便清涼粉丸乃白殭黃汁和九彈子大每服一丸也

二聖救苦丸治大頭病甚效萬曆丙戌余寓大梁屬疫

湯送下汗出為效萬曆丙戌余寓大梁屬疫

項赤腫咽喉腫痛昏憤名曰大頭瘟發熱頭面頸

名二聖救苦丸用牙皂以開關竅而發其表用大

方也瀉壯者百發百中虛弱者先服一汗即愈真仙

若未愈用牛蒡發百中虛弱者先服一汗即愈真仙

茶連湯亦效

更醫醫醫醫醫

加味殭黃丸 治大頭瘟及蝦蟇等痘 黃酒蒸

錢半石為末 薑汁糊下 立愈 翻 兩 作 十 九 大 人 一

清涼救苦散 治白頭瘟 鼻目腫痛 芙蓉葉 白芷

雄黃赤小豆 芒硝 各等分 上 為末 黃連黃柏 白芷

通氣散 治天行大頭瘟 頭面赤腫 或咽喉閉塞 用此

此取嚏亦不傳 染玄胡索 一毒氣 則差 看病 之 人 用

錢藜蘆五分 躑躅花二分 半 右 為末 用紙攤藥

禳法 劉根別傳云 瘟疫熾發 可於州治 六合處 穿地 深

謂其尺潤亦如 瘟之取淨沙 三斛 實之 以醇酒 三升

辟瘟疫預防法 凡煎一病初起 氣之所除 疫癘之穢 藥也 所

○常以雞鳴時淨心存誦 四海神名 阿明南海 辟名

祝融西海神名 巨乘北海神名 時飲之 辟鬼合

疫宜用屠蘇飲 老君神 明散 務成之 亦妙 九 辟 瘟

公辟瘟丹 李子建 殺鬼赤散 聖辟瘟丹 神聖 辟

屠蘇飲 桔梗 川椒 桂心 各一兩 半 虎杖 根 一兩 錢大黃

川烏六錢 右剉 盛 絳 囊 十 二 月 晦 日 中 煎 數 沸 東 向 飲

老君神明散 取 沉 井 中 取 水 飲 之 其 滓

盛帶之一里 枯梗 細辛 各一兩 右 為末 絳 箔 袋

取汗得吐 卽差 若經三四日 取三錢 匕水 一 碗 煮

東醫寶鑑卷之二

務成子螢火丸

二兩螢火鬼箭羽入鐵處各二錢燒各一兩黃雌黃各
子黃并雄雞冠血一具和之如杏仁大縫三角以雞
軍劉子南受得此方後於北界與虜戰敗被圍矢
下如兩未至子南馬數尺矢皆墮地虜以爲神人
解圍而去故一
名冠軍丸針

太倉公辟瘟丹

辟却瘟疫并散邪氣蒼朮八兩烏藥
黃連白朮羌活各四兩烏草烏細
辛紫草附風獨活藁本白芷香附子當歸荆芥天
麻桂皮甘松三乃子白芍藥乾薑麻黃皂角甘草
各二兩麝香三錢半右爲末蒸棗取
肉和丸彈子大每取一九燒之
李子建殺鬼元虎頭一兩半雄黃魁題麝藜蘆三兩
美各五錢右爲末蜜九皂子大
熱病時氣燒一九安床頭懸

宣聖辟瘟丹

臘月二十四日平朝取井華水盛淨器
中量人口多少浸乳香至歲朝五更湯
令溫從少至大每人以乳香一小塊飲
水一匙二呷燕下則一年不患時疫

神聖辟瘟丹

歌曰神聖辟瘟丹留傳在世間正元焚
一注
活白芷香附子大黃甘草三乃赤箭雄黃各一
兩右爲末麪糊和丸彈子大黃丹爲末曬乾正朝
早晨焚

七物虎頭元

辟瘟殺鬼除一切疫氣虎頭骨朱砂雄
黃各一兩半鬼白皂莢蕪荑雌黃各一
兩右爲末燔蠟和丸彈子大以紅綸棗
男左女右臂上又懸屋四角如值近境疫作每望
夜半各家當戶燒一丸晨起各
吞下小豆大一丸則不致傳染

七物赤散

辟瘟殺毒氣丹砂另研川烏炮各一兩
各五錢方爲末每服半錢溫酒調
服汗出解若不增至一錢服額

東醫書卷之五

二五

太乙流金散 大辟瘟疫 雄黃一兩 半 羊角一兩 三

不傳染法 凡瘟家自生惡氣 聞之即上 泥丸散入百脈

也方寒紙於容滿并入煎以及蘸紙紙不傳染法 上角絳囊盛一兩 帶心前并掛

雄黃丸 治瘟疫 各令不相染 雄黃一兩 赤小豆炒丹參

瘴疫 嶺南春秋時 月入感山嵐瘴毒 氣發為瘴 瘴寒

加味柴胡湯 柴胡二錢 黃芩半夏 人參枳殼 大黃甘

三仙湯 治山嵐瘴氣 時行瘟疫 蒼朮四錢 乾地黃二

酒和九梧子大空

太無神木散 治四時瘟疫 專主山嵐瘴氣 之妙劑也

香甘草各一錢 右剉作一貼 入薑三錢 石菖蒲煎服

瘟疫熱病不治證 大熱病不可刺者有九 〇一曰汗不出

甚者死 〇三日目不明 熱不已者死 〇四曰腹滿

〇六曰舌本爛 熱不已者死 〇七日不出 嘔下血者死

〇八曰膿熱者死 〇九曰熱而 〇九曰熱而

單方九種

朱砂朝早 瘟疫取一兩 細研以白蜜和丸 如麻子大 正

無疫 九種

蚯蚓汁 主天行熱疾 取生地龍

藍葉汁 主天行熱疾 取葉

臘雪水 主天行熱疾 取雪

生葛根汁 主天行熱疾 取根

苦參 主天行熱疾 取參

水中細苔 主天行熱疾 取苔

青黛 主天行熱疾 取黛

蛇莓 主天行熱疾 取莓

竹瀝 主天行熱疾 取瀝

東醫寶鑑卷之九

蒼朮 辟瘟疫邪濕氣蒼朮

生藕汁 治熱病煩渴藕汁

臘月鼠 燒之辟惡氣又於正旦所

蟾蜍 食之不患熱病生搗絞汁服或燒

桃葉 主天行病汗不出挑葉多取濃煎湯置床下坐

葱白 治天行時疾頭痛熱狂

赤小豆 辟瘟病取赤小豆新布囊盛之正旦置井

温蕪菁汁 辟瘟氣立春後初庚子日取温蕪菁

蒜 正月之節食五辛以辟厲氣一日蒜

人屎 主天行病大熱狂走取乾者沸漬飲之或燒

人中黃 大治疫毒取大竹筒兩頭留節一節中作一

赤馬蹄 辟瘟疫作屑二兩碎

牡猪糞 極療天行熱病毒大熱

雄狐屎 燒之去瘟亦可

獺肉 主疫氣瘟病煮肉

取汁停冷飲之

温蕪菁汁 辟瘟氣立春後初庚子日取温蕪菁

葱白 治天行時疾頭痛熱狂

赤小豆 辟瘟病取赤小豆新布囊盛之正旦置井

蒜 正月之節食五辛以辟厲氣一日蒜

人屎 主天行病大熱狂走取乾者沸漬飲之或燒

人中黃 大治疫毒取大竹筒兩頭留節一節中作一

赤馬蹄 辟瘟疫作屑二兩碎

牡猪糞 極療天行熱病毒大熱

雄狐屎 燒之去瘟亦可

獺肉 主疫氣瘟病煮肉

取汁停冷飲之

取汁停冷飲之

脉法

神或崇陽沉之綿乍伏脉石者復不而門累邪二症
 志錯害者沉脉綿大或來引割癖症沉也號漸氣日尸
 昏雜心風濇此不可小綿延納清劑於默經為至流尸食
 亂不脉邪濇亡人知乍不或和辱傍而日尸頓注身水
 心倫虛也四為但短知如蓋驅人不能有也逢針手人四症
 效得散一肢重禍有乍度數而乃邪設飛神所月之症者
 乍○川來調者也陰脉為禍顏邪脉色脉也植煉
 咏乍七洪一土脉赤細脉也綿兩變若脉來弱此脉邪來弱
 數乍盛來也洪細脉色脉也綿兩變若脉來弱此脉邪來弱
 乍小或遠者脉大綿兩變若脉來弱此脉邪來弱
 大乍長沉邪如飄風崇也從陰脉趨來
 乍小或短此大針小○欲知
 或促此大針小○欲知
 或結邪脉定知

邪崇

得邪脉也初便○瘧言或發狂六治細數難治癩○有人
 下寸口之便○瘧言或發狂六治細數難治癩○有人
 之也口之便○瘧言或發狂六治細數難治癩○有人
 澤四不頂服藥但宜符咒治之謂○鬼脉乃邪崇為
 也脉來乍大乍小乍短乍長者鬼崇也
 邪崇尸症治藥紫邪崇宜用桃奴元還魂湯殺鬼親○五邪丸
 宜用十神丸八毒赤
 散太乙神精丹婦赤
 桃奴元治常邪崇尸症客忤驚夢不祥言語錯亂恍惚
 香去瘴一兩右三箇雄黃各三錢石龍腦煎成膏辰砂
 犀角各五錢琥珀雄黃各三錢石龍腦煎成膏辰砂
 二錢桃仁十錢琥珀雄黃各三錢石龍腦煎成膏辰砂
 芩實大陰乾密器封固靜室安置入參湯研下丸

辟邪丹

治衝惡邪崇怪疾及山谷間九尾狐精為患
 人參赤茯苓神遠志鬼箭羽石菖蒲白朮蒼朮

東醫圖書集成卷之七

二十九

當歸各一兩桃奴五錢雄黃朱砂各三錢牛黃麝香各一錢右為末酒糊和丸龍眼不取近體

殺鬼五邪丸治邪祟另研龍骨白芥赤小豆各一兩

未桃仁五箇另研荒青三十箇沙去翅足右為

紫金錠治感鬼邪子為胎溫酒化下中作瘡服此藥

燒三錠惡物其邪仍至又服半錠更

蕪合香元氣治疔疔鬼氣一切邪祟及鬼魅狐狸等病

清酒中邪神不取二七氣自絕瓶

十疰九麥治十種細尸辛桔梗氣附子炮皂莢霜川椒甘草各

五錢右為末蜜六指

八毒赤散砂治入漆着神鬼謂之鬼疰巴豆霜各一兩

下灸九一條石為末蜜八毒赤丸方也

太乙神精丹治客忤霍亂一切惡毒無所不治丹砂曾

青雌黃雄黃磁石各四兩金牙二兩半右以紙密

封砂中暴土釜中然後一名研如細粉以好酒浸以紙密

濕得所納放火其化疑着釜上五色者

狀出以漸藥飛化疑着釜上五色者

次一色者下難羽掃皎潔和丸最佳飛不盡更

着火如前以難羽掃皎潔和丸最佳飛不盡更

腹今加一丸漸加此者五服內必吐利過則自定石金

初服如黍粒漸加者五服內必吐利過則自定石金

大服若服藥罔亂煮木防已湯飲之即定若欲

東醫寶鑑卷之七

三十一

解殺藥契爛煮肥猪肉○又瘡變腫垂死者服一
 丸即吐差瘡母亦差○微煖者幹散開口以漿飲
 送下○諸卒以絳囊盛九刀圭散繫男左女右臂
 刀圭服之○時許者以甘土塗其內令極乾○兩箇瓦盆
 可受辟瘡疫時氣最妙○土塗其內令極乾○兩箇瓦盆
 泥法亦石脂以醃醋和甘土黃礬土鹽等四種火
 各一兩方以醃醋和甘土黃礬土鹽等四種火
 暇用針時取此藥以四時旺相日天晴明齋戒
 沐浴合之○凡合此藥以四時旺相日天晴明齋戒
 婦夢中鬼覺後心痛不可忍昏悶不省取三粒
 服之即痛止神醒已無病矣
 後施於人無不應驗如神
 驗尸法凡令尸病欲驗其真若紙覆痛處燒病者頭
 髮氣引之也非類
 則邪氣引之也非類
 穰法殺鬼元可宜藥以禳之回春辟邪丹李子建

心膏帶之邪鬼不敢近○化以虎爪感邪交通
 取雄黃末一兩松脂二兩於其上以破
 蓋之只留頭耳不過三九其邪自盡
 回春辟邪丹虎頭骨二兩朱砂兩雄鬼白燕美尾箭
 大囊盛一丸繫男左女右臂上與鬼交通者無辟
 之瘡疫
 李子建殺鬼元每取一鬼魁魁頭及邪祟尸瘡鬼
 導引法乃止二日邪氣悉去百日伏尸皆去百遍
 單方九種三十
 朱砂殺精魅邪惡鬼氣作末和溫水
 服一錢又常帶之辟邪氣

雄黃殺精妙又佩之鬼邪氣治尸疰辟末和温水服一錢頭

尤佳

古鑑燒赤一切邪魅中人鬼交

半天河水飲之勿令狂取與

代赭殺精物辟鬼魅水服常帶

敗天公為末鬼疰精之燒灰

忍冬草取汁五日二疰三服煎

青蒿子治鬼氣尸疰一錢取搗

艾實梧子百惡鬼下三十九其邪鬼即去末蜜丸

鐵棍柄和桃鬼奴及箭為末作丸服之

安息香取燒之邪氣又和酒服一錢鬼胎

衛矛燒之百邪鬼煎湯服之

無患子取中邪惡氣取燒之

蚕退紙取紙發燒為末酒服二錢

穿山甲末每五邪驚啼悲泣洗灰為

桃烏取殺百鬼精物百毒不祥

烏鴉和治鬼魅燒為灰

桃仁汁十頓服之當吐不吐再服○又桃仁作粥常食

之妙

鷹肉又帶及瓜燒為末酒服尤妙

及野狐魅取肉炙食之

三三

鵲巢主溫酒服之仍呼崇物名號末

鸛骨主為末和溫酒服之骨及管

麝香帶身上氣殺又取精物除百邪魅常

殺羊角又燒惡作末和酒服下胎乾之

鹿角一錢和酒服即出鬼精乾

牛屎戶邪惡氣取塗門

豹肉取鼻煮服主神煮食良

虎肉頭辟骨虎爪並種精魅煮之良或置左右鞋

狸肉頭諸尸為末邪氣取肉作羹臍食之好鞋

狐肉主見人鬼或於靜處獨語或視形見人或以手無

度或取腸口又坐禮度過常尿屎亂放取肉炙

為末酒調服之最效又狐頭

獺肝陰乾為末水服一錢日再亦治鬼魅一具

異猪黃研和鬼水服之乾取

鐵灸法鬼信所病水服有十穴

枕分名鬼市一鬼名封藏九名鬼名

指十三一名鬼封藏九名鬼名

振甲前及甲後肉兩手大指相並

火即無效灸七鬼哭穴

祖灸鬼法也即鬼哭穴

左切女右各二壯乳交兩大三指頭七壯
左切女右各二壯乳交兩大三指頭七壯
壯當狐鳴即差也
合縛灸合間三指
語上足大在肉上各七甲下即止
爪灸鼻去入徐中及兩手解其縛
名乞徐對屈肱兩處各七壯
左切女右各二壯乳交兩大三指頭七壯
壯當狐鳴即差也

癰疽

癰疽發病之原

何不以別之岐伯曰榮從之而通經
何不以別之岐伯曰榮從之而通經
何不以別之岐伯曰榮從之而通經
何不以別之岐伯曰榮從之而通經

癰疽欲發之候

煩悶或病渴
煩悶或病渴
煩悶或病渴
煩悶或病渴

熱氣肉皆無下餘故命筋髓內六府五藏不和血竭
熱氣肉皆無下餘故命筋髓內六府五藏不和血竭
熱氣肉皆無下餘故命筋髓內六府五藏不和血竭
熱氣肉皆無下餘故命筋髓內六府五藏不和血竭

東醫圖書集成卷第...

...

辨經之如矢中而專攻乎外故初發時自表緣正氣內
 處經之如矢中而專攻乎外故初發時自表緣正氣內
 固終不肯焦枯或便終不傷也○發逆以下邪深其氣內
 壅或過內腫痛甚而聲嘶氣脫○眼外黑故身小或指腫黑
 如墨邊多死也○○凡癰疽之證以有熱易治無熱難治
 以右邊為重○○癰疽之證以有熱易治無熱難治
 妙訣蓋陽證有熱則氣血行而熱易治無熱難治
 氣血滯而陽證有熱則氣血行而熱易治無熱難治
 初發時破後發時無熱處亦發雖大如盆而高必生
 大不腫身高不熱處亦發雖大如盆而高必生
 為內腫高而死蓋未發於血脈腫府下而堅者發於筋
 癰疽內腫高而死蓋未發於血脈腫府下而堅者發於筋
 發於肉色不變者

定癰疽死之部分

死不可患○腦鬚七處後虛○頤接骨處陰○根
 上毛問○臍與尻骨接處虛○耳門前後車骨接處陰○根
 諸因小腹風水所成癰疽○耳門前後車骨接處陰○根
 發鬚骨中並能害人惟眼五項至險○眼不見發處
 皆惡子如乳數者為頭面處為項至險○眼不見發處
 節女子如乳數者為頭面處為項至險○眼不見發處
 癰疽之數者為頭面處為項至險○眼不見發處
 物字於癰疽之數者為頭面處為項至險○眼不見發處
 或醇酒厚味或毒相搏處致生水○火
 癰疽當分內外而癰疽者發於內者當審藏府如中府巨關
 屬心期門屬肝章門屬脾京門屬腎中府巨關
 心此辨之癰疽者發於內者當審藏府如中府巨關
 心此辨之癰疽者發於內者當審藏府如中府巨關

東醫圖書集成醫部全錄卷之二

三十一

曰發腦發背發髮發喉發眉發頤發頸發馬發頤發囊發乳發脈發足
當發肝發脾發肺發心發腎發少陰發太陰發陽明發太陽發少陽發足
當分經絡厥陰經手足太陽經手足少陽經手足陽明經手足太陽經手足少陽經手足陽明經手足太陽經

癰疽當分經絡

以成其何者陰陽臍表陽經鬢督胃
熱數若脈不痛處癰疽所發脈數發熱而疼者陽不發

數不熱不瘰陰瘡發癰之脈發洪相搏沉細而直
肺不熱不瘰陰瘡發癰之脈發洪相搏沉細而直
疽此二毒發無定處當以脈別之有膿腫作也
沉緩瀦為陰毒無熱脈數此為實滑則主榮則主衛
滑而數積聚為熱滑則為實滑則主榮則主衛
榮之相干則結為熱而脈滑者大熱見洪滑者治之九瘦膿
多或如清泔大者散而脈熱見洪滑者治之九瘦膿
也或如清泔大者散而脈熱見洪滑者治之九瘦膿
矣或如清泔大者散而脈熱見洪滑者治之九瘦膿
洪或如清泔大者散而脈熱見洪滑者治之九瘦膿
平或如清泔大者散而脈熱見洪滑者治之九瘦膿
不收鮮有濟也

癰疽難治不治證其九屬初發腫硬而易治高者毒氣初發如栗
破此乃豆許與肉俱平或作赤色時覺痒痛而難治
治百始發便熱腫大痛低隔而壞此為內發百

難治也。心死屬五藏。難治也。為陽屬六府。易治。紅者
 似胎。染病。如深。牛領。皮。又。如石。搗。痛。用藥。不軟。者
 深。病。處。如。牛。領。皮。又。如。石。搗。痛。用藥。不軟。者
 內。病。常。出。血。青。白。無。時。喜。笑。乃。神。氣。奪。病。深。
 有。後。出。鮮。血。易。治。虛。寒。有。邪。熱。者。難。治。癰。疽。貼。膏。藥。
癰疽辨膿有無及淺深
 膿。辨。之。軟。而。即。復。者。膿。按。之。強。而。不。復。者。其。膿。淺。
 按。之。堅。硬。未。復。者。有。膿。也。按。之。軟。硬。半。硬。半。軟。謂。四。方。已。有。膿。也。
 宜。急。破。之。堅。硬。未。復。者。有。膿。也。按。之。軟。硬。半。硬。半。軟。謂。四。方。已。有。膿。也。
 之。深。也。手。按。之。熱。痛。則。有。膿。之。淺。也。按。之。無。膿。者。甚。痛。者。未。成。
 膿。也。按。之。即。復。者。有。膿。之。淺。也。按。之。無。膿。者。甚。痛。者。未。成。
 也。必。是。水。也。即。復。者。有。膿。之。淺。也。按。之。無。膿。者。甚。痛。者。未。成。
 成。若。其。上。薄。皮。剝。起。者。膿。淺。也。其。腫。大。熱。者。膿。成。自。軟。也。非。

面。色。萎。黃。被。熱。上。蒸。已。成。膿。也。火。熱。而。反。腐。出。
 衛。水。行。必。將。為。膿。上。蒸。已。成。膿。也。火。熱。而。反。腐。出。
 而。腐。爛。水。化。也。果。熱。極。腐。爛。不。潰。則。為。膿。也。水。也。清。
 稠。者。不。可。用。軟。木。蓋。白。木。能。收。膿。也。故。也。加。
 白。芷。者。不。可。用。軟。木。蓋。白。木。能。收。膿。也。故。也。加。
癰疽發暈
 則。死。非。美。證。矣。一。暈。口。之。傍。三。暈。尚。可。措。手。若。四
 則。死。非。美。證。矣。一。暈。口。之。傍。三。暈。尚。可。措。手。若。四
 則。死。非。美。證。矣。一。暈。口。之。傍。三。暈。尚。可。措。手。若。四

黑。不。急。治。十。歲。死。後。出。膿。如。發。於。死。名。曰。癰。疽。不。化。為。膿。大。而。不。瀉。
 如。大。豆。刺。煩。心。者。死。不。可。治。下。入。腹。不。治。七。日。井。疽。狀。
 如。大。豆。刺。煩。心。者。死。不。可。治。下。入。腹。不。治。七。日。井。疽。狀。
 如。大。豆。刺。煩。心。者。死。不。可。治。下。入。腹。不。治。七。日。井。疽。狀。
癰疽死證
 銳。毒。斷。難。醫。受。
 銳。毒。斷。難。醫。受。
 銳。毒。斷。難。醫。受。

狀赤四堅大急治之不治三十日死
名曰四瀋其狀大而不治急治十日死
傍者黑不消其狀不治百發急治十日死
黑者黑不消其狀不治百發急治十日死
脫疽其狀赤黑者死諸不治百發急治十日死
不謂諸節也發於陰謂諸節之死發於陰者三內發透
也

癰疽善惡證

也也腫沉味而鮮也
也也○膿血惡也○腹○痛○渴○甚○逆○也○是○五○一○三○也
也○喘○麓○短○氣○恍○惚○嗜○川○八○惡○也○臭○氣○未○潰○先○黑○陷

自○癰○疽○寧○飲○食○知○味○一○善○也○五○惡○證○有○九○動○息

下六面青唇黑便汚者
更逆也二聲嘶也腹瀉是甚逆也
四逆也二聲嘶也腹瀉是甚逆也
耳聾有氣愔驚悸言頭冷自汗無時證睛眩
治癰疽大法初去腐內散惡肉消已潰則生肌
者下○火○癰○以○灸○初○發○以○敷○之○膿○未○成○者○必○消○散○之○膿○已○成○者○必○透○

治癰疽大法

外○以○絕○其○源○若○邪○氣○至○甚○過○絕○經○絡○恐○邪○氣○入○內○治○其
○外○以○絕○其○源○若○邪○氣○至○甚○過○絕○經○絡○恐○邪○氣○入○內○治○其
○外○以○絕○其○源○若○邪○氣○至○甚○過○絕○經○絡○恐○邪○氣○入○內○治○其
○外○以○絕○其○源○若○邪○氣○至○甚○過○絕○經○絡○恐○邪○氣○入○內○治○其
○外○以○絕○其○源○若○邪○氣○至○甚○過○絕○經○絡○恐○邪○氣○入○內○治○其
○外○以○絕○其○源○若○邪○氣○至○甚○過○絕○經○絡○恐○邪○氣○入○內○治○其
○外○以○絕○其○源○若○邪○氣○至○甚○過○絕○經○絡○恐○邪○氣○入○內○治○其
○外○以○絕○其○源○若○邪○氣○至○甚○過○絕○經○絡○恐○邪○氣○入○內○治○其
○外○以○絕○其○源○若○邪○氣○至○甚○過○絕○經○絡○恐○邪○氣○入○內○治○其
○外○以○絕○其○源○若○邪○氣○至○甚○過○絕○經○絡○恐○邪○氣○入○內○治○其
○外○以○絕○其○源○若○邪○氣○至○甚○過○絕○經○絡○恐○邪○氣○入○內○治○其
○外○以○絕○其○源○若○邪○氣○至○甚○過○絕○經○絡○恐○邪○氣○入○內○治○其

八皮自實監注病第...

者敗可服五利五大黃湯化毒丹取通利一宜二行若
 成敗可服五利五大黃湯化毒丹取通利一宜二行若
 黃連消毒散內托香湯托裏散
 連湯消毒散內托香湯托裏散
 溫無則行宜防風通聖散和暢服五香連翹湯若發內表攻裏
 血○滯大遇凡有熱者切不可退熱但用溫藥以行微涼少
 描濟之

內疎黃連湯

治痲瘋疔毒腫毒惡腫大黃二錢漏蘆
 木芍藥各一錢半黃連黃芩五分石到作一槓水煎服
 為以通利

千金漏蘆湯

治痲瘋疔毒腫毒惡腫大黃二錢漏蘆
 貼白芨甘草各八分利為度細

內托復煎散

治陰疽蘊結於內恐侵蔽府內托
 木八兩防風桂皮當歸防已甘草各五錢右到藥先
 將蒼朮水四五次升煎至三升去木諸藥再煎
 四盞作三四次飲之又煎蒼朮再煎
 諸藥之傳

淵然真人奪命丹

專治一切發背陰疽疔瘡惡瘡無
 服之便痛已成者服之立愈此乃惡證藥中至寶
 也雄黃三錢蟾酥一錢乳香沒藥銅絲各二錢血
 錫膽礬寒水石各一錢輕粉麝香龍腦各半錢
 研朱砂和九錢菜豆大若丸不就以酒煮麪糊和為
 丸朱砂和九錢菜豆大若丸不就以酒煮麪糊和為
 病入膏肓吐在錢為衣男左女右將藥丸在內以
 熱酒三四盞送下服蓋覆約入行五里久再以
 汗酒數盞助藥力發熱汗大出為度如無

東醫寶鑑卷之五十一

四十一

五香連翹湯

治癰疽瘡癤射干獨活結核一切毒腫大黃

五利大黃湯

治年壯患癰疽氣血盛多二便秘澀

化毒丹

治百種惡瘡毒腫初覺宜服草烏醋浸炮浮

托裏散

治癰疽潰後久不收斂以此補托人參黃芪

黃連消毒散

治癰疽發腦發背腫毒痲瘋發各一錢二

蘇木陳皮澤瀉黃芪各四分右到作一貼水煎服
後腦項麻木勢外散熱毒痲瘋發此藥服之而愈
垣治之灸艾石壯始覺痛次藥此藥服之而愈
消一名黃連

內托羗活湯

治足大陽經分尻臀發癰疽堅硬腫痛

仙方活命飲

治一切癰疽腫毒未成者內消已成者
香貝母天花三錢當歸尾赤芍藥甘草陳皮各一錢半乳
七分沒藥五分穿山甲三片燒上研右到作一貼
用酒二盃在腹側白芷為君在酸物鐵器如為君
飲酒三盃在腹側白芷為君在酸物鐵器如為君
角刺為君在腹側白芷為君在酸物鐵器如為君

清熱消毒飲 治癰疽腫痛熱渴 錢半營歸黃連

山施連翹 甘草煎取

癰疽內托法 本癰疽因積毒在藏府當先助胃壯氣使絡

時也 使毒氣外發 腫毒始覺 起高腫 內消 七日 忽平

意也 內攻 一切 瘡腫 以行 經活 血藥 為佐 參以 經絡

陷者 是內 實最 怕透 膜穿 十散 及內 補湯 藥補 填

初生 一證 深便 覺脈 沉細 而無 一邪 毒猛 暴

○癰疽 必侵 于外 根盤 不深 形證 在表 其脈 見多 浮非

○鬱使 胃氣 和平 榮衛 俱行 則邪 氣散 不能 內侵 也

○托裏 消毒 散湯 托裏 黃芪 湯歸 托裏 茯苓 湯穿 山甲

○散仙 傳化 毒湯 托裏 黃芪 湯歸 托裏 茯苓 湯穿 山甲

○清散 方奪 命散 托裏 黃芪 湯歸 托裏 茯苓 湯穿 山甲

○膿速 成膿 已潰 者使 新肉 早生 血氣 虛者 補之 陰

○陽不 和者 調之 大抵 托裏 之法 依瘡 無變 壞之 證

十宣散 治一切癰疽瘡疔已成者速潰未成者速散

○種人 參黃 芪防 益水 浸蒸 焙當 歸酒 洗厚 朴薑 製結

○梗肉 桂川 芎防 風白 芷甘 草各 等分 為末 每三 錢

○溫酒 調服 不飲 酒若 木香 湯調 下一 名護 壁都 尉服

○內托 散即 治癰 疽潰 後內 虛或 氣弱 人生 瘡

加味十宣散 治癰疽已成未成者速散

○芷防 風結 梗厚 朴甘 草乳 香沒 藥各 等分 右為 末

○每三 錢溫 酒調 服不 飲酒 麥門 冬湯 調下 右為 末

○加乳 香沒 藥二 味也 效

○固元 即藥 二味 也效

○每三 錢溫 酒調 服不 飲酒 麥門 冬湯 調下 右為 末

○加乳 香沒 藥二 味也 效

○固元 即藥 二味 也效

升陽益胃散

治腦疽背癰一切惡瘡能內托連翹

母生地黃黃連黃芩桔梗人參陳皮當歸一錢選酒七分

活防風黃連黃芩桔梗人參陳皮當歸一錢選酒七分

至各一五蓋滴右到作數十點去滓臨水二大蓋浸半日煎

內服之立消作膿者立潰此方陽藥七分陰藥各一

分勝十宣散○此方與復煎散或加乳香沒藥各一

黃連尤妙毒散○此方與復煎散或加乳香沒藥各一

千金內消散腫即癰疽及腸癰此癰便毒初起即消已

去殼二錢當歸尾酒洗一錢半赤芍藥白芷六釐子

一錢甘草節五分穿山甲三片蛤粉炒右到作

托裏消毒散

壯元癰疽服此則未成即消已成即潰能

銀花陳皮各三錢黃芪鹽水炒山甲炒焦皂角刺

風當歸川芎白芷桔梗厚朴穿山甲炒焦皂角刺

水相半煎服右病在下只用煎酒

內托千金散治一切癰疽惡瘡能內托金銀花入參

皮枯梗防風甘草各一錢右到作

汗出是藥之

仙傳化毒湯治癰疽發背乳癰一切無名腫毒未成

二分防風黃芪甘草節白芍藥赤芍各五分右到作

白芷各一錢半夏七分乳香沒藥各五分右到作

半煎服水相

托裏黃芪湯治癰疽潰後膿多虛人參黃芪當

一錢右鹿末

水煎服精

托裏茯苓湯 治同上白茯苓黃芪當歸各一錢門冬分

桂皮熟地黃甘草各七分

穿山甲散 治癰疽疔毒排膿及五毒附骨在歲府托

甲油髮灰各二錢半右為末每服

秘方奪命散 治一切癰疽無名惡瘡能內托令自消

草當節各一錢尾貝母乳香各五分右剉作一貼好酒一

大碗煎

陰疽起發法 凡背發大瘡惟發熱則謂之背若不發熱

○晦無熱瘡○瘡陰證○頭平向內沉黯不痛如牛領之皮不

正氣散 治疔為佐無以米舖猪鬃散加味為養蕎麥

切能發起可煮食之更不起發可用穿山甲頭

貼用辣桂當歸黃煎酒調服外取薑汁和麩厚

九仙傳命丹 治陰疽疔毒四虎散付之狗寶

當歸酒 治陰疽疔毒二貼每取一貼酒煎去滓入乳香

末半錢 調服

雞血散 治癰疽疔毒血盡再換不冠尖少許倒提滴

分六自愈內以煎參六兩

狗寶丸 治癰疽疔毒附骨諸般惡腫將發時先覺

藥主之粉霜黃蠟各三兩石磽石沒藥各一錢麩雄

膽臘一分者一箇初男乳一合右為末先將一信鯉魚

東坡醫集卷之二十一

四十五

放在罐內慢火化開次將各藥末和成劑丸如菜
 豆大每三九至五九用白粥投之衣被蓋定汗出為
 水送下少頃以熱葱白粥投之衣被蓋定汗出為
 效如無此藥以淵然真人奪命丹坊見代名追命
 一五名寸金丹二名返魂丹三名平命丸四名追命
 丹五名延壽丹六名來魂丸七名便活如命丸八名得
 道九名若禿身未爛服三九則非人勿示如命丸
 口問牙齦研下三九服生非人勿示如命丸
賽命丹 治癰疽發背疔瘡乳癰魚口便毒一切無名
 腫毒賽飛龍奪命丹防見蜈蚣酥酥朱砂雄黃麝
 磬血竭乳香沒藥各三錢蜈蚣麝香各五分細辛
 全蠍蟬退穿山甲白僵蚕猪牙皂角各六錢白礬
 以信石少許同枯去信石片腦各五分右為末
 午日酒糊和九菜豆大每三九以葱酒一為末
 不汗再服白粥調或吐或
四虎散 治癰疽腫硬如牛領皮按之方痛大南星草
 烏半夏生狼毒各等分右為末醋蜜調付留
 氣頭出毒

癰疽五發證 其發腦皆令人頭痛惡心寒熱是為五發至險
 五香散五香湯傾骨上六髮際生起如難得破皮起易
 疽腦鑱急破穴急破穴方不害六髮際生起如難得破皮起易
 急發內毒使破穴方不害六髮際生起如難得破皮起易
 黑如洗皮大硬不見難愈及右生皆同癰疽是
 為鬚發亦危篤左右額角及太陽穴生皆同癰疽是
 右眉發為發眉亦重鼻下人中及下頤發為
 發頤亦曰發髭亦重鼻下人中及下頤發為
 是為發背最重亦害人背後五藏俞分生癰疽為
 藥毒有勞損重風則多病源右風有氣則發食有
 熱藥毒則堅硬勞損則難醫結氣外因四氣宜服
 二香散連毒癆瘵者難醫結氣外因四氣宜服
 黃甘散連毒癆瘵者難醫結氣外因四氣宜服
 清宜遠志酒獨散蒼木復煎散房勞宜因七
 老膏花酒○蠟○毒○不○發○則○堅○如○石○不○痛
 宜甘豆湯○蠟○毒○不○發○則○堅○如○石○不○痛
 處宜著如散○石○不○發○則○堅○如○石○不○痛
 勸宜著如散○石○不○發○則○堅○如○石○不○痛

冷見○黃連消毒散坊見當歸羌活湯清熱消毒飲

托裏消毒散坊見好飲熱湯為腎虛湯○若色顯

不潰不斂為陰精消潤名腦燥不治○發鬢因怒

火宜柴胡清肝湯鬱怒者十六味流氣飲○注見甚

者仙方活命飲○脫宜內疎黃連湯千氣灌注頭

面腫大可畏○脫宜內疎黃連湯千氣灌注頭

五香散治人寒熱頭痛不香丁香沉香乳香麝香各

五分○一方無麝香有三錢水煎

五香湯宜用此透達經絡木香沉香丁香乳香麝香

二香散治癰疽因風氣食三證而注通月此調暢胃

白茯苓半夏麴厚朴陳皮蒼朮甘草各一錢半丁

水煎服

黃甘散

治外因四氣生癰疽大黃半生半熟甘草為

連翹敗毒散

治癰疽初發憎寒壯熱甚者頭痛拘急

若不消宜服仙方活命飲羌活獨活柴胡前胡桔

遠志酒

治七情內鬱成癰疽遠志酒浸去心為不溫

獨勝散

治癰疽結硬聚毒作痛蓋此疾多因怒氣得

此必清涼

四十二

晒乾為末每二錢白湯調下或甘草紫蘇煎湯調下數服腫硬自消有膿即出

國老膏 治癰疽疔毒腫痛使不內攻大甘草一斤 綸酒過以銀石器慢火熬成膏分六 次溫酒或白湯調下能疎導惡毒

槐花酒 治百種瘡毒初覺五發癰疽雖有大勢服此 消再進服即消若未

蠟 治癰疽疔毒自然內消如因藥毒發疔非此莫治黃 蠟二兩入明白礬末四兩手和勻作丸梧子大 每三十丸溫酒或熱水下日二服內疔腸癰尤妙

當歸羌活湯 治五發癰疽膏梁熱鬱者最宜當歸黃 防風羌活枳子甘草各七分獨活葉木各五分澤 瀉三分右剉作一貼水浸半日入酒一匙煎熱服

托裏益氣湯 治癰疽肉色不變或潰而不斂一切虛 附子白芍藥熟地黃當歸各一錢 甘草各五分右剉作一貼水煎服

柴胡清肝湯 治鬚疔及肝膽二焦熱怒火以鏡子 一錢半黃芩人參川芎青皮各一錢連翹桔 梗各八分甘草五分右剉作一貼水煎服

玄靈散 治五發癰疽及諸般疔腫魚臍惡瘡腫毒 取二錢好草一兩兩藥七箇燒灰乳香二錢右為末每 進三貼得汗熱酒調服連

癰疽作穴出膿法 用癰疽已作膿而頭不破膿不得出宜 膿丸打破散入毒水取膿法宜去水膏○九脹痛宜 毒餅○打破穴入毒水取膿法宜去水膏○九脹痛宜 成未破於上之薄皮剝起者膿化毒之藥取效如神

東醫寶鑑卷之九

四一

精矣

替鍼丸

治癰疽膿成未破或膿出不快先以石炭三五

用五升紙貼器盛貯臨用時以小蓋盛取半蓋農汁却

各粒一放在紙上經一宿取用白丁香碾碎如麥粒大每用一

粒一用津貼瘡口使膿不滯好肉易生則

替鍼丸

治同上白丁香二十粒碾碎如麥粒大每用一

潰膿

透膿散

即治諸癰瘡及附骨疽不潰者不用鐵刀一服

時許便出瘡口膿一取出

麝香散

治癰疽已結而頭不破白丁香研一錢斑

醋調少許點瘡頭上立破

涌泉膏

治癰疽軟而瘡頭不破或已破而瘡頭腫結

貼之許點在膏藥中准瘡口處

射膿丸

糊和熬作錠子粘在瘡頭上膿自潰出

打膿散

治癰疽不放膿出大黃五錢芒硝一分甘草節

穿山甲焦各三分半水煎五更服大便見膿小便實者五箇

效

隔皮取膿法

驢蹄肉焙蕎麥粉炒各一兩白益五錢

黃色去火毒為末醋調成膏攤厚紙上貼意處

追毒餅

諸惡瘡因錢後又閉膿水自出雄黃雄黃朱砂各

東醫寶鑑卷之七

四十一

一錢砒礪半錢輕粉少許右細末糯米乾好和
去水膏 米粉各七錢後誤入諸毒水以錢半入熟水
馬少許為膏攤一綰上貼之毒水自出驢
溫洗方 煎湯同上露蜂房白芷苦參川椒
瘰癧排膿生肌法 瘰癧潰後氣血大虛惟恐毒陷托裏

加味十全湯 治癰疽潰後氣血大虛惟恐毒陷托裏
壯而脾胃自盛膿穢自排毒氣自解死肉自去新肉
壯氣血不生由於腐肉不為肉不飲由於肌肉不生
凡藥則新肉自生必以補托為主而佐以行經活氣之
醫進飲食有回生起死之功但平分經絡不載時為安

瘰癧排膿生肌法 瘰癧潰後氣血大虛惟恐毒陷托裏

加味十全湯 治癰疽潰後氣血大虛惟恐毒陷托裏

壯而脾胃自盛膿穢自排毒氣自解死肉自去新肉

壯氣血不生由於腐肉不為肉不飲由於肌肉不生

凡藥則新肉自生必以補托為主而佐以行經活氣之

醫進飲食有回生起死之功但平分經絡不載時為安

托裏和中湯 治癰疽潰後氣血大虛惟恐毒陷托裏

白茯苓乾薑炮陳皮半夏各一錢木香甘草各

芎歸托裏散 治癰疽潰後氣血大虛惟恐毒陷托裏

桂丁香甘草草生各七分右到作一貼

加味十全湯 治癰疽潰後氣血大虛惟恐毒陷托裏

各八分芍藥炒白朮陳皮烏藥五味子桂心甘草

神效托裏散 治癰疽潰後氣血大虛惟恐毒陷托裏

煎貼酒服 聖愈湯 治癰疽潰後氣血大虛惟恐毒陷托裏

聖愈湯 治癰疽潰後氣血大虛惟恐毒陷托裏

東醫寶鑑卷之二

四十一

各一錢右剉作

托裏消毒飲

腐生癰疽潰後元氣虛弱久未收斂乃去

參黃芪白芍藥當歸白朮白茯苓陳皮連翹金銀花各一錢白芷甘草各五分右剉作一貼水煎服

癰疽瘡口深大方

深山黃牛糞塞滿瘡內藤紙貼上

百草故入藥○又白芷大腹皮露蜂房煎湯洗拭乾以黃桑葉晒為細末散摻其中常服排膿肉補散卸生肌飲醇酒食肥

癰疽去惡肉方

癰疽惡瘡中宜用藥消蝕之翠霞散助

皆癰疽惡瘡有死肉不去者白丁香香霜梅為末深則甚妙

巴豆膏

巴豆去殼炒焦研如膏如發背中央肉死

內有毒根以紙燃藥納之根夫即斂如元氣虛弱毒氣散漫中央肉死急服大補之劑中塗三四寸許至五六日赤點之界自裂補如刀割狀中央漸潰若脾胃大虛肉不知痛急補脾胃肉多復生

追毒丹

治癰疽敗肉排膿隨證治之巴豆七筒去皮

心不去油研細白麩丁香輕粉各一錢雄黃黃丹各二錢右為末和麩三錢滴水九如麥粒大錢後納其中貼以膏藥追出膿血毒去死肌乃養肉令愈

去惡散

治癰疽及諸瘡有惡肉不能去者雄黃一錢

許又再研勻每取少許點上惡肉即去門○諸瘡有惡肉者膏藥內入巴豆雄黃不傷良肉只去惡

肉有死血不去
白丁香香上之

消蝕散

消蝕惡肉
藥白礬枯肉
各一錢右為末
付惡肉上麻油
調亦得膏

鹿角散

鹿角散為主
糊貼之當腫
去惡肉生好
膠急撮膿自出
盡

雄黃散

雄黃散去諸瘡
皮研如泥入香
惡肉自去
好肉止去惡肉
諸瘡內入雄黃
各少許再研細
點上

癰疽洗法

癰疽洗法腐則成膿
當熱血凝聚之時
所頰則肉腐
洗
而氣使瘡內消也
蓋湯水有盪滌
之功通凡瘡腫
初

生一腹背者
腰腹背者
稍熱水二升
煎取一升半
以手布或新
綿蘸藥水
洗

豬蹄湯

豬蹄湯凡瘡有口
用此湯洗
去積毒
及下
水
却
將
白
煮

解毒湯

解毒湯治瘡
後用藥
破已破
皆洗
成膿
爛
最要洗
乾入痛
○一
名水師
精明
辨

東醫寶鑑

卷之三

洗毒湯 湯洗一切瘡腫 苦參煎風露蜂房甘草各二

乾艾湯 潮濕瘡口久不愈 艾葉濃煎取湯逐日溫

神異膏 貼之 香燒烟熏之

亲灰水 去瘡中膿血 洗水

盐湯 溫洗瘡毒 鹽湯

癰疽貼法 凡瘡腫初生 似有頭者即貼 溫熱藥引出

寒藥 折代熱勢 驅逐邪惡 乃撲火之義也 腫皮者用厚

者以軟帛或紙 花子塗藥 貼之 腫皮者用厚

欬藥 鐵井欄水 澄膏 沉水膏 三神膏 洪寶膏 妙香膏

黃水 膿血 流出 紙從 氣却 用膏 貼瘡 後有

靈應膏 太乙膏 雲母膏 善應膏 搗米膏 欬瘡散 挑

花散 紅玉散 生肌散 木香檳榔散 竹筒吸毒方 挑

乳香膏 治背瘡 初發赤腫 而高乳香 一兩青薄荷葉

之今熱毒消散 研勻 罌患處 青絹蓋之 如乾新水潤

園藥 南星草烏 黃栢 白芨 各二兩 五倍子 一兩 砂石

神效 如糊 隨四圍 匝如墻壁 可移險處 於不

鐵井欄 治一切癰疽 腫毒 以此圍定 不復辟開 夫容

末蜜水 調敷 入水

水澄膏 治癰瘡 熱毒 腫痛 黃連 黃栢 白芨 白斂 各四

腫處 掃上

更醫書 瘡毒 五十三

沉水膏 治癰疽發背排膿飲毒大南星七錢半白

三神膏 治癰疽發背排膿飲毒大南星七錢半白

洪寶膏 治一切癰疽發背排膿飲毒大南星七錢半白

妙勝散 治一切癰疽發背排膿飲毒大南星七錢半白

神異膏 治一切癰疽發背排膿飲毒大南星七錢半白

萬應膏 治一切癰疽發背排膿飲毒大南星七錢半白

靈應膏 治一切癰疽發背排膿飲毒大南星七錢半白

太乙膏 治一切癰疽發背排膿飲毒大南星七錢半白

雲母膏 治一切癰疽發背排膿飲毒大南星七錢半白

善應膏 治一切癰疽發背排膿飲毒大南星七錢半白

糯米膏 治一切癰疽發背排膿飲毒大南星七錢半白

糯米膏 治一切癰疽發背排膿飲毒大南星七錢半白

東醫寶鑑卷之九

五十四

午日取出用縮袋盛之風乾每旋取少許炒黑為末
冷調成膏量瘡大小貼之縮帛包定宜候瘡
愈為乾則換
常令濕為妙

斂瘡散

錢軟滑石煨花藥石煨雞內金香各一錢右為末

乾植神

桃花散

治一切瘡久不合白芨白欵黃柏黃連二三日

生肌平

紅玉散

治諸瘡生肌肉寒水石少許糝瘡上研○諸惡

瘡末血出不止寒水石

生肌散

兩寒水石滑石龍骨白礬代乾脂各五錢右為

皮極新者一兩當歸二錢半右極細末油調付或乾

糝

木香檳榔散

治瘡疔瘡癰潰後膿水不止肌肉不生

水調塗濕則乾糝膏熱瘡

竹筒吸毒方

治惡瘡疔瘡腫毒及諸般惡瘡吸出膿

二寸許一頭留節薄削去青皮以蒼木白欵竹筒
藜厚朴艾葉白芨茶芽各三錢右為末將竹筒
水二升同煮十數沸乘竹筒熱以手按於瘡上候
膿血水滿自然脫落不然用熱手按更換新筒如
此三五次其毒盡

內外分癰疽

其發在腔子而飲食者因飲食之七情者藏府受之宜
者以其視之不見故名焉○發於內者曰肺癰
心癰肝癰腎癰胃癰脾癰腸癰腹癰
臂癰乳癰腋癰懸癰便癰壘癰附骨疽流注骨疽

東醫圖書集成卷之...

五五

凡內腫備菜乳取
而即效已成者效
黃飲則未形者不成
凡內腫之初成凝結之
時蠟乳取末一合和酒
服之則不感快效也

點陰膠法

後而內疔
亦愈消疔
用先洗○
四物湯施
調物點
理湯○
雲母加
膏太枯
乙梗
膏附
九生
薑煎
服開
之見
點陰膠法
藏欲府知
所內起
直在
至點
住陰
處膠
知少
痛詩
是於
可口
醫中
也即
陰知

肺癰

中府之欲
肺癰而
喘隱而
兩痛者
肺疽上
肉微起
者肺癰
也
公膠云即
知瘡久
所口點
陰膠也
雷
振起寒居
如○振
一寒發
熱寸脈
滑數咳
唾膿血
其其肺
癰其
脈人飲
而膿
後數為
肺膿未
成澁去
但數為
膿在
膏中
難治
其○
肺癰
色白
而膿
反赤者
此火之
時自膿
血久治
如○
米大
凡肺
癰常
咳
喘短氣
白膏滿
時自膿
血久治
如○
米大
凡肺
癰常
咳
嘔膿而
乃白止
寒者自
愈○
始前
可救
先膿
成者
難治
其○
肺癰
色白
而膿
參實者
先煎
參○
肺癰
嗽而
舍於
肺前
可救
先膿
成者
難治
其○
肺癰
色白
而膿

貼方觀門
嗽膿血腥
臭肺置
之燥咽乾
膏中隱
痼梗二
便赤

滋飲葦葉
湯參木補
脾黃昏
湯五香
白木散
宜用
枯梗
湯消
赤

桔梗湯

治肺癰
各一錢
枳殼
各一錢
皮
防風
各一錢
黃芪
各一錢
歸
各一錢
芩
各一錢
白
各一錢
煎
取

消膿飲

治肺癰
紫蘊
各一錢
南星
炮
錢
射
各一錢
桔
梗
各一錢
天
門
冬
各一錢

葦葉湯

治肺癰
各二錢
地黃
七片
桑
白
皮
各一錢
梅
一錢
葦
葉
一握
水
二
蓋
煎
取

黃昏湯

治肺癰
各一錢
樹皮
一
掌
大

五香白朮散 治肺癰生肺金益脾土進飲食人參縮
 砂蓮肉白豆蔻甘草各二錢沉香木香乳香丁香
 藿香各一錢右末每三錢煎湯調下大棗湯

牡丹皮湯 治肺癰升麻間皆痛口吐膿血氣作腥臭
 右藥對作一貼水煎服

一方 而少婦膈間潰血以參芪當歸加退熱排膿藥
 多服湯吞取雲母膏作丸

參芪補肺湯 治肺癰咳吐血膿血發熱作渴熟地黃
 苓陳皮山茱萸當歸山藥五味子麥門冬各七

參朮補脾湯 治肺癰吐血膿血久不愈脾弱不食此藥
 能治肺癰生肺黃芪二錢人參白朮各一

心癰 巨關欲隱隱而痛者心疽上肉或起者心癰也
 熱凝滯而先有熱或好飲酒或嗜熱物積聚成
 一七日名并疽狀如豆大三四日起不早治則入於腹
 內固清心散

涼血飲 治心癰退潮止渴解熱能內消水通瞿麥荆
 黃梔子車前竹葉水煎服○一名引兵先鋒藥一
 貼入燈心

清心丸 治諸痛赤茯苓各五錢右為末蜜丸梧子大兩
 九散下百

東醫寶鑑卷之九

五十一

清心散 乾地黃 麥冬 知母 甘草 生各一錢 右對作

煎服加黃連三棗二水

內固清心散 效治心癱及癱疽惡瘡煩躁以此解毒神

一朴硝甘草皂角各一錢 蜜水調下 麝香各

瀉心湯 黃芩 山施子 漏蘆 澤蘭 連翹 蕪木 各七分 右

水到煎服一貼

肝癱 期發於脈下赤堅者名曰米疽 治之起者肝癱也

而盛宜柴胡清肝湯 湯方見潰後方可清熱托裏忌

熱藥小柴胡湯 證加戒用 驚不得小

腎癱 腎門欲隱下至小腹滿納上腎微起乃與內腎相

皆由腎氣衰敗而成 突起皮赤者易安 隔入皮黑 者難差宜加減八味元氣加味十奇散 上方親加 五藏癱疽俱宜杏仁連翹且與癱疽通治法相參用 山

十六味流氣飲 治癱疽無名惡腫等疾 乃表裏氣血

枳殼 烏藥 甘草 肉桂 白芍 藥櫛 榔白 芷厚 朴紫 蘇

胃脘 當帝候胃脈其胃脘當沉細何如歧伯曰逆者入

迎甚盛甚不盛則熱人迎者胃脈也 逆而盛也 逆者入

隱隱痛者胃脘也 隱隱者胃脈也 洪數者膿已成也 設

因飲食及七情火鬱復感風寒 熱濁之氣 隔塞

如人迎緊盛有肺金失養故身皮甲錯或咳或嘔或

胃脘

五十八

嘔膿血射干湯主之千金內消散坊見內消沃雪湯東垣托裏散皆可服又雲母膏作丸以括梗甘草湯亦佳

射干湯

治胃脘一錢半芍藥二錢半射干一錢右剉作一貼水煎

內消沃雪湯

治胃脘及肚內疽神效當歸身白芍藥甘草節黃芪射干連翹白芷貝母

煎水相半

東垣托裏散

治胃脘內疽及一切惡瘡治發腫痛

煎水相半

東醫寶鑑雜病篇卷之七

