



東醫寶鑑 十六

雜病論  
癰疽  
諸瘡

79  
773  
18





東醫寶鑑雜病篇卷之八

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰



癰疽下

腸癰腹癰 關元欲屬小腸天樞欲屬大腸丹田欲屬三

淋時○腸癰為病小而復惡寒身皮甲錯腹痛小便數如

腫狀甚有腹脹大轉側大有水聲或血者自愈膿○從

瘡出或積積腸內成癰脈遲者宜四大黃湯自愈○

濕香連翹湯坊見下之脈緊者宜四大黃湯自愈○

挑仁紅花玄胡索木香散○數者三急按之濡身

無熱者乃陰冷散所成宜牡丹散○腹痛十宣散加

所成宜大黃散小成宜牡丹散○腹痛十宣散加

門○成宜大黃散小成宜牡丹散○腹痛十宣散加

東醫寶鑑卷之八

瘵膿即愈或燥瘵元亦佳坊見○腹痛甚者是也治法

脉法

膿下以難知脉滑可推數而下熱腸癰何疑遲緊未  
而數則當屎膿也○腸癰之脉滑而數滑則為  
實數則為熱滑則為榮數則為衛衛數下降榮滑  
血上為敗濁相干

大黃牡丹湯

治腸癰脉遲緊膿未成可下之  
錢半右一名大黃湯一方有冬芥仁無瓜蒌仁神效  
針血○

三仁湯

治腸癰中病痛二錢半桃仁似問便可服  
錢右一名三仁湯水煎服

牡丹散

治腸癰冷證腹痛而痛時下膿血牡丹皮人  
川芎各一分桂枝各五分

敗醬散

治腸癰子無熱腹滯冷薏苡仁二錢半敗醬  
便膏下膿血而愈○

黃黑散

治腹內癰腫大黃一兩取末四錢半破故紙  
取一子一兩取末二錢每

腸癰治驗

酒吞下服一細今腹痛百方不效孫兆診曰腹痛脉當  
肘正肘頭銳骨端是穴壯下膿血而安法屈兩

白芷升麻湯

治臂癱傷於風者上先受之宜服白芷升麻湯  
錢白芷一錢半升麻各四錢

東醫寶鑑卷之八

### 醫癱

酒每紅花甘草各五分煎服  
 貼其位小雖曰多氣運不到血亦罕來中陰也其後不  
 可生癱保繞有腫痛若用尋常脈證但見虛弱之藥與滋補  
 氣血可保繞有腫痛若用尋常脈證但見虛弱之藥與滋補  
 用如指諸掌○若尋常脈證但見虛弱之藥與滋補  
 禍如指諸掌○若尋常脈證但見虛弱之藥與滋補  
 命全飲湯坊見腫硬者托裏消毒欲坊見痛宜內潰後宜加味  
 十命全飲湯坊見腫硬者托裏消毒欲坊見痛宜內潰後宜加味  
 坊見腫硬者托裏消毒欲坊見痛宜內潰後宜加味

### 懸癱

初發如前後生子大甚漸如蓮子病數十日後始覺赤  
 腫宜服挑子即破○此疾首尾常服國中老膏雖患  
 治宜服挑子即破○此疾首尾常服國中老膏雖患  
 亦輕雖潰亦淺誤用寒涼則不可救○初起作痛  
 尿澁者仙方活命飲坊見全湯坊見綿蠟元坊見者  
 急鍼道中生成瘡取外中符葉細搗蠟元坊見者  
 ○急鍼道中生成瘡取外中符葉細搗蠟元坊見者

### 國老膏

治懸癱橫紋大甘草帶節一兩四寸切以山  
 為乾則投前酒水再升煎取一升盡看甘草中飲之潤至  
 日一服二到好酒二升煎取一升盡看甘草中飲之潤至  
 日一服二到好酒二升煎取一升盡看甘草中飲之潤至  
 日一服二到好酒二升煎取一升盡看甘草中飲之潤至

### 便癱

俗名便毒實血也一名野馬經多此奇故又衛名血  
 病而先有疔瘡發或利之即散變膿後如常皆用  
 毒血聚而成初發宜疎利之即散變膿後如常皆用  
 托裏內補之藥○便毒處所生於腿腹下不在  
 腿介乎兩者之中也○便毒處所生於腿腹下不在  
 間或一腫痛或左兩邊俱發先於腿腹下不在  
 方加大黃或雙解散元通氣散坊見痛甚者散仙  
 散方加大黃或雙解散元通氣散坊見痛甚者散仙  
 散方加大黃或雙解散元通氣散坊見痛甚者散仙

三坊消毒飲玉燭散神奇散初起射干三寸生薑一

蘇方散治大便難入醋磨取千步高泥付腫處即消又生

牡蠣大黃湯治同上大黃牡蠣各二錢半甘草一

消毒飲治大便難三四日可消皂角刺三錢分右對作一

玉燭散治便毒腫痛大黃甘草各一錢右對作一貼水煎

神音散治便毒魚口瘡疔銀花連翹各一錢半穿

雙解散治便毒大黃黑丑各一錢五分右對作一

囊難道因濕熱下注也後大便利者此濁氣順下將流入

附骨疽治骨節痛則生痛及其腐潰碎骨出盡方愈然則同是一膿着骨而

生痛及其腐潰碎骨出盡方愈然則同是一膿着骨而

深無不耳。初起。附骨。筋骨。之內。痛。如。針。刺。外。則。全。無。赤。腫。突。起。初。因。露。風。冷。或。乘。涼。浴。水。刺。外。則。而。深。初。起。膿。成。即。用。火。轉。寒。熱。無。汗。得。內。積。寒。鬱。為。初。起。宜。麻。湯。在。尻。骨。宜。內。托。羌。活。湯。見。下。之。次。內。消。防。已。湯。在。腿。外。托。裏。黃。芪。湯。平。肌。散。最。妙。初。起。大。痛。而。肉。色。不。變。名。附。骨。疽。與。緩。疽。石。疽。用。青。皮。甘。草。煎。二。味。煎。服。○。骨。疽。與。緩。疽。石。疽。用。青。皮。而。相。治。之。宜。辨。

緩疽石疽賊風。其緩疽石疽皆寒氣伏於骨髓之間。肉石俱爛。故名曰。緩疽。石疽。與。皮。肉。相。似。而。堅。硬。矣。石。故。謂。之。石。疽。生。商。陸。根。搗。爛。和。益。少。許。而。堅。硬。矣。日。一。換。即。軟。○。賊。風。向。邪。搏。於。骨。髓。故。其。痛。亦。微。骨。遇。寒。則。甚。○。證。惡。寒。有。汗。痛。處。常。欲。熱。熨。失。治。則。變。為。瘰。癧。偏。枯。○。緩。疽。石。疽。宜。服。越。婢。湯。踈。通。之。劑。以。托。裏。溫。熱。之。劑。或。風。宜。服。越。婢。湯。踈。通。之。劑。以。托。

始發預防法。環。穴。痛。此。不。已。陽。生。而。骨。疽。急。吊。青。草。貼。又。不。效。恐。疔。成。上。以。被。圍。抱。下。體。使。熱。氣。熏。蒸。氣。血。而。愈。○。漏。蘆。飲。子。治。附。骨。一。錢。半。漏。蘆。白。飲。黃。芩。麻。黃。枳。實。升。錢。赤。芍。藥。一。帖。硝。石。煎。服。○。內。消。升。麻。湯。治。附。骨。一。錢。半。黃。升。麻。當。歸。右。判。作。一。貼。水。煎。服。○。羌。活。防。己。湯。治。骨。疽。發。於。太。陽。二。分。防。己。木。香。連。翹。射。干。白。芍。藥。木。通。當。歸。尾。蘇。木。甘。草。各。七。分。右。判。作。一。帖。酒。水。各。半。煎。服。○。托。裏。黃。芪。湯。治。附。骨。一。錢。七。分。柴。胡。一。錢。半。白。芷。一。錢。二。錢。

始發預防法。環。穴。痛。此。不。已。陽。生。而。骨。疽。急。吊。青。草。貼。又。不。效。恐。疔。成。上。以。被。圍。抱。下。體。使。熱。氣。熏。蒸。氣。血。而。愈。○。漏。蘆。飲。子。治。附。骨。一。錢。半。漏。蘆。白。飲。黃。芩。麻。黃。枳。實。升。錢。赤。芍。藥。一。帖。硝。石。煎。服。○。內。消。升。麻。湯。治。附。骨。一。錢。半。黃。升。麻。當。歸。右。判。作。一。貼。水。煎。服。○。羌。活。防。己。湯。治。骨。疽。發。於。太。陽。二。分。防。己。木。香。連。翹。射。干。白。芍。藥。木。通。當。歸。尾。蘇。木。甘。草。各。七。分。右。判。作。一。帖。酒。水。各。半。煎。服。○。托。裏。黃。芪。湯。治。附。骨。一。錢。七。分。柴。胡。一。錢。半。白。芷。一。錢。二。錢。

始發預防法。環。穴。痛。此。不。已。陽。生。而。骨。疽。急。吊。青。草。貼。又。不。效。恐。疔。成。上。以。被。圍。抱。下。體。使。熱。氣。熏。蒸。氣。血。而。愈。○。漏。蘆。飲。子。治。附。骨。一。錢。半。漏。蘆。白。飲。黃。芩。麻。黃。枳。實。升。錢。赤。芍。藥。一。帖。硝。石。煎。服。○。內。消。升。麻。湯。治。附。骨。一。錢。半。黃。升。麻。當。歸。右。判。作。一。貼。水。煎。服。○。羌。活。防。己。湯。治。骨。疽。發。於。太。陽。二。分。防。己。木。香。連。翹。射。干。白。芍。藥。木。通。當。歸。尾。蘇。木。甘。草。各。七。分。右。判。作。一。帖。酒。水。各。半。煎。服。○。托。裏。黃。芪。湯。治。附。骨。一。錢。七。分。柴。胡。一。錢。半。白。芷。一。錢。二。錢。

始發預防法。環。穴。痛。此。不。已。陽。生。而。骨。疽。急。吊。青。草。貼。又。不。效。恐。疔。成。上。以。被。圍。抱。下。體。使。熱。氣。熏。蒸。氣。血。而。愈。○。漏。蘆。飲。子。治。附。骨。一。錢。半。漏。蘆。白。飲。黃。芩。麻。黃。枳。實。升。錢。赤。芍。藥。一。帖。硝。石。煎。服。○。內。消。升。麻。湯。治。附。骨。一。錢。半。黃。升。麻。當。歸。右。判。作。一。貼。水。煎。服。○。羌。活。防。己。湯。治。骨。疽。發。於。太。陽。二。分。防。己。木。香。連。翹。射。干。白。芍。藥。木。通。當。歸。尾。蘇。木。甘。草。各。七。分。右。判。作。一。帖。酒。水。各。半。煎。服。○。托。裏。黃。芪。湯。治。附。骨。一。錢。七。分。柴。胡。一。錢。半。白。芷。一。錢。二。錢。

始發預防法。環。穴。痛。此。不。已。陽。生。而。骨。疽。急。吊。青。草。貼。又。不。效。恐。疔。成。上。以。被。圍。抱。下。體。使。熱。氣。熏。蒸。氣。血。而。愈。○。漏。蘆。飲。子。治。附。骨。一。錢。半。漏。蘆。白。飲。黃。芩。麻。黃。枳。實。升。錢。赤。芍。藥。一。帖。硝。石。煎。服。○。內。消。升。麻。湯。治。附。骨。一。錢。半。黃。升。麻。當。歸。右。判。作。一。貼。水。煎。服。○。羌。活。防。己。湯。治。骨。疽。發。於。太。陽。二。分。防。己。木。香。連。翹。射。干。白。芍。藥。木。通。當。歸。尾。蘇。木。甘。草。各。七。分。右。判。作。一。帖。酒。水。各。半。煎。服。○。托。裏。黃。芪。湯。治。附。骨。一。錢。七。分。柴。胡。一。錢。半。白。芷。一。錢。二。錢。

始發預防法。環。穴。痛。此。不。已。陽。生。而。骨。疽。急。吊。青。草。貼。又。不。效。恐。疔。成。上。以。被。圍。抱。下。體。使。熱。氣。熏。蒸。氣。血。而。愈。○。漏。蘆。飲。子。治。附。骨。一。錢。半。漏。蘆。白。飲。黃。芩。麻。黃。枳。實。升。錢。赤。芍。藥。一。帖。硝。石。煎。服。○。內。消。升。麻。湯。治。附。骨。一。錢。半。黃。升。麻。當。歸。右。判。作。一。貼。水。煎。服。○。羌。活。防。己。湯。治。骨。疽。發。於。太。陽。二。分。防。己。木。香。連。翹。射。干。白。芍。藥。木。通。當。歸。尾。蘇。木。甘。草。各。七。分。右。判。作。一。帖。酒。水。各。半。煎。服。○。托。裏。黃。芪。湯。治。附。骨。一。錢。七。分。柴。胡。一。錢。半。白。芷。一。錢。二。錢。

始發預防法。環。穴。痛。此。不。已。陽。生。而。骨。疽。急。吊。青。草。貼。又。不。效。恐。疔。成。上。以。被。圍。抱。下。體。使。熱。氣。熏。蒸。氣。血。而。愈。○。漏。蘆。飲。子。治。附。骨。一。錢。半。漏。蘆。白。飲。黃。芩。麻。黃。枳。實。升。錢。赤。芍。藥。一。帖。硝。石。煎。服。○。內。消。升。麻。湯。治。附。骨。一。錢。半。黃。升。麻。當。歸。右。判。作。一。貼。水。煎。服。○。羌。活。防。己。湯。治。骨。疽。發。於。太。陽。二。分。防。己。木。香。連。翹。射。干。白。芍。藥。木。通。當。歸。尾。蘇。木。甘。草。各。七。分。右。判。作。一。帖。酒。水。各。半。煎。服。○。托。裏。黃。芪。湯。治。附。骨。一。錢。七。分。柴。胡。一。錢。半。白。芷。一。錢。二。錢。

東醫寶鑑新編卷之

蟾蜍膏

分連翹鼠粘子肉桂黃芪各一錢黃柏升麻  
甘草各五分附骨疽一枚亂髮難子大敗壞或半煎服  
治大瘡去毒如膏子貼之先以桑白以口出

赤木元

皮烏煎豆二物煎湯令洗瘡口乾然貼之桑白  
附骨疽洗瘡口乾然貼之桑白

平肌散

未炒赤茯苓白芷同煎黑赤一兩香斤破故紙川  
亂治附骨疽各二錢半新桑白皮狗頭骨煨露蜂房

三生散

濕則乾末八輕粉麝香各少許  
亂治附骨等分及瘡口久不愈每服三錢溫酒調

青草蒼栢湯

心下  
草治附骨疽治作宜預各三錢皮一錢右剉作一

流注骨疽

如貼水煎和薑汁三匙空心飲之冬  
而發多生四或成風寒邪氣流注至其慢  
自消自斂通者後久不斂宜以合二陳湯  
起於餅寒傷流注也蓋流注者火於四肢  
流注而後為寒流注也蓋流注者火於四肢  
或腰腿之微紅亦聚結腫硬或如石破之  
血或出清肉之或如紫卵有移動如痰塞  
亦無膿血口之或如紫卵有移動如痰塞  
不榮骨自脫出膿水腐潰骨出則愈後如  
有正骨附骨傳合底形附骨出則愈後如

腐出則為終身廢疾隨腫硬之處潰後久不愈則

必出碎骨外用附子餅炙或慈熨法祛散寒邪補

脫瘡自斂矣門

榮衛返魂湯

烏枳殼香煎烏藥當歸甘草各一錢散石通白芷何首

酒水各半煎服

散忍冬何首烏散此方宜與肉宣散相間用之並

加藥大能順氣凡血逆於肉理令壅結為癰疽

此藥大能順氣凡血逆於肉理令壅結為癰疽

合內腫毒堅硬不穿加附子實加黃芪白全蝎加南星

甲流注毒獨活流注者氣血凝滯加獨活

治動注身血脈發至動復有病活死肌血蓋氣於

也血前拔振調於後大能順氣而凝肌血不活

如五香連翅之類是也

氣弱病必再作如內補十宣之類是也

劑也

真神仙妙

死於發於上下名曰四瀉其狀大癰不急治之百發

足皆名曰脫疽其狀赤黑者不治百死

大丁之網不寒急斬之否則死

多見因食而死或食辛辣厚味積毒而發其形

有十三種治法皆同初起有紅絲小瘡殺於其毒

日之內比之瘰癧無定處在紅絲頭

尤甚背骨節間最急其餘處在足

面背骨節間最急其餘處在足

疔疽形證

大重則嘔逆寒熱四肢沉痛如釘

赤如火盤根突起變焦黑未幾腫大如

濕爛深孔透肌如大鏡穿之狀

痛拘急惡寒四肢痛強或寒熱交作

舌間赤黑

凡諸疔瘡針刀破頭上以蟾酥敷之後用菘豆野菊

沙毛酒調飲醉既愈即定

痛無除不為疔自愈也

又一切疔瘡用紫梗菊根

並葉皆可研碎取汁滴口中

飲之



點點如珠時或驚惕甚則只吐麻木寒熱眼以中流刺火

牙關緊急時驚惕甚則只吐麻木寒熱眼以中流刺火

疔疽治法

如疔不痛蓋無之有根是也

血者急刺之百會穴三痛四宜用者累刺至心側皆不痛

迴瘡令血出以迴瘡又法急以艾炷灸之鐵疔因

不痛五香連翹以湯火燒鐵湯通赤於下若燂之

出如焦炭裏取湯散以取平復熱見次服九化毒九及二

命散或雄黃初服去其毒熱見次服九化毒九及二

活丹或雄黃初服去其毒熱見次服九化毒九及二

表虛者服保生錠子以解毒丸通治九化毒九及二

還魂散選川

紅絲疔

紅絲疔於紅線所至處刺紅線直上倉卒之際急用

香等膏於紅線內塗之鐵刺紅線直上倉卒之際急用

好否則紅線入腹者俱難治急有紅絲至心行生兩足多有

有紅絲至心行生兩足多有

魚臍疔

魚臍疔水有四畔浮瘡頭黑深形如魚臍破之滲出黃

逆鬚貼臍下如病在左手貼取汁以酒和服

臍下在左貼取汁以酒和服

脫疽疔

脫疽疔內經曰膏梁之變足大疔蓋因膏梁酒色

其狀赤黑者死不治不寒急斬之足指名曰脫疽

其狀赤黑者死不治不寒急斬之足指名曰脫疽

東醫寶鑑新編卷一

此也謂之脫疽以蒜其節內服潰爛方脫去也○  
 色赤自潰先黯不隔蒜灸更急須命坊見者  
 魂散補肉煎則割否生痛○先者隔蒜灸更急須命坊見者  
 及無名異煎一沸入則黑椒一上必死○外小治用須命坊見者  
 以內葉煎貼瘡上七日安後門單勺看瘡大外小治用須命坊見者  
 一方治疥蝨全者一二條服即愈○器中黃泥固濟火煨存  
 痛鳥細末全者一錢化水調因服少五六湯中燉大存  
 性痛止而其瘡已毒氣出寸許痛之異也○  
 疥疽死證日瘡合人甚速是在癰疽之上也○  
 也萬病入心則毒入脚心悶以似歸吐不化下或證  
 腹則煩悶嘔逆恍惚眠其驚可立待也○  
 疥瘡乳粉托裏散○  
 姑瘡乳粉托裏散○

拔疔法

死有疔○人有暴死者○疔毒急以燈照遍身  
 若疔毒急以燈照遍身○  
 拔疔法於石上必撒糞候二生去毒乾與燕  
 草葉等分爲末用竹筒一匙去毒乾與燕  
 肉內藥線緊縛取藥末一匙去毒乾與燕  
 少時藥去後則金銀白芷散調之○  
 必子或仁葉燒灰醋調塗疔上乾則去根  
 ○銀子或仁葉燒灰醋調塗疔上乾則去根  
 留根○出雄黃末煑之○  
 肉新蓋中煑火末通熱二錢服及用蠟  
 上想自出煑火末通熱二錢服及用蠟  
 稍白貼疔上根即愈○  
 刺疔封之根即愈○  
 鎊疔作炷灸風上即愈○  
 一瘡根○馬齒莧和梳垢○  
 出根○馬齒莧和梳垢○

食死牛馬禽獸肉生疔

近見患疔者皆食此肉而生病

十患外宜急取紫金錠半錠淡酒化下重者服  
神效○白頭蛆八九條爛和酒瀝去滓飲之  
其毒塗疔四圍留頭出毒氣○大如蜘蛛一箇放疔  
上自唾其毒連命又煎用其毒自取以如  
蛛入水不傷命又煎用其毒自取以如

紫金錠

一名萬病解毒丹治癰疽疔毒發背諸腫疔  
重者一錠外以涼水調塗患處服一  
數次即效惟已潰出膿血者急服一

返魂丹

治三種疔毒危惡者雄黃白礬各二錢  
輕粉沒藥乳香各五分麝香一字  
少右為末以蠟牛膽酥研爛和丸  
冷病以熱酒一盞吞下按處出汗  
藥能化毒為汗也蓋此

藥能化毒為汗也蓋此  
藥能化毒為汗也蓋此  
藥能化毒為汗也蓋此  
藥能化毒為汗也蓋此  
藥能化毒為汗也蓋此  
藥能化毒為汗也蓋此  
藥能化毒為汗也蓋此  
藥能化毒為汗也蓋此  
藥能化毒為汗也蓋此  
藥能化毒為汗也蓋此

一捻金

治疔毒即賽命丹坊見為末每服二三分温  
酒調下如服賽命丹後毒未盡起再用此藥

神效奪命丹

治疔毒惡瘡及破傷風昏沉危急者朱  
砂三錢半為末輕粉血竭各二錢枯白

蟾酥丸

治疔毒惡瘡無名腫毒朱砂雄黃各三錢麝  
香一字右末端午日取蟾酥和丸黍米大蔥

五聖湯

治疔毒皂角刺一兩大黃金銀花甘草各五  
錢黃瓜萋一箇右剉酒二升同煎至八分温

還魂散

治疔毒及癰疽能令內消去毒化為黑水從  
小便出萬無一失知母貝母白芨半夏天

見醫方類聚卷之八

粉好角刺乳香金銀花穿山甲各一錢  
如乾加美蓉葉一兩蜜水潤之過一宿自消  
爛乾以蜜水潤之過一宿自消

### 千金消毒散

二錢大黃芒硝連翹黃芩赤芍藥各一錢  
牡蠣天花粉各五分右判赤芍藥各一錢  
春

### 迴瘡錠子

治疔疽神效草烏一兩巴豆肉七箇  
之錠子先錢瘡頭至痛見血用此錠  
之重者於瘡四圍縫之二三日疔根自  
錠子名迴生

### 碧霞錠子

治疔瘡及惡瘡不覺痛銅綠一兩  
之出膏貼以錠子  
心用膏貼之

### 迴瘡瘡酥錠子

治疔瘡各錢獨沽冬花巴豆肉黃丹  
細末川新糖耐和子以黍米大作  
疔頭有血出下錠子以黍米大作

### 飛龍奪命丹

治疔瘡各錢獨沽冬花巴豆肉黃丹  
去麝香一錢二分去星夏各一錢  
紅豆大五分內取一分加入斑下  
錠子如小麥大先用鍼刺疔心下

### 雄黃丸

治疔瘡各錢獨沽冬花巴豆肉黃丹  
清下傳二  
封在口用前四水送下丸

### 化毒丸

治疔瘡各錢獨沽冬花巴豆肉黃丹  
於丸上取涎而愈

凡取涎而愈

**二活散** 治疥瘡花毒連翹白芷甘草節各二錢紅花蘇木

**獨蟾丸** 治疥瘡及一切惡瘡每取九如葉豆大

**保生錠子** 治疥瘡者二蟾酥三錢雄黃二錢為末用青桑

**神仙解毒丸** 治疥瘡者最宜及婦

**金銀白芷散** 治疥瘡白芷甘草各一錢檳榔川芎防

每取天花粉各五分右為末分三

**四聖旋疔散** 治疥瘡生於四肢之藥其疔自出此

**癰疽雜證** 有癰疽疔毒寒熱有癰疽疔毒寒熱有癰疽疔毒

**癰疽煩渴** 乾熱煩渴但用補心氣藥內補即止

**癰疽嘔逆** 未潰疔毒者當作毒氣上攻治之

參苓白朮膏防木觀補之若年老人潰後嘔者濕氣侵

于胃也宜倍白朮觀補之若年老人潰後嘔者濕氣侵

冬湯防忍冬丸忍

葉黃芪湯用人參黃芪湯黃芪六湯金銀花散五

疾首尾通用人參黃芪湯黃芪六湯金銀花散五

山茱萸五乃氣血兩虛八減八湯元加黃芪麥門冬

癰疽發渴乃氣血兩虛八減八湯元加黃芪麥門冬

癰疽發渴乃氣血兩虛八減八湯元加黃芪麥門冬

癰疽發渴乃氣血兩虛八減八湯元加黃芪麥門冬

癰疽發渴乃氣血兩虛八減八湯元加黃芪麥門冬

癰疽發渴乃氣血兩虛八減八湯元加黃芪麥門冬

癰疽發渴乃氣血兩虛八減八湯元加黃芪麥門冬

癰疽發渴乃氣血兩虛八減八湯元加黃芪麥門冬

癰疽發渴乃氣血兩虛八減八湯元加黃芪麥門冬

癰疽發渴乃氣血兩虛八減八湯元加黃芪麥門冬

癰疽發渴乃氣血兩虛八減八湯元加黃芪麥門冬

癰疽發渴乃氣血兩虛八減八湯元加黃芪麥門冬

心則多嘔逆宜乳粉托裏散生薑甘草湯○食不  
能下服藥而嘔六君子湯助加木香縮砂細○不  
湯即用愈

**癰疽痰盛** 癰疽生痰有二一者胃寒二者鬱熱俱宜  
益氣湯助喘急六君子湯加薑棗煎服或補中  
益氣湯助喘急六君子湯加薑棗煎服或補中

**癰疽寒熱** 或連日或愈之間先嘔痰而寒熱汗出而止  
水調下癰疽發於肝乳香着肝而溫之寒戰隨止  
癰疽寒熱

**癰疽作痛** 癰疽為熱毒不可不痛亦不可大痛未潰前痛者  
者實皆之能為潰膿而出而反痛者虛也○癰疽折其熱  
若寒邪之痛以溫熱之劑熨之其寒虛而痛者宜補之  
實而痛者瀉之

補之穢氣所瀉者宜和之解者乳香芍藥之類溫散之  
黃芪之類和之解者乳香芍藥之類溫散之

者防風桂枝之類補湯助加麥門冬五味子  
黃芪湯或十全大補湯助加麥門冬五味子

**癰疽泄瀉** 煎湯調下瀉宜乳粉托裏散以木香白茯苓  
腹痛泄瀉六君子湯助加麥門冬五味子

**清膈竹葉湯** 治癰疽煩渴竹葉升麻黃芪蜜炙瓜蒌  
右人參知母一貼白茯苓二枚水煎服

**竹葉黃芪湯** 治癰疽惡瘡發渴竹葉升麻黃芪蜜炙瓜蒌  
人參半夏石膏甘草各七分半

**人參黃芪湯** 治癰疽潰後少食不眠煩熱黃芪蜜炙  
麥門冬當歸神麴甘草煎服

東晉書卷之九

東晉書卷之九

黃芪六一湯 治癰疽煩渴黃芪蜜炙六兩甘草炙一兩

大治渴疾常服可免癰疽之患 煎服此藥

右末每二錢 白湯點服 煎服

金銀花散 治同上金銀花四兩甘草炒一兩

五味子湯 治癰疽口燥舌乾此腎水竭也此藥治之五

乳粉托裏散 治癰疽惡瘡毒氣攻心迷悶嘔吐喉占

末每二錢 返出毒氣不致內陷 豆粉一方 煎服

○一方 煎服 豆粉四兩 煎服

二錢 煎服 豆粉四兩 煎服

生薑甘桔湯 治癰疽毒氣衝咽隔室寒嘔吐不已

服水煎 生薑各五錢 煎服

加味不換金正氣散 治癰疽寒熱往來或疾風邪或

香葉厚朴各一錢 煎服

芎藭各七分 煎服

止痛當歸湯 治癰疽穿潰疼痛入參黃芪當歸白芍

煎服 二煎 煎服

二仙散 治癰疽疼痛不可忍白芷味煎服

香靈散 治癰疽腹痛棘桂二錢半木香白芍藥五靈

煎服 煎服

補服

托裏溫中湯

治癰疽疔毒氣下陷腹痛泄瀉逆昏噴  
附子炮二錢乾薑羌活各一錢二分半  
甘草炙一錢益母草一貼入薑五片水煎服  
各五分右到作一貼入薑五片水煎服

癰疽通治藥

千金漏蘆湯 治五癰疽及疔瘡內疽  
返魂湯 忍冬丸 忍冬酒 忍冬湯 皆可選用  
奪命丹 忍冬丸 忍冬酒 忍冬湯 皆可選用

千金漏蘆湯

治五癰疽及疔瘡內疽  
切熱毒惡腫皆治之  
見

五香連翹湯

癰疽疔毒惡腫皆治之  
切熱毒惡腫皆治之  
見

仙方活命飲

一切癰疽疔毒惡腫皆治之  
切熱毒惡腫皆治之  
見

升陽益胃散

惡瘡疔毒及背內疽一切惡瘡  
惡瘡疔毒及背內疽一切惡瘡  
見

千金內消散

癰疽疔毒及背內疽一切惡瘡  
癰疽疔毒及背內疽一切惡瘡  
見

仙傳化毒湯

癰疽疔毒及背內疽一切惡瘡  
癰疽疔毒及背內疽一切惡瘡  
見

榮衛返魂湯

癰疽疔毒及背內疽一切惡瘡  
癰疽疔毒及背內疽一切惡瘡  
見

紫金錠

治內外癰疽疔毒惡瘡  
治內外癰疽疔毒惡瘡  
見

賽命丹

治內外癰疽疔毒惡瘡  
治內外癰疽疔毒惡瘡  
見

淵然真人奪命丹

治內外癰疽疔毒惡瘡  
治內外癰疽疔毒惡瘡  
見

飛龍奪命丹

治內外癰疽疔毒惡瘡  
治內外癰疽疔毒惡瘡  
見

忍冬丸

治內外癰疽疔毒惡瘡  
治內外癰疽疔毒惡瘡  
見

內好酒浸以所浸酒打麵糊和丸

內好酒浸以所浸酒打麵糊和丸

內好酒浸以所浸酒打麵糊和丸

內好酒浸以所浸酒打麵糊和丸



忍冬酒

初發一切癰疽惡瘡百發百中忍冬不問發在何處

忍冬湯

治一切癰疽惡瘡百發百中忍冬不問發在何處

冬酒方

治一切癰疽惡瘡百發百中忍冬不問發在何處

冬酒方

治一切癰疽惡瘡百發百中忍冬不問發在何處

癰疽鍼法

息鍼者宜者如劍鋒以取大膿

癰疽鍼法

皆利丁以橫直開裂以取膿

癰疽鍼法

數直刺或如蜂窠蓮房而膿愈

癰疽鍼法

烙反攻其膿血不可烙也

癰疽鍼法

得以決行鍼烙之不可烙也

蟻鍼法

先乾處即發漸正大頂以濕紙一洗去入瘡上取大

蟻鍼法

類以管一筒安於正頂上却用大膿水一洗去入瘡上取大

蟻鍼法

以管一筒安於正頂上却用大膿水一洗去入瘡上取大

蟻鍼法

以管一筒安於正頂上却用大膿水一洗去入瘡上取大

癰疽烙法

或問烙法何如曰膿或以開竅欲出何由出厚

癰疽烙法

或問烙法何如曰膿或以開竅欲出何由出厚

癰疽烙法

或問烙法何如曰膿或以開竅欲出何由出厚

癰疽烙法

或問烙法何如曰膿或以開竅欲出何由出厚

癰疽烙法

或問烙法何如曰膿或以開竅欲出何由出厚

癰疽烙法

或問烙法何如曰膿或以開竅欲出何由出厚

癰疽烙法

或問烙法何如曰膿或以開竅欲出何由出厚

癰疽烙法

或問烙法何如曰膿或以開竅欲出何由出厚

癰疽烙法

或問烙法何如曰膿或以開竅欲出何由出厚

如膿不實者引髮為毒如腫者以紙為不除於急服

癰疽灸法

癰疽灸法凡癰疽之發或因內有積熱或因外感風寒... 白排膿好若裏赤黑藥色以防後有鮮血出... 馬灸以法移深規為改重處此輕諸項灸法皆好惟... 覺木硬而氣微出而方止經曰變色脈沉者灸之痛者當... 蒜切痛先以濕紙覆其上灸之先乾處是也... 准者灸至不覺痛為度... 餅若頭上聚艾于一餅處灸之即愈... 日始發一餅二日其心活三小四日艾初發五壯而止... 九壯而止

三四活如盜入人家所以惕達拔引毒此從治之

有開無從而灸必傷小壯數宜少壯而散防大

氣則多灸為妙有善治癰疽者皆於粉上灸至二

多則作效必矣但艾隔蒜灸之法豆豉餅灸法

艾灸治驗以一人發背醫瘡腫毒法... 藥貼之日云黑易膿盡去黑爛月餘乃復

灸石癰法堅石不潰名曰石癰... 灸發願法此瘡最險中灸二十壯如不達灸至四十

九壯而止

更醫寶鑑卷之八

二

灸疔疽法  
傳  
灸之蒜爛搗成膏塗瘡四圍留瘡頂無以艾炷

灸便毒法  
甲切斷却將此草於手腕橫大灸二起三引草向臂當

止  
安  
中草盡處即是穴艾炷如麥大灸二起三引草向臂當

調理及禁忌法  
勿驚患時將理法避風邪少睡時語

戒藥助絕思慮防觸穢便順序擇飲食  
內充無飽失度滋其毒運掉屣仲瘡口常加愛  
護○安用惡草愈收飲欲沐浴之際尚起立待  
步○損待賓客酒肉宴會真怒沐浴之際尚起立待  
瘡○勿觸犯精神如瘡氣力完全飲食其熱毒方盛

朱砂雄黃  
不可無堆黃朱砂鞣○瘡中物也凡解瘡毒

單方  
凡三十種

或發口乾煩渴飲冷水及水漿之類此乃毒氣攻心  
令口發口乾煩渴飲冷水及水漿之類此乃毒氣攻心  
凡之癰疽勿食羊雞牛魚麪煎炒之法誠富貴  
法養口腹者所宜謹守若冬寒與虛老入寧無權  
後氣血虧弱則可食羊肉羹滋養之  
蘇餅粥軟飯若肌肉漸生思慮則宜食白熟  
瘡癩皆屬於心其間抑使病入不得憂之恐入難於  
精疲須當助於心其間抑使病入不得憂之恐入難於  
隱安凡用藥○瘡癩皆屬於心其間抑使病入不得憂之恐入難於  
身安凡用藥○瘡癩皆屬於心其間抑使病入不得憂之恐入難於  
表以去之○瘡癩皆屬於心其間抑使病入不得憂之恐入難於  
昏迷慎不可下瘡汗之則愈

礬石 磁石 取之以注惡瘡 則惡肉附骨 膿血即漬出  
毒也 愈此五

伏龍肝 治諸瘡 或腫或發 背或大 一切腫毒 以雞子黃和塗

煉石 治諸惡毒 未腫及發 背取石 子火燒 赤醋淬 尋常石 餘度取

甘菊 治癰毒 取莖及 葉付二 菊葉搗 取汁飲 一升神 驗

野菊花 治癰毒 取莖及 葉付二 菊葉搗 取汁飲 一升神 驗

生地黄 治一切 癰腫地 黃泥貼 為泥攤 上三度 差幹木 香

芫蔚莖葉 治癰毒 取莖及 葉付二 菊葉搗 取汁飲 一升神 驗

白鳳仙花 治癰毒 取莖及 葉付二 菊葉搗 取汁飲 一升神 驗

辟荔 治癰毒 取莖及 葉付二 菊葉搗 取汁飲 一升神 驗

黃芪 治癰毒 取莖及 葉付二 菊葉搗 取汁飲 一升神 驗

忍冬藤 治癰毒 取莖及 葉付二 菊葉搗 取汁飲 一升神 驗

蒼耳 治癰毒 取莖及 葉付二 菊葉搗 取汁飲 一升神 驗

白芷 治癰毒 取莖及 葉付二 菊葉搗 取汁飲 一升神 驗

茅鍼 治癰毒 取莖及 葉付二 菊葉搗 取汁飲 一升神 驗

大黃 治癰毒 取莖及 葉付二 菊葉搗 取汁飲 一升神 驗

茨菰 治癰毒 取莖及 葉付二 菊葉搗 取汁飲 一升神 驗

槐花 治癰毒 取莖及 葉付二 菊葉搗 取汁飲 一升神 驗

黃桑葉 治癰毒 取莖及 葉付二 菊葉搗 取汁飲 一升神 驗

身醫軍錄雜病卷八

七

九

乳香也 止痛急 行肉令痛腫乳香破宿血消腫止痛為瘡

家奇藥也

皂角刺 治癰疽疔毒 性為末薄引至痛處亦能宣毒

槲木皮 煎湯洗諸瘡最爛瘡及

生龜 毒刺取血塗瘡腫

蜘蛛 調治癰疽疔毒 取大者一箇研爛

脂麻油 治癰疽疔毒 煎除毒瘡初作便服使毒氣不內攻

雄雀屎 醋一調名白丁香治癰腫已膿未潰出膿

甜瓜子 腹內癰要藥為末酒下二三錢

蜀葵花 諸癰瘡腫痛不可忍 蓋花根爛搗貼之效驗

葫 小蒜搗麻油治癰毒瘡厚付紅頭黃則易神效

口中唾 凡癰疽疔毒 飲酒了不可用

豬懸蹄 治癰疽疔毒 取清浸猪蹄

商陸 除癰腫疔毒 少益搗付白一切熱毒腫

芋根 搗付上發背未成膿者芋根

醋 消癰腫疔毒 同塗上瘡識者稀似鬼神

赤小豆 消熱毒瘡腫一切雞子清調

芙蓉 治癰疽疔毒 乾發背瘡疔毒及葉

荆芥 搗爛取濃汁服之亦可

引正의 불의의 가리  
관 불의의 가리  
이은나하하리

凡諸腫痔疔腫之類  
以真末和水作餅成圓  
於腫處雞子白清納  
其內過一日即無不  
不毒者神效

人尿 癰疽 發背 乾則易死 野人乾屎 疔腫 封其性 醋和如泥

諸瘡

大風瘡	五死	死血者	鼻梁	病先	受病	母受	銷衣	惡疾	之痛
瘡	者	崩死	崩	脚	夫病	夫病	被	疾	癰
柱	一	潰爛	塌	底	先	妻	服	宜	風
而	種	皮	眼	毛	損	家	消	大	者
成	皮	死	斷	穿	其	人	風	以	者
烏	水	成	唇	四	目	逆	風	其	者
頰	二	濃	肝	風	者	相	散	是	者
者	種	四	受	者	或	傳	下	受	者
榮	傷	筋	病	解	有	梁	歌	風	者
衛	納	死	而	受	墳	在	息	散	者
熱	三	手	起	病	墓	外	處	磨	者
腐	種	口	紫	遍	居	不	風	間	者
其	大	足	如	身	址	謹	命	殺	者
氣	風	一	疔	如	風	水	委	物	者
不	之	脫	三	瘡	水	坑	死	之	者
源	源	五	風	者	不	房	凶	風	者
有	三	日	者	腎	吉	室	星	古	者
故	種	骨	受	受	或	遭	遣	人	者
使	五	痛	病	心	父	此	藥	在	者

上	中	中	上	也	服	與	者	味	絕	治	無	或	花	榮	丸	補	身
出	出	出	出	藥	藥	藥	鐵	公	味	四	人	有	蛇	湯	紫	蛇	更
下	下	下	下	主	主	主	心	私	斷	五	能	遍	九	通	雲	不	
夫	夫	夫	夫	肌	肌	肌	罕	世	世	百	守	身	遍	用	治	入	
在	在	在	在	肉	肉	肉	能	務	務	皆	禁	白	通	風	之	紫	
上	上	上	上	後	後	後	免	悉	悉	不	終	脫	霄	返	以	洋	
通	通	通	通	用	用	用	此	宜	宜	再	耳	落	花	魂	未	充	
者	者	者	者	防	防	防	再	再	再	屏	一	三	散	追	蒼	捷	
以	以	以	以	風	風	風	去	去	去	而	免	如	蛇	命	耳	數	
醉	醉	醉	醉	通	通	通	於	於	於	於	於	蛇	丹	加	耳	月	
仙	仙	仙	仙	乃	乃	乃	於	於	於	於	於	蛇	鼻	苦	葉	而	
散	散	散	散	及	及	及	疾	疾	疾	疾	疾	蛇	鼻	參	君	安	
取	取	取	取	於	於	於	疾	疾	疾	疾	疾	蛇	鼻	參	君	安	
臭	臭	臭	臭	調	調	調	疾	疾	疾	疾	疾	蛇	鼻	參	君	安	
惡	惡	惡	惡	藏	藏	藏	疾	疾	疾	疾	疾	蛇	鼻	參	君	安	
血	血	血	血	二	二	二	疾	疾	疾	疾	疾	蛇	鼻	參	君	安	
於	於	於	於	病	病	病	疾	疾	疾	疾	疾	蛇	鼻	參	君	安	
齒	齒	齒	齒	重	重	重	疾	疾	疾	疾	疾	蛇	鼻	參	君	安	
縫	縫	縫	縫	者	者	者	疾	疾	疾	疾	疾	蛇	鼻	參	君	安	

東醫寶鑑 雜錄

消風散

第二錢 第一日服 晚飯次日空 心溫酒調 下身為末 每

效燥 藥

追風散

壯者二日 服八錢 炒皂角 刺一兩 半六兩 右為末 初

好服五錢 或六錢 入化五更 空服之 直待辰時 入內

前調藥一 稅入熟蜜 少許勿令 患人知 先以水 盥

數次不妨 後以薄粥 補之十日 內服老弱 者難治 五

磨風丸

九又服消 風散初復 始瘦弱者 十日內服 獨治川芎 天

子乾牛蒡 子末酒麩 糊和丸 梧子大溫 酒下五七 十丸

藥日熏洗 仍用後

洗藥

治滿身瘡 爛地骨皮 荆芥苦參 細辛各二 兩右

敷藥 治各二 兩蛇通身 黑狗脊 荆芥 寒水石 硫黃 白礬 猪脂

浴法

治遍身癩 瘡坐枕 沒頸一 槐楮五 般枝如 油安矣 煎

醉仙散 治一 兩同炒 白茯苓 苦參 瓜子 根子 蔓荆 子各

右細末 每十五 錢末入 輕粉二 錢拌勻 每服一 錢

出臭黃 泥去矣 身問如 醉然後 斷下膿 血惡臭 氣

肉根乃 去矣身 問如醉 然後斷 下膿血 惡臭氣

烏蛇白 膩燒灸 之酒煮 食之助 藥力并

通天再造散

一兩白牽 牛頭末 三大錢 炒三錢 生薑 黃

烏蛇白 膩燒灸 之酒煮 食之助 藥力并

五錢右為末每二錢或三錢早服晨後泄酒調下  
當日利下惡物或膿或虫  
其色如虫黑直候無虫乃止後取防風通聖散  
後又進一服直候無虫乃止後取防風通聖散  
服調苦參天麻蟬蛻煎

**換肌散**

蔓荆子威靈仙荆芥穗甘菊苦參紫沙參木賊  
不灰木甘草炙白茯苓藜蘆天門冬赤芍藥赤箭何首  
烏石菖蒲胡麻子草烏蒼木木鱉子川芎各三錢  
半右為末每五錢溫酒調下酒多為妙其中紫參  
無不灰木難傳

**補氣瀉榮湯**

地黃各四分黃芪二兩木黃連各六分枯梗五分黃芩生  
分白豆蔻仁參各二分甘草一分龍全胡桐淚各三分  
麝香少許桃仁三箇烏泥虫虫水蛭另末外都作  
為末右剉除胡桐淚麝香虫虫水蛭另末外都作

**凌霄花散**

末藥煎至二盞酒一盞煎後午飯後服之  
調下

**加味苦參丸**

子拘把子何首烏高餘糧蛇床子各七錢半白芷  
四錢右為末皂角煎膏和九梧子大茶清或酒下  
丸五門

**換骨丸**

香木香各三錢麝香五分溫酒化下忌麻黃三五斤煎  
膏和丸彈子大每九溫酒化下忌麻黃三五斤煎

**大麻風丸**

錢花粉何首烏各一斤羌活獨活白芷白  
二錢右為末別用皂角一斤剉水煎五日去

東晉寶鑑卷之八



萃熬膏和丸温  
酒下百丸

### 紫雲風丸

治癩初起如紫雲癩風或發紫血瘡何  
首烏四兩五加皮白殭蚕苦參當歸各二

兩全蠋一兩半惡實羌活獨活白芷細辛生地黃  
防己黃連赤芍藥蟬退防風荆芥蒼朮各一兩右

酒或米酒糊下七十九丸大温

### 返魂追命再造散

治大風癩皂角刺一兩半大黃一  
兩右為末每二錢冷酒調下

出搗○一方治大風勢重不可救者皂角刺一錢  
斤九蒸九晒研為末食上濃煎大黃湯調下

眼旬鬚髮再生肌膚悅潤

### 烏蛇苦參元

治癩風及惡癬苦參一斤半烏蛇肉八  
兩石菖蒲四兩右為末蜜丸梧子大茶

清下石

### 愈風丹

治癩疾深重一名三蛇丹治大風髮脫眉落  
遍身麻木瘡爛為蛇白蛇花蛇土桃蛇各一條

煎酒浸三日取肉為末苦參一片到搗取頭末四  
煎水吞下

### 白癩瘡

癩初起白屑剝落又一種每朝瘡上退白皮  
升許如蛇蛻宜服鮮毒雄黃元助親蒸服白

### 白花蛇丸

治癩風白屑瘡疥皮膚皴燥白蛇一條  
當歸二兩川芎白芷生地黃防風荆芥酒

為末將胡府子何首烏升麻羌活梧子大茶清下  
浸蛇酒和水煮麩糊和丸梧子大茶清下

### 白花蛇酒法

治大風癩瘡白蛇一條先蒸糯米二  
斗缸底先安酒麩次將蛇以絹袋盛之

口候於三日上然後以糯飯和勻於蛇上以紙封缸  
酒一盞調七日開取酒將蛇去皮骨焙乾為末每温  
糟做餅食之○烏蛇釀酒法亦同上

白天痘瘡用防風通聖散  
散毒及蚯蚓屎暑炒蜜  
調傳極妙

鍼法

其瀉惡風者素刺其腫上已刺以鏡鍼食其處  
大風骨節重汗出百名曰大風刺肌肉為故汗出  
百風骨節重汗出百名曰大風刺肌肉為故汗出  
紫脈出癩風血以三稜鍼令出太過恐損真氣  
紫脈出癩風血以三稜鍼令出太過恐損真氣

天疱瘡

者屬心形如綿花者屬肺多叢生於尻臂兩陰筋骨  
滿面○形如綿花者屬肺多叢生於尻臂兩陰筋骨  
之按○形如魚尾內多白水按之緊者謂之天  
一瘡乃此類之輕者內毒初起即服防風通聖散  
去外毒以黃以去內毒初起即服防風通聖散  
尾要藥輕者一劑重者十貼後安服化毒散三日  
却用吹藥三日瘡乾欲落久則風毒流入經  
後量用通聖散加減門○失治或誤服毒水為難  
粉而或成風堆腫爛流血膿出汁病至此治之為難

亦有初起安眠鼻腐爛玉莖拳攣肢體與癩無異  
○初起安眠鼻腐爛玉莖拳攣肢體與癩無異  
九○從成頑癬者安息根丸○外速腫塊者安仙遺糧  
九○西聖復煎九消腫遺根丸○成腫塊者安仙遺糧  
通仙五寶丹仙遺糧湯○筋骨痛安仙遺糧湯  
湯○成漏宜象九○黃敗毒散取輕粉法○外治空  
六○成漏宜象九○黃敗毒散取輕粉法○外治空  
洗方療法禁忌方吹藥方照藥方  
之滅癩法禁忌方吹藥方照藥方

加減通聖散

治楊梅瘡初起連翹黃子各一錢分  
治楊梅瘡初起連翹黃子各一錢分  
治楊梅瘡初起連翹黃子各一錢分  
治楊梅瘡初起連翹黃子各一錢分

加減通聖丸

治同末酒即糊或蜜和九梧子大酒飲任  
治同末酒即糊或蜜和九梧子大酒飲任  
治同末酒即糊或蜜和九梧子大酒飲任  
治同末酒即糊或蜜和九梧子大酒飲任

化毒散

治楊梅瘡重者生大黃一兩  
治楊梅瘡重者生大黃一兩  
治楊梅瘡重者生大黃一兩  
治楊梅瘡重者生大黃一兩

錢治楊梅瘡重者生大黃一兩

錢治楊梅瘡重者生大黃一兩

錢調下鳥末每二錢

消風敗毒散 治天疱楊梅初起當歸尾川芎赤芍

黃柏連翹防風各八分羌活金銀花甘草各五分

皂根丸 治楊梅瘡成頑癬當歸二兩黃芪一兩半

右為末蜜丸梧子大土

仙遺糧丸 治楊梅瘡後腫塊成癰上茯苓一斤防風

鮮皮皂角刺各五錢白芥子四錢當歸身七錢

為末蜜丸梧子大酒飲任下五七十九或浸酒服

西聖復煎丸 治楊梅瘡後腫塊經年破而難愈百方

煎炒等物小魚

各一斤兩白花蛇阿魏血竭各四錢俱末白麩炒

皮核右和勻擣至一椀入藥丸再煎至半去渣溫

消腫遺糧湯 治楊梅瘡後腫塊赤茯苓十五兩木通

白鮮皮皂角刺各五錢白芥子炒研四錢當歸身

七錢石到分作二十貼每一貼水煎服朝夕兩服

香鯨湯 治楊梅瘡毒筋骨疼痛魚腥三錢以脂麻同炒

成珠乳香一錢右到分作三貼每一貼水煎服

通聖五寶丹 治楊梅瘡或遍身疔瘡或潰爛見骨或筋

之齋或乳粉三分丹砂二分號切頑瘡惡毒並皆治

之齋或乳粉三分丹砂二分號切頑瘡惡毒並皆治

之齋或乳粉三分丹砂二分號切頑瘡惡毒並皆治

之齋或乳粉三分丹砂二分號切頑瘡惡毒並皆治

二釐半右細末每服五釐另八飛白霜二分半炒  
過合作一貼每日取土茯苓一斤水煎取汁十碗  
以湯不可別用湯水服攪勻服其神驗乃治楊梅  
服盡不飛白霜疑是輕粉也

### 仙遺糧湯

治楊梅風毒或誤服此粉以致癰瘻筋骨  
疼痛肌傷骨者服此除根永無後患土  
茯苓七錢五分皂角刺四分木通一錢  
銀花各五分

### 換骨散

治天庖瘡筋骨疼痛土茯苓四兩皂角刺一  
兩乳香沒藥各一錢半右對分作十貼每  
取一貼香水浸藥各一錢半右對分作十貼每

### 回生保命丹

治楊梅天庖瘡頭瘡及輕毒筋骨腫痛  
不拘新久皆效槐花一兩粉筋四錢二  
丁香朱砂四錢川芎白芷雄乳香各三錢當歸五分牛黃

### 茯苓湯

治遠近楊梅天庖瘡甚至腐爛肌肉膿汁  
瓜白芷當歸尾黃柏生地黃牛膝白芍藥防風各  
一兩皂角刺紅花各五錢甘草節羌活各七錢

### 象牙丸

治楊梅瘡末肉和九錢鱉甲每皮並燒心各  
以童尿化下茶清亦可七日後  
取三味末猪膽汁調付瘡上

### 活魂丹

治楊梅天庖瘡喉穿鼻崩膿血淋瀝血  
竭乳香沒藥銅綠白礬香丹穿山甲煨焦  
各一錢輕粉麝香各五分麝香一字右細末燻牛

### 水珠丸

治年久楊梅頑瘡不愈者水花珠  
枯白礬朱砂各一錢半右為末用全蠍酒煎

膏和勻分作六丸分三日服以羊

六六丸 治天疱各五錢香麝香各三分右為末糯

米糊清下一分作六丸每

天疱丸 治同上輕粉一錢半朱砂雄黃陳石各半

吞下

三黃敗毒散 治天疱楊梅等瘡防風荆芥連翹白

五加皮白鮮皮木瓜苦參蟬退金銀花薏苡仁白

草各一兩土茯苓一斤半右剉二分

取輕粉法 取每出腹內輕粉之毒可免後患用開口川

利輕粉至椒內無煙粉乃止

仙遺糧 善治久病天疱楊梅瘡漏及曾誤服輕粉肢

其虛九鼻崩眉落筋緩骨拳者皆效但初起肺熱

一方 治梅天疱諸瘡香油二斤入水一盞煎至白

次用全愈○又方鴨一隻餓二日只與白水飲

之根毒待泡主落盡鴨食之輕

洗藥方 治楊梅瘡爛防風蒼耳子地骨皮荆芥苦參

通身出汗各三兩到以河水煎盛大桶浸浴薰洗

荆芥濃煎湯浸洗效○又桃柳桑槐指濃煎湯浸

搽藥方 治楊梅天疱遍身瘡爛杏仁十四枚錢挑火

膳防風或香油調搽  
散妙防風香○又用千金散同  
散妙防風香○又用千金散同  
散妙防風香○又用千金散同

千金散

治輕揚粉梅瘡爛乳香沒藥血竭雄黃杏仁各二錢  
治輕揚粉梅瘡爛乳香沒藥血竭雄黃杏仁各二錢

麝香輕粉散

治輕揚粉梅瘡爛乳香沒藥血竭雄黃杏仁各二錢  
治輕揚粉梅瘡爛乳香沒藥血竭雄黃杏仁各二錢

熏鼻方

治楊梅天疱瘡重鼻甚奇黑鉛水銀各一錢  
治楊梅天疱瘡重鼻甚奇黑鉛水銀各一錢

吹藥方

治楊梅天疱瘡重鼻甚奇黑鉛水銀各一錢  
治楊梅天疱瘡重鼻甚奇黑鉛水銀各一錢

照藥方

治楊梅天疱瘡重鼻甚奇黑鉛水銀各一錢  
治楊梅天疱瘡重鼻甚奇黑鉛水銀各一錢

滅癥法

治楊梅天疱瘡重鼻甚奇黑鉛水銀各一錢  
治楊梅天疱瘡重鼻甚奇黑鉛水銀各一錢

禁忌法

治楊梅天疱瘡重鼻甚奇黑鉛水銀各一錢  
治楊梅天疱瘡重鼻甚奇黑鉛水銀各一錢

鵝掌癬

凡一天庖揚梅瘡脫名輕曰粉愈後手亦曰發癬風

入服蒼耳散末以線縛定○煮爛食之次日破開

皮皂角雄黃各五分以磁鉢磨去皮末臨臥以

散擦玉脂膏更灸末或內磨去根○又方

黃丹輕粉等分爲末豬油調○川烏草何首

蒼耳散

治子金銀花煎水熏洗立效○各二錢

一天麻前胡蛇床子各五分煎服

玉脂膏

治同片川椒一撮同煎服

上右烘擦再烘再擦如神

玉燭散  
熟羊乳  
此藥和血通經服之自消日  
進一服六日取效

癰癧

癰癧之證內經謂之癰疽核是也

如馬刀如銀刀如鐵項起核連腋者爲癰

浸頂或赤或白或沉或浮初生如豆或似核

治六七日其大如梅或如雞卵行或列或生

氣怖鬱其心熱初生破後流注四肢痛或

流膿汁起於少陽不守化延及陽明大抵食

之厚鬱氣積而此二端少引變人見此屬

主寒熱不食則神聖不可久轉也○熟與肝

行寒熱不食則神聖不可久轉也○熟與肝

主筋病則筋累如貫珠寒熱○熟與肝

鳥病也當清肝火爲主空清肝燥火動而筋

清肝湯毒餅爲多怒火空清肝燥火動而筋

補中勝毒餅爲多怒火空清肝燥火動而筋

凡癰癧由燥理肉燒灰存  
性之毒入腐香少許濕則乾敷  
乾則由調敷

寒熱單夏枯草散通治用狗頭丸海藻散堅丸  
 治法大槩以地膽斑斑為主滲泄小便以瀉心火  
 立應散是也然性甚峻服後量體調治實者莫不  
 丹虛者托裏益氣湯如法能使根從小但毒根  
 有根地膽斑製度如法能使根從小但毒根  
 或如粉片或如塊血或如爛肉皆其根驗耳但毒根  
 之行小便必出者何哉蓋以諸痛滑石導之然毒必  
 從○通便治者何哉蓋以諸痛滑石導之然毒必  
 熟○通治者何哉蓋以諸痛滑石導之然毒必  
 散○通治者何哉蓋以諸痛滑石導之然毒必  
 清○通治者何哉蓋以諸痛滑石導之然毒必  
 瘡○通治者何哉蓋以諸痛滑石導之然毒必  
 化氣調經湯製通流注消腫柴胡通經湯  
 每刺甘草各五錢右為末  
 角刺甘草各五錢右為末  
 二錢酒調下日三服  
 梔子清肝湯治肝膽火盛耳後頸項胃乳等處結  
 腫痛寒熱柴胡二錢梔子酒炒牡丹皮

各一錢青皮二分赤茯苓各五分右剉作一貼水煎服  
 補中勝毒餅治風升麻柴胡甘草各五分當歸主地  
 黃熟地黃白芍藥陳皮人參各三分為末湯浸  
 蒸餅調和捏作二餅子晒乾海一餅搗為末白湯  
 調下  
 夏枯草散治瘰癧散結氣有補養厥陰血脈之功  
 兼服茶清調下○補湯取一兩香附遠志貝母治瘰癧  
 馬刀聖藥也  
 貓頭丸治瘰癧一箇以朱砂三錢填入腹內瓦上灸  
 和丸星白菴豆大臨臥未飲下三九  
 海藻散堅丸治瘰癧四錢海藻昆布草龍膽蛤粉通草  
 神效



貝母白礬枯真松蘿各三錢半夏二錢右烏末蜜  
九菘豆大慈白湯下三十九或取末二錢溫酒調

### 宣熱丹

解瘰癧風熱之毒自小便出薄荷皂角連翹  
何首烏蔓荊子三稜荊芥各一兩右烏末熟

### 三聖丸

通治瘰癧丁香五粒斑貓十箇去毒炒麝  
香一錢右烏末鹽豉五十粒斑貓十箇去毒炒麝

也之  
脚根

### 小犀角丸

治諸瘰癧效如神常服去根黑丑半主半  
炒取頭末犀角青皮陳皮各一兩連翹五

錢右烏末犀角二條去皮弦子湯浸絞取汁一椀  
新薄荷二斤取汁同熬膏和丸梧子大連翹薄荷  
湯吞下三服  
丸食後服

### 散蓮潰堅湯

治瘰癧及馬刀瘡生而不潰或潰出膿  
水黃芩一錢酒洗半生半炒草龍膽酒

洗六分瓜要根酒洗半生半炒草龍膽酒  
布海藻各七分柴胡六分交甘草三稜酒洗蓬朮  
酒炒連翹各三分葛根白芍藥常歸梢各四分黃  
連酒洗升麻各三分右到作一藥常歸梢各四分黃  
食後去枕低頭而卧含一口作十次吞下徐服  
之另搗一劑為細末蜜丸菜豆大每取百丸以煎  
下藥湯送

### 內消丸

治瘰癧結核熱毒帶膠之內消黑丑八兩  
取頭末青皮陳皮各二兩右烏末少薄荷皂

### 琥珀散

治瘰癧結核熱毒帶膠之內消黑丑八兩  
黃芩各一錢右烏末少薄荷皂

### 天花散

治瘰癧結核熱毒帶膠之內消黑丑八兩  
二錢琥珀二錢右烏末少薄荷皂

良醫寶鑑卷之八

立應散

乳香二分 芷當歸各一錢 貝母七分 沒藥五分 赤芍藥川芎各三錢 白芍

薄荷丹

薄荷葉 蘇合香 安息香 沒藥 赤芍 藥川 芎各三錢 白芍

白蛇散

白蛇 烏末 蘇合 安息 沒藥 赤芍 藥川 芎各三錢 白芍

益氣養榮湯

當歸 酒洗 川芎 芍藥 黃芪 一錢 半 人參 白朮 各一錢

蠟礬元

蠟 礬 元 治 諸 毒 疔 瘡 疔 瘡 疔 瘡 疔 瘡 疔 瘡 疔 瘡

四聖散

四聖散 治 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩

連翹散

連翹 散 治 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩

送下丸

送下丸 治 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩

百九煎藥水

百九煎藥水 治 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩

之用永斷根除

飲調下鳥已時利下惡物乃病根也十日後再服後

為末致和丸

為末致和丸 治 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩

為末致和丸

為末致和丸 治 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩

為末致和丸

為末致和丸 治 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩

為末致和丸

為末致和丸 治 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩

為末致和丸

為末致和丸 治 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩

為末致和丸

為末致和丸 治 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩

為末致和丸

為末致和丸 治 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩

為末致和丸

為末致和丸 治 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩

為末致和丸

為末致和丸 治 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩

為末致和丸

為末致和丸 治 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩

為末致和丸

為末致和丸 治 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩

為末致和丸

為末致和丸 治 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩

為末致和丸

為末致和丸 治 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩

為末致和丸

為末致和丸 治 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩

為末致和丸

為末致和丸 治 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩

為末致和丸

為末致和丸 治 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩

為末致和丸

為末致和丸 治 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩

為末致和丸

為末致和丸 治 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩 癩

消腫湯

治馬刀瘡連翹二錢生黃芩柴胡甘草各一錢二分  
鼠粘子黃連各五分紅花二錢  
分右剉作一貼水煎服

柴胡通經湯

治少陽經分項側有核堅而不潰名曰  
瘡枯梗二錢柴胡連翹當歸尾黃  
芩黃連並酒炒鼠粘子三稜甘草生  
一錢紅花一分右剉作一貼水煎服

一方

治瘰癧去貓卵一服煎五積散麩一送下四五  
效即

外治法

凡瘰癧馬刀疔毒日久成膿若腫高消軟  
其人面色萎黃皮膚壯熱上蒸膿已成也  
其法以火中刺入毒肉中納蟾酥膏之  
治法決以火中刺入毒肉中納蟾酥膏之  
膏貼之三日後取核以中稠膿盡取去後  
膜先破初起之後取核以中稠膿盡取去後  
皆愈或不收銀杏者盡開藥則後出者  
自潰者猶如木果之腐熟肉雖潰而核猶存故其

蟾酥膏

治瘰癧馬刀疔毒日久成膿若腫高消軟  
其人面色萎黃皮膚壯熱上蒸膿已成也  
其法以火中刺入毒肉中納蟾酥膏之  
治法決以火中刺入毒肉中納蟾酥膏之  
膏貼之三日後取核以中稠膿盡取去後  
膜先破初起之後取核以中稠膿盡取去後  
皆愈或不收銀杏者盡開藥則後出者  
自潰者猶如木果之腐熟肉雖潰而核猶存故其

綠雲膏

治瘰癧馬刀疔毒日久成膿若腫高消軟  
其人面色萎黃皮膚壯熱上蒸膿已成也  
其法以火中刺入毒肉中納蟾酥膏之  
治法決以火中刺入毒肉中納蟾酥膏之  
膏貼之三日後取核以中稠膿盡取去後  
膜先破初起之後取核以中稠膿盡取去後  
皆愈或不收銀杏者盡開藥則後出者  
自潰者猶如木果之腐熟肉雖潰而核猶存故其

金寶膏

治瘰癧馬刀疔毒日久成膿若腫高消軟  
其人面色萎黃皮膚壯熱上蒸膿已成也  
其法以火中刺入毒肉中納蟾酥膏之  
治法決以火中刺入毒肉中納蟾酥膏之  
膏貼之三日後取核以中稠膿盡取去後  
膜先破初起之後取核以中稠膿盡取去後  
皆愈或不收銀杏者盡開藥則後出者  
自潰者猶如木果之腐熟肉雖潰而核猶存故其

去風每取併付按上再付即  
禁忌法戒人有此患切忌毒藥點蝕及其妄用鐵刀割破必

糝貼藥凡瘰癧馬刀惡瘡空用生蠶散散選用○初起未

患處神效方白膠香海蝶降真香等分○治

急用香油四兩同熬成入粉二條以桑枝七條

貓蝠散治瘰癧為末糝爛肉上三日其核即下○

代灸散

治瘰癧潰爛臭不可聞末用槐皮各一錢

龍泉散治瘰癧三錢炒即磨刀○乾上粉也

蝸牛散治瘰癧穿瓦上曬乾燒存○末入輕粉少許

燒灰散治瘰癧者乾糝未破者油調付○

生權散治瘰癧性高末油調先洗瘡後塗○

長壽寶監律前第八

三五

之甯并兩耳右

身醫寶監律前第八

三四

之甯并兩耳右

洗傳方

治瘰癧白芷荆芥煎湯溫洗一錢乾貼膏藥

調為末得效

難治可治證

帝曰寒熱瘰癧生於頸腋者何氣留於脈

而不去者也帝曰決死生奈何岐伯曰一脈一歲死見一視  
之其中有三歲死見二脈二歲死見一脈一歲死見一視  
死脈見三脈三歲死見二脈二歲死見一脈一歲死見一視  
也經聞有潮熱或咳者死經調及經閉無潮熱者可治  
日服一貼七八日自消也故勞瘵類有瘵有潮熱有塊  
咳乃瘵傷證之標也故勞瘵類有瘵有潮熱有塊  
頸上中府雲門經部者瘵延及  
灸法 是治瘵以手置肩或二七壯取之骨尖上  
於掌後灸三壯即效

結核

癰核上每灸七壯此穴疎絡  
獨形而小者為結核也須破核者熱氣散則  
鬱結堅硬如果中核也須破核者熱氣散則

用藥散核丸加酒炒大黃滑軟○胡連翹煎服○  
二陳湯煎加酒炒大黃滑軟○胡連翹煎服○  
結核在臂二陳湯煎加酒炒大黃滑軟○胡連翹煎服○  
角刺白蠟蚕煎水入麝香少許服川芎酒茶蒼朮皂  
積丹刺白蠟蚕煎水入麝香少許服川芎酒茶蒼朮皂  
胃丹刺白蠟蚕煎水入麝香少許服川芎酒茶蒼朮皂  
痰結竹瀝自消痰丸通氣消痰丸通氣消痰丸通氣消痰丸  
海帶丸 治痰核為末蜜丸彈子大食後化一丸  
含化丹 治耳項結核為末蜜丸彈子大食後化一丸

消風化痰湯

治結核因風痰鬱結白附子木通各一錢南星半夏芍藥連翹天麻白僵蚕  
蒼耳子金銀花全蝎陳皮各四分甘草二分右到  
活皂角各五分

開氣消痰湯

治胃中胃脘至咽喉狹如線疼痛及  
手足俱有核如胡椒者結梗便香附白  
僵蚕各一錢陳皮片芥射干威靈仙各五分  
夏枳實羌活荆芥射干威靈仙各五分  
木香三分右到作一貼

內托白斂散

治腋下痰核因酒怒氣發腫潰膿久  
不差赤芍藥當歸連翹各一錢白芷白  
斂散不差赤芍藥當歸連翹各一錢白芷白  
斂散不差赤芍藥當歸連翹各一錢白芷白  
斂散不差赤芍藥當歸連翹各一錢白芷白

消解散

治喉結核腫痛項不得回轉兩腋下或  
有塊如石硬南星辛夏各一錢陳皮枳實桔  
木煎服

梗柴胡前胡黃連連翹赤芍藥防風獨活白附子  
蘇子蓬木蔓荊子木通廿草各五分右到作一貼

消核丸

治頸項耳後結核三歲成簇大黃酒煨連  
翹各一兩兩片童便炒另研天花粉瓜蒌仁  
酒拌炒蠟燭炒和九菜豆大甘湯下八九錢  
湯錢白蠟和九菜豆大甘湯下八九錢

又方

治塊少皮經中疔瘡結核或赤腫痛生如  
神和勻每服一錢至二錢茶清調下  
痰核疔瘡商陸根生南星合搗爛塗之立消  
又方南星草烏等分生薑合搗爛塗之立消

瘦瘤

人身氣血凝滯結為瘦瘤則憂慮所生多着於  
項氣血凝滯結為瘦瘤則憂慮所生多着於  
項氣血凝滯結為瘦瘤則憂慮所生多着於  
項氣血凝滯結為瘦瘤則憂慮所生多着於

堅硬不可移者名曰石瘦肉色不變名曰瘦筋  
脈露結名曰移者名曰石瘦肉色不變名曰瘦筋  
多致名曰氣痿五瘦皆下不可決破名曰血瘦  
李瘦大狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂  
血瘦石瘦而光漸如孟卵名曰肉瘦尤不可破  
疑殺人惟成惟憂去其傷心肺故瘦多瘰癧皆  
也勞瘵邪氣乘元氣之虛則自然消縮最妙有  
通治瘵癆癘氣若元氣之虛則自然消縮最妙  
指○五瘦六瘵或或或或或或或或或或或或  
參化瘵癉丹海帶九坊或硬無痛無瘵瘵瘵瘵  
瘵方祛瘵味化瘵膏南星膏等○服治瘵瘵瘵  
須斷厚味○化瘵膏南星膏等○服治瘵瘵瘵  
理於年壯可無後憂也○瘵瘵瘵瘵瘵瘵瘵瘵  
味氣飲壯可無後憂也○瘵瘵瘵瘵瘵瘵瘵瘵  
破結散生瘵大如筋子刺上海瘵散百治不效得此方人

去松蘿代真桑寄生一倍服  
三五日其瘵自消散而愈  
人參化瘵丹治瘵癉海帶九坊或硬無痛無瘵瘵瘵瘵  
帶後能軟堅  
食後能軟堅  
之藥治瘵癉  
砥掌散治瘵癉海帶九坊或硬無痛無瘵瘵瘵瘵  
分○末蜜丸彈子大輪化下青鹽等  
神效開結散治瘵癉海帶九坊或硬無痛無瘵瘵瘵瘵  
類○大錢微色  
重者一錢微色  
全愈  
治瘵癉方粉則愈或有如茄垂下根甚小者用藥照  
治瘵癉方粉則愈或有如茄垂下根甚小者用藥照  
治瘵癉方粉則愈或有如茄垂下根甚小者用藥照

身醫寶鑑

膏其貼之防其出肌

### 枯癯方

餅和九蓋上以黃栢子末水調貼之數月自然枯落

### 化瘤膏

黃二錢調勻攤布貼之雞子黃連當歸大白礬各五錢吳茱萸

### 南星膏

頻貼取效如無生者乾者為末醋調用之

### 又方

瘦之瘤結氣換鐵砂服半斤洗去醃丸常含化燕汁

### 瘡癩

瘡癩者諸瘡之潰漏也瘰癧鼠瘻是為瘡癩其證

### 灸法

服合煎汁七日差清

乳散蜂房散選用通治宜加味平肌散

酒冷生肌宜溫解宜散宜龍骨散

取漏蟲法熏方洗方取久漏中朽骨方治心漏方



溫解散

治漏瘡散風冷蒼朮厚朴陳皮藿香半夏麩

內塞散

治疔瘡痲瘋久不瘳人參黃芪當歸赤小豆甘草

牽牛酒

引瀉滯中惡水自大腸出黑牽牛頭末二錢

人牙散

治各等分右為末入麝香輕粉各少許和勻

蜂房散

治久年漏瘡露蜂房炙黃七錢半穿山甲焦

付之

加味蠟礬丸

治久新諸漏象牙五錢露蜂房白蠟

內生肌丸

治漏瘡枯白礬鹿角脂各一兩為末

乳麝雲母膏

起泡瘡穿山甲一兩末四兩入乳香夫一

溫經丸

治臨脉久痿附子二兩醋浸炮七次去皮臍

截疔散

治年深疔瘡瘰癧白欬黃丹密陀僧各二

東醫集錄卷之八

四

乾糝  
繼之

雄黃膏

膏貼  
之

治久年冷瘻油髮灰黃蠟各五錢雄黃末成

黑靈散

通治  
錢半

瘻露蜂房五錢牡蠣粉黃丹硫黃研

翠霞散

治漏瘡  
粉

惡瘡去毒生肌滑石五錢銅綠二錢

翠霞錠子

治久冷  
錢

瘻內有死肉銅綠寒水石各一錢

熏漏瘡方

如燒香  
法

置長桶內坐其上熏之

洗漏瘡方

取東向  
石

露瘡房或大腹皮苦參煎湯熏洗拭乾

取久漏中朽骨方

火煨通  
紙

久瘻及痔漏中有朽骨宜取去之

治心漏方

等分  
大

少載前外有孔常出血謂之心漏此病醫書

取漏蟲法

不可忍  
盡

取塗上下覆魚數條令盤屈以竹簽串定香油

禁忌法

不然則  
核

則核則大漏則水多搗氣

東醫集卷之八

白



剪草散 治刀草砂疥白蛇床子三錢寒水石一錢蒼朮厚朴

硫黃餅 治末用虫疥及喜熱火灸者礬製用熟艾一兩為

三黃散 治膿痂疥瘡用麻油調乾硫黃末擦之

升麻和氣飲 治疥癩痛癢乾葛二錢陳皮甘草各一

一掃散 治一切瘡疥輕粉一錢右為末另用大鯽魚

魚一箇入香油煎候熟去

神異膏 治蛇上全蠲七箇皂角二錢巴豆去皮七箇

如聖散 治疥癩風癢生瘡疥浸展胡粉一兩黃連七

油調立效散 治濕疥浸淫久不差輕粉綠礬黃柏

麻豆膏 通治諸癬疥油二兩入巴豆肉草子肉各

白蠟五錢蘆薈末三錢攪勻成膏塗之

身生癬獨莖羊蹄根另搗白礬末以米醋調成膏

東醫寶鑑卷之九

黃塗丹之妙加粉

蝎猫膏 治牛皮癬 一兩 右同熬候色焦十枚 巴豆肉二枚

胡粉散 治癬神效 入盆少許常挑一匙 空心酒調下 雞

連粉散 治風濕癩瘡 骨腫 胡粉 各五分 右為末 乾

秘傳一擦光 治疥癬及諸般惡瘡 神效 雄黃 硫黃 六錢

當歸飲子 治遍身疥癬 腫痛 疥癬 疥癬 疥癬 疥癬 疥癬

何首烏散 治遍身疥癬 腫痛 疥癬 疥癬 疥癬 疥癬 疥癬

蕪荑散 治疥癬 腫痛 疥癬 疥癬 疥癬 疥癬 疥癬

浮萍散 治諸疥癬 及癩瘡 浮萍 二錢 右到分作二貼

洗藥 治疥癬 腫痛 疥癬 疥癬 疥癬 疥癬 疥癬

何首烏散 治疥癬 腫痛 疥癬 疥癬 疥癬 疥癬 疥癬

洗藥 治疥癬 腫痛 疥癬 疥癬 疥癬 疥癬 疥癬

何首烏散 治疥癬 腫痛 疥癬 疥癬 疥癬 疥癬 疥癬

洗藥 治疥癬 腫痛 疥癬 疥癬 疥癬 疥癬 疥癬

何首烏散 治疥癬 腫痛 疥癬 疥癬 疥癬 疥癬 疥癬

身醫寶鑑卷第八  
四十四

單方

○末熟方右各油二塗粉瘡付飲散  
○又油洗爛為三錢付半極少宜外坊  
○免調之木末錢付半極少宜外坊  
○絲付○耳另用白芷○小兒大黃  
○子連又為末蜜調伏龍肝又懸龍尾  
○或床胡末蜜調伏龍肝又懸龍尾  
○或床胡末蜜調伏龍肝又懸龍尾  
○或床胡末蜜調伏龍肝又懸龍尾

鍼灸法

○末熟方右各油二塗粉瘡付飲散  
○又油洗爛為三錢付半極少宜外坊  
○免調之木末錢付半極少宜外坊  
○絲付○耳另用白芷○小兒大黃  
○子連又為末蜜調伏龍肝又懸龍尾  
○或床胡末蜜調伏龍肝又懸龍尾  
○或床胡末蜜調伏龍肝又懸龍尾

癩頭瘡

○末熟方右各油二塗粉瘡付飲散  
○又油洗爛為三錢付半極少宜外坊  
○免調之木末錢付半極少宜外坊  
○絲付○耳另用白芷○小兒大黃  
○子連又為末蜜調伏龍肝又懸龍尾  
○或床胡末蜜調伏龍肝又懸龍尾  
○或床胡末蜜調伏龍肝又懸龍尾

身醫寶鑑卷第八  
四十四

酒歸飲 治頭瘡酒當歸白木各一錢半酒芥酒芍藥

神應膏 治白禿頭瘡一羊糞燒存性烏末

連床散 治小兒癩頭瘡及身上諸瘡黃連五錢蛇床

如聖黑膏 治小兒白禿頭瘡豆豉半升草龍膽蕪荑

人面瘡 清心悔過內服十味流氣飲

大苦參丸 治赤白痢疾黃芪羌活白附子

陰蝕瘡 夫陰蝕大瘡亦有三等一曰濕陰二曰

精流 精入者由陰上生瘡久成疔瘡

有敗精 留滯或熱結下焦經絡滯或痛入子妨

洗敗精 留滯或熱結下焦經絡滯或痛入子妨

愈則必潰 爛侵蝕肌肉膿血遺止湯成下疳

痔尿或出 宜八津宜龍膽瀉肝湯煎腫痛潰尿後

和閉口 其人喜數日可治即取貝母

眉閉口 其人喜數日可治即取貝母

和閉口 其人喜數日可治即取貝母

和閉口 其人喜數日可治即取貝母

和閉口 其人喜數日可治即取貝母

和閉口 其人喜數日可治即取貝母

和閉口 其人喜數日可治即取貝母

和閉口 其人喜數日可治即取貝母

和閉口 其人喜數日可治即取貝母

和閉口 其人喜數日可治即取貝母

和閉口 其人喜數日可治即取貝母

和閉口 其人喜數日可治即取貝母

和閉口 其人喜數日可治即取貝母

和閉口 其人喜數日可治即取貝母

和閉口 其人喜數日可治即取貝母

和閉口 其人喜數日可治即取貝母

和閉口 其人喜數日可治即取貝母

和閉口 其人喜數日可治即取貝母

和閉口 其人喜數日可治即取貝母

和閉口 其人喜數日可治即取貝母

湯訪或加柴胡或子知母久服致下疳日久  
不愈或便毒復來生也醫陰頭腫痛生疳俗名下疳  
未已便毒復來生也醫陰頭腫痛生疳俗名下疳  
疳乃督任衝三脈之會其根在足少陰腎經  
解毒丸而先宜升麻葛根湯藥見發出精初發  
在陰頭如粟拂之即痛甚清膿作白孔蝕之  
痛婦人有生於玉門內正似疳蝕但痛為異  
磨風膏溫潤之精○甘草通湯消疳散煎血  
解毒丸

### 涼血解毒丸

治下疳苦參四兩黃連二兩惡實二兩連翹一  
兩白芷各一兩防風石膏各五錢水為末  
煎湯打糊和丸梧子大空溫水吞下百丸  
消疳敗毒散 赤茯苓木通草龍膽各九分連翹赤芍藥  
黃連蒼朮知母各七分燈心一團水煎服  
草三分右判作一貼心一團水煎服

### 洗瘡藥

凡下部諸瘡常須藥湯淋洗以去膿汁惡水宜  
洗疔湯 艾葉下疳等分煎水以青布蘸洗立效

### 大豆甘草湯

治陰蝕下疳一合槐條一握右煎取清候溫  
二浸浴日

### 洗毒散

治陰蝕瘡及諸般惡瘡蛇床子地骨皮大薊  
麻黃荊芥防風枯白礬各三錢葱白三莖煎

### 洗下疳方

黃柏黃連當歸白芷獨活防風杜蘅  
芥各三錢入銅錢五十文烏梅五箇煎

### 糝粉藥

水林洗後乃用糝粉之藥宜栢哈散津調散  
附或 糝粉

夏... 四... 五... 附... 糝粉



相吟散 治下疳濕瘡 黃柏以磁鋒刮取末 蛤粉 黑粉 石末

津調散 治地骨如精瘡 黃連 煎款冬花等分 右為末 先以

鳳衣散 治下疳 各瘡 鳳凰 煎水 洗拭 乾或鴨子 清調付

旱螺散 治同上 香油 田螺殼 入腦 麝香 粉 各少 許 久

玢珠散 治下疳 瘡 黃連 黃柏 乳香 沒藥 孩兒茶 輕粉

磨風膏 治陰蝕 瘡 蛇床子 五錢 大風子 十錢 輕粉 杏仁

一方 治初起 疳疔 元首 耳黑 鈿五 錢化 開投 汞二 錢半 研

又方 治年如 神調 斷 先以 葱艾 椒煎 水洗 患處 乾移 之一 亦

又方 治皮初 如少 陽道 興強 不當 泄不 泄不 泄強 泄瀉 爛痛

又方 治起事 膿臨 斷瘡 契冷 水堅 勿令 安陽 矣與 乾地 骨皮 煎水 洗去

又方 治髮黃 連仍 米三 飲五 孔小 漏瘡 出微 膿油 髮灰 瘡瘡 雜調

又方 治下疳 瘡 蝸上 生瘡 乾枯 白布 為末 黑則 乾移 或注 調

付下 疳瘡 蝸上 生瘡 乾枯 白布 為末 黑則 乾移 或注 調

夏月... 卷之八

不治證

廉瘡

下疳重者心中疔痛  
 絕虛煩甚者不中疔痛  
 其兩脚腫爛臭穢步履艱辛此瘡生於臍骨為重以於其骨上肉少皮薄故難愈治法當先取虫然後多外貼膏藥內服蠟藥全愈  
 腫痛三陰虛也宜宜八物湯  
 寒少食屬肝腎虛宜入味九湯  
 參九食屬肝腎虛宜入味九湯  
 或馬齒膏濕熱外瘡先以葱湯洗次貼以鹽湯先  
 後貼黃蠟膏○內外瘡及腳膝生瘡局方虛損門  
 禪徒膏馬齒膏翠玉膏白膠香散貼藥三方鍼法  
 洗法取  
 虫法  
 龍骨膏  
 綿紙兩重貼瘡上滿口翻貼之  
 夾內縛貼瘡上滿口翻貼之

馬齒膏

窰土膏

蠟礬紙

黃蠟膏

治黃蠟五兩再熬成膏塗之  
 治瘡久年窰土或窰心黃土黃  
 石脂外黃丹各五錢輕粉乳香沒藥各一錢  
 為末香油調成膏先以茶清洗後油紙攤藥貼之  
 以巾縛疔心縱成痂不可忍直待結痂去之未愈再貼  
 火邪乳香沒藥以散濕清熱黃柏之全矣  
 成治方內臘瘡神效綿紙疊十重看瘡大小剪  
 四十九粒慢火熬一兩枯渣入攪粉四分九寸煎  
 黑去渣入黃蠟一兩錢輕粉二分九寸煎  
 即入紙令油香透勿令焦黃取時下近瘡  
 水一洗拭用紙令油香透勿令焦黃取時下近瘡  
 紙一重候愈取  
 盡則瘡全愈取  
 石脂化入白膠三錢攪勻候冷盛磁器每用  
 作薄片貼瘡末各三錢攪勻候冷盛磁器每用

粉麝散 治外癩瘡臭爛數十年不愈生龜殼末入醋

神捷膏 治內外癩瘡久不愈清油半斤先煎入黃

翠玉膏 治癩瘡將香末旋攪勻成稠將藥於火上熔化

白膠香散 治內外癩瘡白膠香末旋攪勻成稠將藥於火上熔化

單方 治癩瘡黃蠟一兩所粘之切一筒輕粉二錢右熔化

石膏 各一兩青黛五錢龍骨一錢右為末香油調

石脂 一錢鹿角末香油調

石炭 一錢鹿角末香油調

石硫 一錢鹿角末香油調

石硫 一錢鹿角末香油調

石硫 一錢鹿角末香油調

石硫 一錢鹿角末香油調

石硫 一錢鹿角末香油調

石硫 一錢鹿角末香油調

石硫 一錢鹿角末香油調

石硫 一錢鹿角末香油調

石硫 一錢鹿角末香油調

石硫 一錢鹿角末香油調

石硫 一錢鹿角末香油調

石硫 一錢鹿角末香油調

石硫 一錢鹿角末香油調

石硫 一錢鹿角末香油調

石硫 一錢鹿角末香油調

石硫 一錢鹿角末香油調

石硫 一錢鹿角末香油調

石硫 一錢鹿角末香油調

石硫 一錢鹿角末香油調

腎臟風瘡

出大即去之貼

腎臟風瘡初起如兩足漸大失跟作痛多於內脛遍身者有  
 之貌以腎氣付白膠麝香散坊見以四生散未每取黃錢  
 入猪腎內煨熟空乃三陰經下熱鬱火血所致  
 與腎藏風瘡相類乃三陰經下熱鬱火血所致  
 浮萍黃芩常膿水歸痛潮盜汗宜四磨湯  
 大馬齒膏塗之打撲而或積年不愈又染極闊皮薄類  
 生於脚脛或打撲而或積年不愈又染極闊皮薄類  
 如竹膜極痒痛取韭菜地積年不愈又染極闊皮薄類  
 患者須忌房室取韭菜地積年不愈又染極闊皮薄類  
 油調付或白活血驅風散又付擯柳散  
 腎藏風瘡宜服活血驅風散又付擯柳散  
 大馬齒膏相治兩足血驅風散又付擯柳散  
 以桐油或麻油洗把乾後乃貼之先  
 輕粉一錢錢黃丹末

擯柳散

慢火煎一兩入蠟一錢雄黃硫磺各半錢右為末入蠟油中調勻藥水  
 入蠟一錢雄黃硫磺各半錢右為末入蠟油中調勻藥水  
 連杏仁輕粉各半錢右為末入蠟油中調勻藥水  
 立效瘡爛之

活血驅風散

活血驅風散治腎藏風瘡疥癩由肝腎虛為風濕  
 荳蔻仁橘紅藜炒厚朴枳殼各六分當歸川芎白  
 荳蔻仁橘紅藜炒厚朴枳殼各六分當歸川芎白  
 各五分右剉作末貼許空服藥二  
 枚同煎入乳香末許空服藥二

雞心散

雞心散治腎藏風瘡疥癩由肝腎虛為風濕  
 錢入輕粉青黛各半錢麝香少許外腎女掩兩乳各  
 照每用少許清油護抹兩掌掩外腎女掩兩乳各  
 用之經日又

凡此皆宜宜在病前

五十一

伯東瘡用煎熟桐油調  
密陀僧傳

單方 脚腫上生瘡漸大極上不已痒不可忍成瘡根  
浸淫瘡 初生甚小先痒後痛汁出浸淫濕爛肉則乾  
○流先向四股者大腹皮煎湯洗之入口者不可治  
○宜用苦瓠散

苦瓠散 梁上塵一兩 蛇蛻燒灰 蜂房 微炒 各五錢  
○單方 卒得浸淫瘡 不早治 則殺 人 胡麻生 爛  
○宜用苦瓠散

單方 卒得浸淫瘡 不早治 則殺 人 胡麻生 爛  
○宜用苦瓠散

凍瘡 冬月凍傷成瘡 宜用 乾黃芩 末 水 調 敷  
○宜用苦瓠散

生附散 治末凍瘡 爛痛 生附子 附子  
○宜用苦瓠散

白欽散 治末凍瘡 爛痛 生附子 附子  
○宜用苦瓠散

如神散 治末凍瘡 爛痛 生附子 附子  
○宜用苦瓠散

臘享膏 治末凍瘡 爛痛 生附子 附子  
○宜用苦瓠散

湯火瘡 凡湯火燒傷 初時 強忍 痛急 向火 灸強 忍一 時  
○宜用苦瓠散

赤骨痛 凡湯火燒傷 初時 強忍 痛急 向火 灸強 忍一 時  
○宜用苦瓠散

赤骨痛 凡湯火燒傷 初時 強忍 痛急 向火 灸強 忍一 時  
○宜用苦瓠散

赤骨痛 凡湯火燒傷 初時 強忍 痛急 向火 灸強 忍一 時  
○宜用苦瓠散

赤骨痛 凡湯火燒傷 初時 強忍 痛急 向火 灸強 忍一 時  
○宜用苦瓠散

赤骨痛 凡湯火燒傷 初時 強忍 痛急 向火 灸強 忍一 時  
○宜用苦瓠散

酒調付之研○湯○湯火燒

赤石脂散 治湯火傷瘡赤石脂末調塗之○研○黃

保生救苦散 治湯火傷瘡末生麻油調塗或乾黃

黃栢散 治同上雞子殼末黃栢末調塗之○研○寒水

冰霜散 治湯火熱油所傷皮爛肉痛寒水石末新水或

四黃散 治同上大黃黃芩黃連黃栢白芩

單方 湯火瘡黃蜀葵花末水調塗之○研○或滴水

側栢葉搗爛如泥冷調塗以帛繫定二三日愈

如泥付之○白蜜塗之○竹中白膜貼之日○三痛立

傷及熱油○白蜜塗之○竹中白膜貼之日○三痛立

無痕豆醬汁○醋泥付之○

飛花瘡 翻出一肉突如齒或蛇形長數寸雄黃末

漸復腫毒將盡時塗之則肉自入否則雖入復

出若誤用鐵刀蝕灸必危慎之○中品錢子專

治翻花瘡○刀蝕灸必危慎之○中品錢子專

花麝香五分錢輕粉二錢半朱砂一錢黃大每服七分

生麝香五分錢輕粉二錢半朱砂一錢黃大每服七分

酒至丸溫

中品錢子 專治翻花瘡及瘦瘤白礬三兩八錢半乳

淡靛砂五分熟末麪糊和勻捻作錢子量瘡黑烟止用

單方 乾○翻花瘡馬齒煎作膏塗之○

乾○翻花瘡馬齒煎作膏塗之○

乾○翻花瘡馬齒煎作膏塗之○

乾○翻花瘡馬齒煎作膏塗之○

乾○翻花瘡馬齒煎作膏塗之○

乾○翻花瘡馬齒煎作膏塗之○

乾○翻花瘡馬齒煎作膏塗之○

漆瘡

入有惡者因見漆中毒生瘡面痒而腫遍身  
痛生蟹取黃塗之見漆中毒生瘡面痒而腫遍身  
茶末油調付柳枝葉煎湯洗即愈  
之針鐵漿頻洗即愈  
川椒煎湯洗之即愈  
○雞子黃塗之即愈  
○韭葉研付之即愈  
○紫蘇葉可搗

軟瘡

內有膿血也世謂之熟瘡大如酸棗或如豆色赤而  
爛擦之  
雞抱卵殼燒灰入輕粉以稠麪糊塗四唇覆貼瘡  
殼一枚去穢磨令入口平以稠麪糊塗四唇覆貼瘡  
出甚妙破膿

猪頭散

治軟瘡愈而復作野蜂房二三箇燒為末另  
用巴豆肉三七粒清油煎三沸去豆取油調  
治疥癩之病有效人以此猪頭為末調付亦  
效此方療疥癩之病有效人以此猪頭為末調付亦

三物散

治猪頭瘡上毛猫頭上毛各燒存性各一撮鼠  
妙治猪頭瘡上毛猫頭上毛各燒存性各一撮鼠

大黃膏

治軟瘡以生地黄括當歸各等分  
右為末以生地黄括當歸各等分

有名無名諸惡瘡

瘡火斑瘡此皆有名瘡也  
○又有洗瘡法殺虫法生肌法諸瘡中風水作

蒲萄瘡

瘡頭如蒲萄色四圍腫起先追  
膿盡次用米梅卷之神愈

天行斑瘡

人身發不治則行斑瘡一身周匝如火瘡皆  
白藥不發不治則行斑瘡一身周匝如火瘡皆

月蝕瘡

小兒多有之生耳後隨月盛衰胡粉炒黃枯  
白礬黃丹黃連輕粉各二錢乾腦脂一錢麝

凡諸無名惡瘡切切調  
蜜付之極妙

香少許黃連末行之以調  
○又黃連末行之以調

**內疔瘡** 生於口以上腭初發如蓮花根帶小而下垂乃以雜黃輕粉以霜白芷合一兩時許瘡癢定合口

**癩瘡** 生肌散付之門膜 枕支其牙頰間 母使口芷白合一兩時許瘡癢定合口

**走皮癰瘡** 先用桑項發如豆梅蔓延兩耳流汁 化入前藥末攪煎成膏塗之

**黃連性黃** 少許煎湯洗之 黃連性黃少許煎湯洗之 黃連性黃少許煎湯洗之

**蛇纏瘡** 頭上灸之雄黃末醋調付之又酒調服之

**魚目瘡** 遍身生瘡如魚目無膿又名征虜瘡 九疔是身生瘡狀如蛇頭取蟬 魚目瘡遍身生瘡如魚目無膿又名征虜瘡

**熱毒瘡** 遍身生瘡如魚目無膿又名征虜瘡 宜其瘡如失應手神驗 宜其瘡如失應手神驗

**火斑瘡** 入常近火則多生火斑瘡或煎湯洗亦佳 火斑瘡入常近火則多生火斑瘡或煎湯洗亦佳

**諸般惡瘡** 諸般惡瘡諸般惡瘡諸般惡瘡 諸般惡瘡諸般惡瘡諸般惡瘡

**平血飲** 治諸瘡通身發也 平血飲治諸瘡通身發也 平血飲治諸瘡通身發也

黃麥門冬煎服



涼血飲 治血熱生瘡亦芍藥黃芩川芎荆芥生芥麥  
心十葉竹葉  
十片煎服

連翹飲 治惡瘡遍身痛癢及血風瘡連翹赤芍藥當  
歸煎服

疎風解毒散 治遍身瘡癢痛白芷細辛蒺藜子炒麻  
黃橫柳當歸鬚生乾地黃川芎赤芍藥  
獨活白牽牛微炒桑白皮炒蒼朮炒枳殼甘草灸  
各七分右剉作一貼入黑豆七十粒紫蘇五葉生  
薑五分同煎服

紫雲膏 治熱毒瘡紫草葶黃連黃栢漏蘆各五錢赤  
小豆末菜豆粉各一合右為末猪脂或清油  
調日三付

葵花散 治一切熱瘡鬱金黃連黃栢梔子葵花  
各等分右為末冷水調膏貼之神效

合掌散 治遍身生瘡百藥不效搗柳五箇為末硫黃  
內油調夜用時塗外腎不得  
手但擦手令乾一二日即愈

松脂貼散 治一切惡瘡及無名瘡黃栢黃連  
取水銀一錢放如稀餚先以藥水洗瘡拭乾塗之  
藥末及清油令如稀餚先以藥水洗瘡拭乾塗之  
尤妙

二黃膏 治一切惡瘡清油三兩煎巴豆肉二兩  
末各一錢和勻成膏以藥水  
洗瘡後擦付二三神效

貝母膏 治諸惡瘡貝母三錢半夏南星  
黃一錢右為末蜜  
水調付或乾糝

金華散 治一切濕熱惡瘡亦療小兒黃丹一兩  
黃連各五錢輕粉一錢石為末藥水洗後糝

五十一

之貼

爐灰膏

治一切惡瘡除去

青金錠子

治諸惡瘡膿血不快及多年疔瘡香龍腦

一掃光

治小兒頭瘡或疹亦可細牙皂川椒各二錢

生肌散

治一切瘡口五大效寒水石煨滑石各一兩

黃蠟膏

治諸瘡能生肌香油黃蠟松脂各等分

洗藥方

治諸瘡惡瘡黃柏茵陳芥葱白藿香煎水

殺蟲方

治惡瘡有虫膽龍骨虎骨白礬露蜂房各

生肌方

治瘡口用藥直待去死肉用煨方可生好肉

諸瘡中風水發腫痛

凡瘡瘍未合風入為破傷最急宜

白桃枝柳枝川椒煎湯入

殺蟲方

治惡瘡有虫膽龍骨虎骨白礬露蜂房各

生肌方

治瘡口用藥直待去死肉用煨方可生好肉

諸瘡中風水發腫痛

凡瘡瘍未合風入為破傷最急宜

枯白

諸瘡中風水發腫痛

凡瘡瘍未合風入為破傷最急宜



慎之存性研二錢入皂角末及惡水熟痛不貼膏貼瘡  
子燒之存性研二錢入皂角末及惡水熟痛不貼膏貼瘡  
上乾○諸瘡中風水發腫痛○又方川椒一升和麥作餅  
即愈諸魚目並得乾○又方川椒一升和麥作餅

灰火煨熟斷開口封合瘡上冷則易出  
 又方桑柴灰淋汁漬之冷復易出  
 連鬚煮湯洗之或連莖葉煨研罾付  
 白鴉爛火灸令熱付瘡上以帛裹定冷  
 則易出  
 即差

**單方** 治惡瘡反諸瘡生胡麻油塗之妙  
 妙犬膽亦可瘡不差蛇蝎燒灰調付諸  
 朝生暮落花一名鬼蓋即朝菌也生糞  
 作末和油塗之甚佳牛糞上黑菌充佳  
 惡瘡癩癩十枚端午日收乾作末油調  
 猪脂療惡瘡和確黃輕粉付之妙調  
 惡瘡塗之妙瘡和確黃輕粉付之妙調  
 石灰淋取汁溫洗妙芭蕉葉為末香油  
 第一便澁出黃汁百治不連二陰患惡  
 天小便澁出黃汁百治不連二陰患惡  
 拭取馬齒寬四兩青黛一兩同研勻付瘡  
 易新者仍服八正散妙題二十日全愈  
 瘡上諸惡

瘡貝母末入雄  
 黃少許糝之

東醫寶鑑雜病篇卷之八



身目録  
卷之二

三八

