



ヤ 9
773
21





東醫寶鑑雜病篇卷之十一

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰



小兒

小兒病難治

古語曰寧醫一丈夫莫醫一婦人寧醫一壯人莫醫一小兒蓋小兒難問證難察脈治之尤難以其藏府脆嫩皮骨軟弱血氣未盛經絡為尤難息如毫府脆嫩皮骨軟弱血氣未盛經絡如絲不能指其痛易莫知非觀形察色聽聲切脈言其病源之者蓋亦寡矣虛實而能療之者蓋亦寡矣

臟腑

生成之譬及三月有白露之稱二月之胎有桃花也先生左腎則為女則先生右腎而為男陰色陽色肝生肺生心以生其腸已者腎屬水故五臟由是為陰其次心以生其腸已者腎屬水故五臟臟生胃生脾生心以生其腸已者腎屬水故五臟

小兒病難治

臟腑生成

小兒初生未經食乳取甘草一寸大上炙熟細切置地上出火毒一時許用水一盞煎至三分之去滓用新綿蘸滴兒口中令嚥盡須臾吐痰及痰血方其乳食則年長知傷無病

初生解毒法

腸屬火六府由是為陽其次三焦生一八脈八十脈生
 上二經十二經生是為陽其次三焦生一八脈八十脈生
 孫絡生三百六十五骨節生三百六十五孫絡
 目大穴鼻百散之身皆備矣則耳
 初生解毒法 嬰兒在胎口中若有惡物兒黃連甘草煎出
 汁拭去口中之惡物若未入腹中必生諸疾下則更以
 煉蜜少許調朱砂末一匙入口中必生諸疾下則更以
 生之免瘡令大飽恐成吐始根下則更以
 與之勿令大飽恐成吐始根下則更以
 甘草煎汁以綿纏子於大便謂之臍屎
 三日以來退惡物於大便謂之臍屎
 初生洗浴法 湯洗之則兒少驚骨桃枝洗用金銀器煎
 入湯中洗之即與生湯水之風俗以為小兒體
 熱或遇深浴即與生湯水之風俗以為小兒體
 內不滲或變成風搖
 可內不滲或變成風搖

初生斷臍法

臍之後五寸致病者有之其法通之於臍中與母通氣
 帶離時五寸致病者有之其法通之於臍中與母通氣
 斷壯或五寸致病者有之其法通之於臍中與母通氣
 三壯或五寸致病者有之其法通之於臍中與母通氣
 看待臍根待落去自然無事二指初生臍即將軟綿用生
 臍根待落去自然無事二指初生臍即將軟綿用生
 薑自然汁或香油後和麩臍四圍於臍頭以艾灸
 三壯謂之重臍後和麩臍四圍於臍頭以艾灸
 留二寸許以線繫定然後洗浴不
 然則濕氣入腹必作疳積然後洗浴不
 擇乳母法 凡擇乳母須精神爽慧性情和悅肌肉充
 白則可以飼兒不得與如母大段成酸鹹飲食仍忌
 纒痾寒暑來便兒得與如母大段成酸鹹飲食仍忌
 馮疳之疾如陰陽交接之際不可飲酒恐
 此正謂之交始必生癖疾○如母大段成酸鹹飲食仍忌
 兒作痰嗽驚熱昏眩之疾○如母大段成酸鹹飲食仍忌
 飲食下咽乳汁便通情慾動中乳母宜謹節飲食
 解毒洗浴新臍

乳汁必凝滯兒得此驚搖或為夜啼或為腹瀉不病
 則熱或為口糜或為驚風或為疳積或為疔瘡
 之初來其尿必甚少或便詢隨之擇治是子
 安可消患於未形也
 乳母稟賦之善惡厚薄清性之緩急骨相之堅
 脆德行受之善惡厚薄清性之緩急骨相之堅
 小兒乳哺法
 道不可不謹奪其乳恐初乳不須知飽足也
 未定乳後勿遽以乳飲之恐停滯食相併則成嘔吐
 也。乳結於腹中氣滯大抵成積成疳皆自此
 始。化結於腹中氣滯大抵成積成疳皆自此
 胃尚脆而窄一切發熱難化之物皆宜禁絕只與
 乾柿熟菜白粥非惟無病可化之養德此外生粟
 粟乾柿性涼可為養陰之助然
 小兒保護法
 凡嬰兒肌膚未實若厚衣過暖則傷皮膚
 損血嬰肌發瘡癩疥汗出膜理不閉風邪易入

寒若不致疾和暖抱人之使見風日則氣血堅剛可耐
 寒若不致疾和暖抱人之使見風日則氣血堅剛可耐
 緩弱疾易生非愛護之小兒兼左右附之可得近乳
 松弱疾易生非愛護之小兒兼左右附之可得近乳
 母之側蓋覆衣衾動之極小兒兼左右附之可得近乳
 驚疾須時時回動之極小兒兼左右附之可得近乳
 舊疾須時時回動之極小兒兼左右附之可得近乳
 則筋骨軟弱易致疾用新綿縮宜用舊者若太温
 舊疾須時時回動之極小兒兼左右附之可得近乳
 貴視家舊襖改作小兒兼左右附之可得近乳
 惟生家舊襖改作小兒兼左右附之可得近乳
 勿堅頭抑出六箇月方可與稀粥亦不可與乳同
 門喫

養子十法
 一要頭背煖
 二要心胃涼
 三要足煖
 四要物
 五要
 六要
 七要
 八要
 九要
 十要
 調護歌
 養子須調護
 看承莫縱弛
 益衣單正所宜
 損胃食
 乳○七○九○勿○服○輕○粉○末○八○啼○未○定○勿○洗○浴○飲
 乳○七○九○勿○服○輕○粉○末○八○啼○未○定○勿○洗○浴○飲

乳哺保護
 養子十法
 調護歌

風順天見日寒

變蒸候之小兒變蒸虎之俗謂之牙生骨長也如蚕之有眠龍

於血兒變蒸而使胎毒散也研五藏之變蒸者陰陽水火蒸
所由生也蓋兒生之日至三十二日一變每變蒸
畢即覺性情有異於前何者長生藏府意智故也
何謂三十二日數以應期歲以分十二經絡故初生至
九十二日一變生心腎六十四日二變生肝脾九十二日
三變生肺心包手少陽
小腸一變六十三日二變生心腎六十四日三變生肝脾
三蒸生膽二百二十五日四變生肝脾九十二日五變
日八變四蒸上六腸二百八十八日六變生肺心包手少
百二無形故不變而蒸夫十變五蒸乃天地之
數以生而成之然後始生齒能言知喜怒故始全也
太倉畢云氣入四肢長碎骨於五藏也蒸者蒸養
蒸既畢兒乃成人也變者變生於五藏也蒸者蒸養

六府也又云變者上氣蒸者體熱每經一變一蒸
輕則發熱微汗其狀似蒸者則壯熱脈亂而數或
吐或汗或煩或燥或渴或乾或燥或乾或燥或乾或燥
其候與傷寒相似但乾者則耳冷尻冷上唇中心
發宜用疔狀如魚目珠者是也治法和平之劑微表
之見或用不惺惺散防其熱則微利之宜用紫霜丸
可安投藥餌及自愈不

小兒繼病也腹大有或發或差取病如瘧他日亦相繼

身即博勞也又或以紅紗袋盛夜明砂與兒帶之
以粥飲調下五為分日病四五六次令香熟嚼灰細
效伏翼即編也輕則婦人先病令小兒黃瘦骨立
母更熱髮落千金論小兒此病是也小兒黃瘦骨立
導其腹中疔熱往來毛髮墜
微悅者利也宜服龍膽髮墜
不悅者利也宜服龍膽髮墜

變蒸候繼病

龍膽湯

赤大黃煨二錢龍膽草各一錢胡黃芩桔梗二箇右生

一作合十貼水一升煮取五合去滓一歲內兒服

相兒命長短法

過人者多夭○預知人壽○旋敏速者亦天○骨法成就威儀○轉遲舒稍費人精神○形骸者壽○初生啼聲連延○相屬者壽○稍費人精神○形骸者壽○不壽○初生啼聲連延○相屬者壽○稍費人精神○形骸者壽○脂膏常搖手足○頭毛不周○面者並不成人○無血者好○臍小者徧身軟弱○如無骨者○汗血者多厄○並不正數動者○大非佳兆○早坐早行○早齒○目視不正○數動者○大非佳兆○早坐早行○早齒○上語皆惡○性非佳○或早貴○初生枕骨不聽人語○有旋毛○妨父母○或早貴○初生枕骨不聽人語○而死○連骨不成能行○而死○肉者死○人中深長者壽○身不收者死○股間無生肉者死○人中深

虎口三關脈法

效得死

五歲六歲曰細○小兒三歲至半歲看額脈一歲童子女右手次指○有紅紋似線者為驗○第一節名曰氣關○脈見則病極○九死一生○若直射三關○名曰命關○脈見則病第一節○乃飛禽內外人驚赤紋微者火驚○黑紋水驚○青紋乃雷四足驚○內隱青紋微乃屈則○是急風候○青紋乃第二節○紫紋乃驚疳○青紋微乃屈則○難安○白○第三節○青黑傳肺黃色紋乃驚疳○青紋微乃屈則○治○紅○黑○安○紅○不可治○紫○歌曰○紫風紅傷寒青驚白至純黑則不可治○紫歌曰

三關圖




三關在虎口次指
之側第一風關第
二氣關第三命關
也決病輕重死生

小兒脈法

小兒三歲至五歲以一指按掌後人迎氣口之脈常以一指按掌後人迎氣口之脈
八歲以二指按掌後人迎氣口之脈常以二指按掌後人迎氣口之脈
一息以四指按掌後人迎氣口之脈常以四指按掌後人迎氣口之脈
為平息和八九至為常平十至為小兒之脈以四指按掌後人迎氣口之脈
亂不須治藥淨為風○弦急氣不和○沉緩傷食○
促急虛驚○浮細為冷○浮緩傷風○
洪緊傷寒數則為熱遲則為寒門

觀形察色圖



額上屬心穴居南
左頰屬肝木居東
鼻準屬脾土居中
右頰屬肺金居西
額下屬腎子居北

左頰為肝右頰為肺天庭為心地閣為腎準頭為
凡五岳赤者皆熱淡白者皆虛○天庭為火色
紅主大熱青乃肝風○印堂連準頭紅者人驚紅白者水
火驚紅者痰熱○印堂○印堂黃者無病○脾應唇
印堂○鼻居面中為小腸熱山根至鼻柱紅者心
胃主○鼻居面中為小腸熱山根至鼻柱紅者心
紅主死○鼻居面中為小腸熱山根至鼻柱紅者心
馮主死○鼻居面中為小腸熱山根至鼻柱紅者心
黃色傷食吐利○太陽青驚重紅色風搖眼目黑
青色乳積○太陽青驚重紅色風搖眼目黑

診脈法

觀形察色圖

者死○地閣為腎色青食時驚或煩躁夜啼黃多
吐逆紅者腎中氣病兩頰赤者肺熱○山根青黑
頰色夜啼必死傷飲食○中庭黑色吐瀉黃空印堂額
角方廣皆命門部位青黑
為驚風惡候亦忌損陷

面上形證歌
明知兩度驚赤黑困
○微燥熱黑青知是
頻驚恚奈何紅赤為風抽眼○右邊青脈不須多有則

五體以頭為尊一面惟神可恃
目睛或外若昏困而神藏於內不脫者生黑睛珠滿
者死無鋒芒如魚而神藏於內不脫者生黑睛珠滿
病睛明者少病眼白多睛紅者心虛熱青者肝弱多
淡者肝虛白而混者肺熱也

者腎虛白而混者肺熱也
者死無鋒芒如魚而神藏於內不脫者生黑睛珠滿
病睛明者少病眼白多睛紅者心虛熱青者肝弱多
淡者肝虛白而混者肺熱也

聲有輕重啼有乾濕
神驚也聲塞者痰也聲戰者寒也聲欲狂也聲急者
也常者氣促也噴嚏者傷風也驚也驚也驚也驚也驚也

夜半發者多有口瘡宜看之
者易治聲沉不響者難痊或聲如鴉中驚帝聲浮
者○直聲往來而無淚者是痛也連聲不絕而多痰
者是驚也慈煎聲煩躁者難愈躁促聲音者感寒

小兒初生救急
小兒初生救急
小兒初生救急
小兒初生救急

噤口撮口臍風證
皆通此胎中熱毒流於心脾如鴉一名鴉口瘡○鴉口
瘡小兒初生有白屑滿口如鴉之口鼻外亦有口
能吮乳由心脾熱也亂髮纏指○頭髮散○又法用一荷汁
淨如不脫用保命散散朱花水搽○又法用一荷汁
散又亂髮纏指○頭髮散○又法用一荷汁
汁又亂髮纏指○頭髮散○又法用一荷汁

面形證頭面
噤口撮口臍風證
噤口撮口臍風證
噤口撮口臍風證

撮

水塗之妙取此神效又白揚
 樹枝取面黃赤氣常帶白
 則者強唇青撮口聚飲有乃
 撮者初末一蜜調付口聚飲
 撮如囊而初生一臘內之疾
 撮調和時抹口也宣風惡候
 合調和時抹口也宣風惡候
 急若○口初生七日內水撮
 兒齒○初生七日內水撮
 輕齒○初生七日內水撮
 董不輕兒急證合撮撮
 汁開輕兒急證合撮撮
 以指南星末一開小泡子
 小兒面赤端急為風濕所乘
 風小兒面赤端急為風濕所乘
 齋者小兒面赤端急為風濕所乘
 日齋者小兒面赤端急為風濕所乘
 氣齋者小兒面赤端急為風濕所乘
 在齋者小兒面赤端急為風濕所乘

濟腫

凡腫者黑瓜○見此證手足蹇者
 亦口齊黑瓜○見此證手足蹇者
 治亦口齊黑瓜○見此證手足蹇者

保命散

治方通心炙過候指甲洗淨後取蔥葉火
 便消方服四肢不和腫後為水濕所傷或入
 風冷致令肢不和腫後為水濕所傷或入
 墨散五通膏香末乾蝦蟆中灰油髮水皆付之
 痛當歸白石脂末乾蝦蟆中灰油髮水皆付之
 歸○斷○可○糝○上○或○油○調○付○之○妙○

朱礬散

治細末付口砂白礬三錢右等分
 日調塗舌上即效內為末取一字用白鵝糞搗水
 調塗舌上即效內為末取一字用白鵝糞搗水

一捻金散

治細末付口砂白礬三錢右等分
 治細末付口砂白礬三錢右等分

蝎梢散

治撮口風及一切胎風
每治撮口風及一切胎風
炒以薄粉乾酥為度再入白蠟
炒乾入腦麝各少許右為細末
調勻以紫蘇雞肝

宣風散

治膈風撮口多啼不乳
一箇全者酒炙為末入麝香末
器煎湯調下金銀

調氣益黃散

治紫口撮口膈風三證
一箇全者酒炙為末入麝香末
器煎湯調下金銀

金烏散

治膈風金頭赤脚蜈蚣
三箇生麝香少許右為末
每取半字以金銀

通心飲

治旋螺風赤腫而痛清心
連翹木通瞿麥施子仁黃芩
甘草各四分右

栢墨散

治膈風各腫多啼不能
亂髮尺各等分為末乾
或油調付之

五通膏

治膈風撮口生地黃生薑
肉右共搗爛搽臍上四圍
一葱白蘿菹子田螺

香螺膏

治膈風腫硬如盤田螺
右搗爛搽臍上四圍
一葱白蘿菹子田螺

客忤中惡

客忤中惡識見之者小兒
忤也故謂之客忤其狀或
鮮雜面變五冬冬腹痛反
上竄耳其口以指懸左
之却服蘓合香元散
確麝散無用黃元散
刺痛問亂欲死人中
皂角末吹鼻無用辟邪膏
又服蘇合香元末
錢刺貴之或以指懸左
鮮雜面變五冬冬腹痛反
忤也故謂之客忤其狀或
客忤中惡識見之者小兒

客忤中惡

皂角末吹鼻無用辟邪膏

又

錢

研和醋一合服之即差
擣烏丸雞子大摩兒額上及足心各取五六遍水
中馬汗氣或馬鳴驚炸取馬尾燒烟熏兒面以
為度

雄麝散 治客忤 刺黃一錢乳香五調灌之仍以母衣覆

愈兒身即

黃土散 治小兒卒客忤 竈心黃土及五心良藥

辟邪膏 治小兒惡降真香白膠香沉香虎頭骨人

夜啼 湯化麝香一錢煉蜜和司帶膏取少許以乳香

足冷腹亦冷曲腰而啼又曰下青白口有冷氣手
陰盛寒則亦冷痛所以夜半後啼也宜用六神散益

黃散防見熱則心燥而帶赤小便赤有汗中熱
腹面赤身熱者必痰熱也到曉方息導赤散則
加黃芩煎服通心飲身亦微熱急取燈照口
乳不瘡則舌上必重也照口瘡重舌類治之其
若無瘡則必重也照口瘡重舌類治之其
有日客忤者必犯昏前夜或甚者乃客忤中惡也
錢氏安神丸胎中之受驚所致宜用乳膏鎮驚散
啼驚者乃胎中之受驚所致宜用乳膏鎮驚散
有痰者宜龍丸散見黃連小兒夜啼作心經有熱不
虛治之宜龍丸散見黃連小兒夜啼作心經有熱不
止脚腕又法潛取雞窠草一握置小兒卧席下即
胎毒胎驚皆從內多啼者吉胎熱
六神散 治腹痛山藥炒各一錢甘草芍豆炒各二錢
末每取一錢入薑
三棗二水煎服

夜啼

猪乳膏

治胎驚夜啼琥珀防風各一錢

鎮驚散

治同上朱砂調稀入香各少許

燈心散

治小兒心燥夜啼燈心花三四日

黃連飲

治心經有熱夜啼人參二錢黃連一錢

蟬花散

治少兒夜啼薄荷湯入酒少許調下

五臟所主虛實證

後虛則補其母實則瀉其子

心主驚

實則叫哭發熱飲水而搐

肝主風

實則目直視大叫凡目青必發

脾主困

實則困身熱飲水困倦困睡

肺主渴

實則飲水或泄瀉赤黃色睡露

腎主瀉

實則瀉白赤色睡露或黃散

五臟所主虛實證

虛則補實則瀉

心主驚

實則叫哭發熱飲水而搐

肝主風

實則目直視大叫凡目青必發

脾主困

實則困身熱飲水困倦困睡

肺主渴

實則飲水或泄瀉赤黃色睡露

腎主瀉

實則瀉白赤色睡露或黃散

五臟所主虛實證

虛則補實則瀉

五臟所主虛實證

肺主喘實則悶亂喘促實飲水者有不飲水者渴宜瀉

白散出氣短虛則喘而氣短先服益散

後用阿膠散散之若喘則氣促則氣者難治肺虛

損故也○脾不能相營故曰怯此以唇診肺之法也

唇白也者肺藏怯也

腎主虛證者兒本虛怯由胎氣不感則神氣不足目

中過八八之數解顯開面色慾則不及四旬而亡或有

骨重而致墜下而身非也類也○腎不足下竄蓋

明皆宜補腎六味逆人地黃元主之助無實但小兒瘡

下竄足熱下竄者骨重惟欲墜下而縮身也足熱

者不喜覆衣也○心氣熱則黃元竄宜

五臟相乘凡五藏自病者為正邪乘母妻為微邪

乘妻為賊邪必先治肺乘者猶乘車之乘五藏相

而調之餘藏為虛邪○從前乘者為實邪為微邪

脚○後乘者為虛邪○從前乘者為實邪為微邪

病○後乘者為虛邪○從前乘者為實邪為微邪

則伏於脾火結滯則為癩釣或為咳則為急驚或

成則瘵瘵火結滯則為癩釣或為咳則為急驚或

則為瀉血藥為使古方保元湯加白芍藥為慢驚

也○養血藥為使古方保元湯加白芍藥為慢驚

驚風證以其急病反慢驚風與夫痘疹等證最為驚風

越發則為癩乃惡證也○小兒疾之最危者異醫無

驚風證以其急病反慢驚風與夫痘疹等證最為驚風

驚風先見之證

驚風先見之證 驚者虛怯 漸而生風 怯神 散痰 涎來 去其
 則面紅 臉赤 楊邪 入腎 則面黑 惡肝 則面青 俱青
 眼睛 竄視 則面黃 嘔吐 不食 喘息 兒欲 驚邪 入脾 則
 驚邪 入肺 則面色 淡白 喘息 凡乳 兒欲 驚邪 入脾 則
 面色 淡黃 嘔吐 不食 喘息 凡乳 兒欲 驚邪 入脾 則
 神志 不定 恍惚 懼人 如尋 常皆 驚風 先證 也 握
 拳 悶鬱 努氣 情態 不舒 尋常 皆驚 風先 證也 握
 咬 牙甚 者發 驚○ 目直 視而 色青 身反 折者 生驚
 ○ 呵欠 甚者 發驚 ○ 目直 視而 色青 身反 折者 生驚
 赤 無青 者發 驚○ 肝 有風 目連 割手 尋衣 領亂 捻目
 直 視必 發驚 ○ 肝 有風 目連 割手 尋衣 領亂 捻目
 視 亦不 搖得 心熱 則搖 割手 尋衣 領亂 捻目
 目 亦不 搖得 心熱 則搖 割手 尋衣 領亂 捻目
 任 故目 連割 也若 熱入 於目 左右 如風 吹動 而不 定於 頭
 不 能轉 視故 目直 視也 若得 心熱 則搖 割手 尋衣 領亂 捻目
 有 實熱 而火 相搏 故也 錢氏 曰肝 心火 二藏 交爭 而
 動 心熱 而火 相搏 故也 錢氏 曰肝 心火 二藏 交爭 而
 也 致搖 也 錢氏 曰肝 心火 二藏 交爭 而

驚有四證八候

驚有四證八候 痰盛者驚 驚風 痰熱 也小兒 熱盛 則牙 關緊
 急 而八 候生 焉植 ○ 其 肝主 風其 脾主 痰其 肺作
 熱 其心 發驚 四證 相臨 重者 先發 其脾 ○ 八候 其肺 一
 搖 二縮 三掣 四顛 五反 六引 七寬 八視 ○ 八候 其肺 一
 手 伸縮 掣者 十指 開合 掣者 勢如 相撲 顛者 頭者 偏
 不 正者 睛露 不仰 活植 ○ 引者 臂若 開弓 竄者 目直 似
 怒 視者 十指 握在 外為 順之 不己 即成 握者 臂肘 縮者 似
 二 指其 指握 在開 外為 順之 不己 即成 握者 臂肘 縮者 似
 三 掣者 指握 在開 外為 順之 不己 即成 握者 臂肘 縮者 似
 脚 或頭 或肩 膊握 體動 身跳 起者 身顛 者或 手或
 引 者以 手有 如挽 弓狀 男左 手直 右者 身顛 者或 手或
 直 左曲 為逆 女子 反看 之○ 七 竄者 眼上 竄者 八視 者
 男 子斜 目視 左為 順視 右為 逆視 女 子看 之○ 八 視者
 驚 風大 抵熱 論虛 實證 別逆 順治 有後 先蓋 虛實 熱為 急
 驚 風以 寒慢 驚屬 陰用 藥以 溫甚 不爾 急驚 屬陽 無別

驚風先見之證

東醫寶鑑卷之二

故曰男熱論虛實者此也
右○男握左視指出女握
左○男握右視指出女握
者但曲凡此皆順引之手
入裏者順出外無聲逆
逆順者此也○熱盛逆
盛發者治此也○熱盛逆
豁一痰或有遺必先於熱
理○痰或有遺必先於熱
○凡搖痰因氣鬱荷湯入
合○凡搖痰因氣鬱荷湯入
門○

驚搖之證有五
驚搖之證有五
驚搖之證有五
驚搖之證有五
驚搖之證有五

黃元治肝馬青丸○
在早晨寅卯辰時者
角地又張醒為吐沫者
解引又張醒為吐沫者
黃元治肝馬青丸○

驚心九時也見當補
驚心九時也見當補
驚心九時也見當補
驚心九時也見當補
驚心九時也見當補

搐搦瘈瘲輕重
搐搦瘈瘲輕重
搐搦瘈瘲輕重
搐搦瘈瘲輕重
搐搦瘈瘲輕重

者傷風冷蓋氣出熱未實不能勝任乃發搐也
者傷風冷蓋氣出熱未實不能勝任乃發搐也
者傷風冷蓋氣出熱未實不能勝任乃發搐也
者傷風冷蓋氣出熱未實不能勝任乃發搐也
者傷風冷蓋氣出熱未實不能勝任乃發搐也

驚搖之證
驚搖之證
驚搖之證
驚搖之證
驚搖之證

生風或因驚而起即潮搐搦身與口中氣皆熱
 及安寧筋脈抽搐急驚乃卒然得之心受驚肝主
 神致筋脈抽搐急驚乃卒然得之心受驚肝主
 涼驚元大青膏以熱氣關急驚者因潮常之聲或遇
 禽獸之吼以致牙關緊急紅熱便黃赤其脈浮
 數顛動口內有實熱外候風邪小黃赤其脈浮
 驚肝家生風而發搐肝風心火二藏交爭血氣積
 併痰涎壅塞所以百脈凝滯關竅不通風氣蓄盛
 而無所泄故暴烈也慎一泄已後急須和胃鎮心
 痰其熱尚作則當下之
 ○截風定搐先與開關散驚散次與驅風膏鎮
 心九鎮肝九錢氏安神九鎮驚九保幼化風丹靈
 神膏痰盛宜抱龍丸截風九鎮驚九保幼化風丹靈
 心九鎮肝九錢氏安神九鎮驚九保幼化風丹靈
 虛則溫之實則和之熱則涼之是謂活法也
 風形證不明若言陰證則身之是謂活法也
 元小驚元蟬乃陰急驚元不當定搐風也風由熱

也搖既心作方可下熱退驚熱若不驚亦不散
 ○急驚截風定搐為要風搐既定次與下熱散
 則無風散
 則不搐散

利驚丸 治急驚 黑頭赤口 中氣熱大 小便黃赤 宜
 一錢 用一末 蜜九 晚豆 大錢 天竺 黃青 黛輕 粉各

溫驚丸 治急驚 虛證 牛膽 化下 錢星 四兩 竺黃 一兩 未
 歲兒 用一末 蜜九 晚豆 大錢 天竺 黃青 黛輕 粉各

化汁和九 實大粉 紅糖 九錢 水
 涼驚丸 治急驚 風黃 連一兩 草龍 膽防 風青 黛各 三
 和九 粟米 大湯 取二

瀉青丸 治肝熱急驚 搦而風自退 餅
 元綠 肝主 風宜 先涼 肝而 風自 退餅

大青膏 治急驚 風宜 用此 發散 稍各 半錢 朱砂 天竺
 青黛 各一錢 烏蛇 肉竭 稍各 半錢 朱砂 天竺

五驚風

黃麝香各一字右細末生蜜和成膏月內兒瘦米
大半歲兒半皂子大一歲兒一皂子大以薄荷竹
葉煎湯化下

開關散 治驚風中藥不開蜈蚣一條灸白蠟
性右為末以手點薑汁蘸藥少許擦牙或用
物引滴入藥三兩點於口中涎出自開

寧驚散 治急驚慢驚昏迷不省半夏生一錢皂角
半錢右為末取豆許吹入鼻中即醒

驅風膏 治肝風發驚搐及胎風辰砂蝎梢當歸草龍
膽川芎施子大黃羌活防風甘草各一錢右

鎮心丸 治急驚風安心止驚散邪涼膈山藥白茯苓
為末入麝香少許砂糖和丸
大每丸一薄荷竹葉蜜湯化下

鎮肝丸 治急驚風熱天竺黃生乾地黃當歸竹葉草
末蜜和每一錢人參二錢半龍腦麝香各五分右為

錢氏安神丸 治急驚風及心熱驚啼麥門冬馬牙硝
三錢龍腦一字右為末蜜和兩作

鎮驚丸 治急驚風鎮驚寧神退熱化痰
黃二錢真珠三一錢麝香半錢金箔十片右為末
糊和丸梧子大金箔為衣薄荷薑蜜湯下

保幼化風丹 治驚風白附子各一兩驚熱南星半
末裝入臘月黃朱砂鵬砂煨乾各一錢出
一兩八雄黃朱砂鵬砂煨乾各一錢出

靈神膏 赤茯苓神朱砂各一兩麥門冬五錢麝香二錢
荷湯化下神效無數如小兒驚搐多長熱證不宜

急驚風

急驚風

急驚風

急驚風

急驚風

便用驚風藥只以導赤散其功觀便加防風竹葉同煎

抱龍丸治驚風潮搐身熱昏睡無膽星則只取生肝

對炒熟用之末煮甘草和藥木佳服五歲兒一

溫服臘雪水煮日內兒和藥木佳服五歲兒一

心藏神肝藏魂神既安則何生明

截風丸治驚風白痰搖子防風朱砂全蝎各一錢麝香

每字九薄荷湯化下梧子大

金箔鎮心丸治驚風鎮心安心神全蝎七箇以薄荷葉

茯苓犀角朱砂麝香甘草各一錢薄荷湯化下

寧心膏治小兒不疔惚不寧恐畏多尺睡中驚魘

甘草各一錢龍腦麝香各一字九切末

防風溫膽湯治驚風消痰疎風順氣半夏枳殼赤茯苓

分二葉煎水調下大驚元小驚元服之

大驚元治驚風安神定驚又治心熱夜啼酸棗仁去

朱砂麥門冬木香代赭石醋煮各二錢半白僵蚕

小驚元治驚風龍膽各二錢半全蝎黃連馬牙硝末香

銀箔和丸梧子大以雄黃朱砂麝香金

急驚風不治證眼睛翻轉口中出血兩足攞跳下通關

不疔者皆不治

急驚不治證

慢驚風

慢驚風藥其證者得於大病之餘吐瀉之後及過服寒涼
散加身四肢冷厥不仁煎服其脈沉遲者因吐瀉日久
中氣太虛而得身冷身瘦鼻中氣虛則生風盛
昏睡露睛目上視手足瘦弱蓋脾氣虛則生風盛
則筋急宜用黃芪湯溫白丸
驚陽證傳來繞經吐瀉便是慢驚男子以瀉得之急
為重女以吐瀉或合似慢驚者眼半開半合
似睡不睡十指或開或合似慢驚者眼半開半合
時牽掣脈或浮或不乳身或涼或熱或吐瀉或不
吐瀉或食乳或不乳身或涼或熱或吐瀉或不
者宜加味木附湯醒脾散養乳方虛痰多宜
仙散○方傳慢驚純陰證宜烏蝎散陽證尚宜
截風調胃用蟬而散尚醒脾散若手足冷方與
陽用硫黃附子如腦麝粉巴硝葷一切禁斷
○古云病家怕瀉若更治凡則驚風念甚慎
瀉青不止宜死慢驚瀉蓋瀉青色者乃天驚木剋土也

白木散

○凡兒瀉出青色者由脾土受肝木剋勝而見本
質由利其藏之虛寒黃芪益黃散主之○小兒慢驚
或吐利來復丹變成虛風搖擺者非飲送下胃氣欲絕
故也○用藥宜用溫補丸神效散觀音散全蝎觀音散
○三味天藥子散補脾九湯深生丹參木觀音散
湯防風元銀雙金九南星飲宜
奪命散見雙金九南星飲宜
白木散治吐瀉日久不止津液枯竭煩渴引飲欲成
香甘草各一錢右倉末每二錢水煎加天麻細辛
馮加山藥白扁豆肉豆蔻己成慢驚加天麻細辛
全蝎白附子○驚風足飲之彌多彌好○內耗也
問陰陽多煎滿意取足飲之彌多彌好○內耗也
氏白木散錢效得
一名清寧散效得
益黃散治慢驚風黃芪二錢人參陳皮各一錢白芍
黃連七分生甘草二錢煎時服○五分白芍益黃
散凡驚兒瀉青色大禁涼驚丸蓋風木旺剋益黃

慢驚風

益黃散

益黃散

補土當先實其土後瀉其木也當於心經中以酸涼
使脾土中虛矣脾土中瀉火以甘寒補金以酸涼
則風木自虛矣

黃芪湯 治慢驚風大便泄青色黃芪二錢人參一錢
甘草炙五分右作一貼水煎服加白芍藥一錢

後瀉其木是為神風治之法必剋脾土保元湯其土
錢左妙木是為神風治之法必剋脾土保元湯其土

溫白丸 治天麻生風五錢全蝎炒白附子生南星炮和丸
兩錢全蝎炒白附子生南星炮和丸

加味木附湯 治吐瀉後變成慢驚或因藏寒洞泄得
木香甘草炙各五錢右煎服

醒脾散 治脾困昏沉吐瀉不止漸成慢驚人參白朮
白茯苓白朮白朮白朮白朮白朮白朮白朮白朮白朮

釀乳方 治慢驚風人參木香藿香沉香陳皮薑五片
紫菀五片即仰臥霎時次令兒食後須去乳汁盡方

八仙散 治慢驚風天麻白附子白朮各二分半加川烏一
分五釀荷二葉同煎服

烏蝎散 治慢驚純陰證吐瀉不止四君子湯加
煎服

蟬蝎散 治慢驚風陽證尚在宜用此藥全蝎七箇蟬退
二錢入薑三片棗

神效散 治慢驚風歌曰一味俱為末男用男左手辰
砂一點血○右三味俱為末男用男左手辰

指血末用女右手中指
蘸藥末擦兒唇上即愈

觀音散 治慢驚人多瀉不思乳食精神昏困四肢白茯苓

全蝎觀音散 治吐瀉後成慢驚風亦治慢脾風

三味天漿子散 治慢驚風每字薄荷湯調下

補脾湯 治慢驚風白茯苓半夏各七分陳皮炒各五分黃連

保生丹 治慢驚風朱砂天麻白附子炮黃麝香各一錢

延生丹 治同上海星炮二錢半朱砂牛黃羌活各一枚

薄荷湯 化肉丸服之值豆大

參朮半夏湯 治慢驚風子母俱服

防風元 治慢驚風天麻三分煎服

銀白散 治慢驚風附子炮入參天麻全蝎炒香

南星飲 治慢驚風白扁豆薑汁炒各三錢

雙金丸 治吐瀉日久脾胃虛損手足厥冷精神昏塞

慢驚風 雙金丸 治吐瀉日久脾胃虛損手足厥冷精神昏塞

之與青州白元子等分同研生薑末飲調灌
服九方驗中云一金液丹治吐利垂絕服之得活
驚風治驗一候昏睡露睛手足痠癢而身虛冷
便與瓜蒌湯利其錢曰不開利而身虛利之必
則二胃果虛冷身錢曰不能食而胃虛利之必
難飲也後用益黃散功觀使君子丸材觀四服
藥利小便致致元腎一月而痊聲音如故
用六味地黃元腎一月而痊聲音如故

驚風治驗

驚風治驗一候昏睡露睛手足痠癢而身虛冷
便與瓜蒌湯利其錢曰不開利而身虛利之必
則二胃果虛冷身錢曰不能食而胃虛利之必
難飲也後用益黃散功觀使君子丸材觀四服
藥利小便致致元腎一月而痊聲音如故
用六味地黃元腎一月而痊聲音如故

慢驚風不治證

慢驚風不治證胃弱驚四股厥冷吐瀉咳嗽面黯神慘
一搖頭眼睛不轉涎鳴喘噎似搐而不甚搐似睡而
精神如慢四股與口中氣皆冷中露睛或胃痛而
啼哭如鴉聲此證已危蓋脾胃虛損故也

驚欲絕之時虛痰上攻咽喉引氣呼吸危大脈來
浮數是謂陰盛強陽錯認以為陽氣已復直與峻
藥下痰痰隨藥下氣隨痰絕人亦無生意矣此
不識覆燈將絕之作雖不下藥亦無生意矣此

急慢驚風通治

急慢驚風通治宜備急丸牛黃抱龍丸保命丹至聖保
備急丸少去泥焙乾為末加朱砂等分糊丸菜豆大
中鎔之看取急跳者治急驚慢跳者治慢驚各另
研器貯之朱砂末用之妙明分

牛黃抱龍丸治急慢驚風痰嗽潮搐能鎮驚安神
二錢半麝香真珠琥珀各一錢牛黃五分金箔十
片右細末水煎甘草膏和丸芡實大金箔為衣每
湯化下服一丸五歲二丸十歲三丸五歲薄荷

保命丹

保命丹治急慢驚風尚有陽證者常服安神化痰
竭十四箇防風南星蟬退白僵蚕天麻琥珀
驚風治驗一候昏睡露睛手足痠癢而身虛冷
便與瓜蒌湯利其錢曰不開利而身虛利之必
則二胃果虛冷身錢曰不能食而胃虛利之必
難飲也後用益黃散功觀使君子丸材觀四服
藥利小便致致元腎一月而痊聲音如故
用六味地黃元腎一月而痊聲音如故

驚風治驗

驚風治驗

二十一

驚風治驗

各二錢白附子辰砂各一錢麝香五分有熟加牛
黃片腦各五分右為未粳米飯搗丸鬼子大金箔
湯化乳汁或薄荷

千金散 治急慢驚風痰喘雖至死但灌藥下咽即活
牛膽南星甘草各二分牛黃龍腦各六釐
右為末每用五七釐薄荷燈心湯調下

星香散 治急慢驚風搖擗竄視涎潮南星炮二錢
木香補紅各一錢全蝎二箇石到作一貼薑
四片水煎類灌大
便去涎即愈

朱粉散 治急慢驚風歌曰一粒朱砂一后雪
七箇蠶三箇蠍不問驚風與慢風脈時須
同砂粉研為細末却以母乳汁調抹於兒口內立
效

奪命散 大能控風痰不問急慢驚風痰塞咽喉其響
如潮名曰潮涎百藥不能過咽命在須臾但

用此藥入喉痰則墜下功有萬全奪天地之造化
也青礞石一兩同煅硝一兩入鍋內火煅待硝盡
候礞石如金色取用右細末急驚風身熱用薄荷
汁入蜜調微溫服其藥自裏痰墜下從大便出如
稠涕極危者用此藥以青州白元子再研為末薑
汁調煎如糊熟調下其涎即墜入腹次服蛇蝎
蜈蚣水吐痰水上以藥少許利痰之痰隨藥而下須
器盛水吐痰水上以藥少許利痰之痰隨藥而下須
用木香湯調下以藥少許利痰之痰隨藥而下須
以木香佐之能裏痰從大便出而
無糞來不動藏府始知藥妙門

探生散 治急慢驚風諸藥不效用此吹鼻定其死
雄黃沒藥各一錢乳香五分麝香一字右為
末吹少許入鼻如眼淚

至聖保命丹 治急慢驚風及胎驚天吊南星炮三錢
各二錢麝香半錢全蝎十四箇右為末飯
梧子大朱砂為末每丸薄荷湯化下

急慢驚通治

慢脾風

慢脾風處惟脾風所由慢驚後吐瀉損脾病傳已極總歸虛
療驚則無驚可療但脾間痰涎凝滯虛熱往來其
眼合者乃脾因氣乏神迷也世所謂慢風難療者
是也植○若見眼合即是脾風○慢驚察視為要
眼睛昏定為重竄視為重四肢厥冷為重清定不
眩為重黯色至重眼在顧亦重汗出如流亦重口
忽作驚黯色至重眼在顧亦重汗出如流亦重口
所盛傳入藏○間陽氣已虧脾經屬陰次第入脾故
言慢脾風候○慢驚其眼半開半合則當預作慢
脾風調理之○慢脾風之候面青額汗舌短頭低
眼合不開瞬中搖頭吐舌頻嘔腥臭紫口咬牙手
足微搖而不收或身冷或身溫而四肢冷其脈沉
微陰氣極盛胃氣極虛十救一二蓋由慢驚風而
皆可慎宜用黑附湯救之又生附已也其危如燈附散
油漸見昏減錢氏用金液丹與青州白元子各半
研勻飯飲薄荷湯下一錢半此截風回陽也○半
小兒頭熱珠青白而足冷○頭熱或腹脹
而足冷○頭熱珠青白而足冷○頭熱或腹脹

吐而足冷○頭熱珠青白而足冷○頭熱或腹脹
者名曰慢脾風速與補脾益真湯加全蝎一枚或
全蝎觀音散

黑附湯

治慢脾風危急者附子炮三錢木香一錢半
白附子一錢甘草炙半錢右坐分二錢入薑

生附四君子湯

治慢脾助胃回陽四君子湯料加生
附子末等分右坐二錢入薑五片水

蝎附散

治慢脾風回陽益痰附子炮二錢南星炮白
附子炮木香各一錢金竭七箇右剉取一錢

補脾益真湯

治慢脾風丁香木香訶子皮陳皮厚朴
草果肉豆蔻白茯苓人參白朮桂枝半
夏附子炮甘草煎服訖令揉心下以助藥力

慢脾風不治證

身冷頭汗直如尸喘喉頭軟背直
如牽錮之聲者不治指甲黑四肢垂
下藥不須慎

天吊驚風

孫真人曰乘馬遠行當不浴更衣然後方可
近於嬰兒不則多為天吊急驚之疾錢仲陽
曰步履驚穢之氣無使近於嬰兒急驚風
也驚風則無也驚風之證但天吊發時頭目仰視
神崇頭目無也仰視手足抽掣如魚之動此由乳母
過食熱毒心肺生熱加以外感風邪所致宜用九
龍控涎散散約有驚風熱則保命丹痰盛則抱龍丸
見功控涎散又有驚風內釣之證腹痛疔疳青唇
紅筋區傳反張外腎腫尿如釣之證腹痛疔疳青唇
九龍控涎散治天吊蜈蚣一條酒塗灸臘茶葉黃甘

釣藤散

治同上人參犀角各五分全蝎天麻各二分
甘草一分右剉水煎服門一名釣藤飲有
味釣藤一

釣藤膏

治驚風內釣木香薑黃各二錢乳香沒藥各
一錢半木鱉子肉五箇右為末蜜調成膏收
罐內以釣藤煎湯或
薄荷湯化下計門

瘵瘵

瘵瘵亦驚風之類以瘵者手足冰冷瘵者舉身
強直瘵瘵亦驚風之類以瘵者手足冰冷瘵者舉身
柔者無汗其證肢體強直腰身反張甚於風癇大
抵不治植其身軟時醒者為瘵身反張強直如癇
不時醒者為瘵詳具風門

癩癇

驚風三發則為癩癇者小兒惡病也大人曰癩小
兒曰癩其實一也又曰十歲以上為癩癇時仆地
聲醒時吐涎沫急慢驚則不作聲癩癇時仆地作
聲醒時吐涎沫急慢驚則不作聲癩癇時仆地作

慢脾不治證

天吊驚風瘵瘵

癩癇

定魄丸 治因驚發癇人參琥珀茯苓甘草各等分右為末
 九靈丸 治心薄荷煎湯化下
 有青紋紛紛如線見之急用瓜破須
 成癇宜化下燒丹九二九得利即愈方崩耳後高骨間必驚
 泡湯宜化下燒丹九二九得利即愈方崩耳後高骨間必驚
 難治宜五生丸因引神歸舍丹取神復丹因急驚為
 始也身無熱手足清冷不抽掣不滾痰九是為陰癇
 陽癇易治宜龍騰安神丸始也身熱抽掣積或成癇或
 疾九便酸臭宜紫霜九始也身熱抽掣積或成癇或
 積驚風邪外襲先屈手如數物乃發宜追風祛
 驚風食三種陰陽二證別而治之○驚癇者恐怖
 方有五癇病關五臟用五色丸治之○驚癇者恐怖
 驚風食三種陰陽二證別而治之○驚癇者恐怖
 驚風食三種陰陽二證別而治之○驚癇者恐怖
 驚風食三種陰陽二證別而治之○驚癇者恐怖

沉香天麻湯 治小兒因驚成癇發痰涎壅塞目
 治五益智川烏炮各二分薑屑當歸甘草各一分
 沉右灸兩作一貼各入薑三七壯煎
 服先灸兩作一貼各入薑三七壯煎
紫霜丸 治食積及腹中積痰癖吐乳
 十粒去皮入油杏仁末和搗千枚若硬入少杏仁
 巴豆霜入二石末相和搗千枚若硬入少杏仁
 器中月內食癇服此取積並虛化凡兒有熱不
 小豆大○食癇服此取積並虛化凡兒有熱不
 欲飲乳之減其盛勢則無驚悸此皆發癇之患
 此藥導之眠不寧常取積並虛化凡兒有熱不
三癇丹 治急驚為癇蜈蚣一條牛膽南星二錢全蝎
 麝香一字金銀箔為衣每各一丸以薄荷湯化下
 大銀箔為衣每各一丸以薄荷湯化下

所以用代赭者聖
 濟經云怯則氣
 浮重刺所以鎮
 之怯者亦驚也

五疳保童元

香一枚 灸黃色右為未飯丸 麻子大一歲兒米飲下

疳積餅

蓬草各二錢 茵陳半斤 炒川練肉夜明砂炒各一錢 甘草灸各二錢 茵陳半斤 炒川練肉夜明砂炒各一錢

連膽丸

烏梅子大每十五丸 烏梅子大每十五丸

消疳丸

枳肉麥芽炒三稜厚朴枳殼檳榔神麴炒

諸疳

熱疳

初起赤連九 熱如火大便秘者為 初起赤連九 熱如火大便秘者為

冷疳

冷疳者久則目腫面黃 冷疳者久則目腫面黃

冷熱疳

冷熱疳冷熱交互 冷熱疳冷熱交互

蛔疳

因缺乳寒沫腹脹紫蛔雖食甘肥却不可動

從口鼻出者難治凡瘡積久

腦瘡 腦者髮作穗或頭瘡腫至顛顛腫則多損眼光

顛瘡 顛者高過頭餅多汗宜熱如龍膽於鼻中三五為末薑汁調

脊瘡 脊者背脊骨如錐宜服

齒瘡 齒者拍背如鼓鳴十指背生瘡頻咬

走馬瘡 走馬者調味甘入脾而多生虫上蝕齒齦則口瘡出血

臭瘡 臭者言則齒根潰爛如馬脫落頤有穴者名曰走

疔瘡 疔者言其證腦熱氣上奔如馬然下蝕腸胃則下疔

馬牙瘡 馬牙者宜用乳香九散

效散 銅青散 尿白散 網立 加使君子川練肉門○走

無辜瘡 無辜者生肌疔積其候面黃髮直時時有鳥食下

鳥飛過落羽所汚而與兒穿其便令有此疾也又

速破去則熱氣漸長虫隨氣流散侵蝕藏府肌

肉作瘡或大便泄膿血漸黃瘦是也丁者手足與項

丁奚瘡 丁奚者小伶腹也矣者腹大也甚者尻高肉削臍

突等物宜服生殺癢愛生米土

哺露瘡 哺者虛熱往來頭骨分解反露皆因脾胃久虛形

體瘦削亦由胎稟所成盡皆無辜種類並

疳渴 疳者夜病則渴止宜用連膽丸

疳勞 疳者骨蒸潮熱不可治宜連膽丸

諸疔

疔瘡

二七

疔瘡

疔瀉

或身瘦面黃有瘡疥或食泥土瀉青白黃沫

疔痢

疔在內則見五色下腫無時度漸加瘦瘠宜使君子

元九木香

疔腫

小兒疔病虛中有積身面浮腫疔腫

疔瘡

作瘡肺疔鼻下生瘡疔無辜疔蟲氣流散肌肉

皮膚宜服蓋蒼月蟾九化蛋九

胡黃連丸

右治熱疔胡黃連洗疔瘡藥門

懸胎煮一分右為末飯入蘆薈青黛蟻灰各二

五福化毒丹

治熱疔多生瘡疔及痘瘡除毒口齒出

至九門

桔梗八錢人參赤茯苓馬牙硝各五錢青黛二錢

龍膽元為治熱疔龍膽草黃連青皮使君子各等分

至聖丸治疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔

木香丸治疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔

使君子丸治疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔

飲二錢半右為末蜜丸艾實大每化下

飲化下三歲以下服半丸乳汁化下

使君子丸治疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔

飲化下三歲以下服半丸乳汁化下

飲化下三歲以下服半丸乳汁化下

飲化下三歲以下服半丸乳汁化下

飲化下三歲以下服半丸乳汁化下

飲化下三歲以下服半丸乳汁化下

飲化下三歲以下服半丸乳汁化下

飲化下三歲以下服半丸乳汁化下

如聖丸 治冷熱疳積黃連胡黃連燕羨使君子肉各五

下蟲丸 治疳積乾蝦蟆灰三錢苦練根皮貫衆木香

龍膽丸 治腦疳龍膽草升麻各等分右為末猪膽汁

蘆薈丸 治脊疳龍膽草黃連燕羨各一兩先炒燕羨

露星膏 治同上黃芪蜜水炒黃連地骨皮露一宿

乳香丸 治疳積如神香粉砒礞各五分麝

立效散 治疳積黃米六錢醋炒

銅青散 治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

尿白散 治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

月蟾丸 治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

十全丹 治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治冷熱疳積黃連胡黃連燕羨使君子肉各五

治疳積乾蝦蟆灰三錢苦練根皮貫衆木香

治腦疳龍膽草升麻各等分右為末猪膽汁

治脊疳龍膽草黃連燕羨各一兩先炒燕羨

治同上黃芪蜜水炒黃連地骨皮露一宿

治疳積如神香粉砒礞各五分麝

治疳積黃米六錢醋炒

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

治疳積白芷五錢綠二錢半馬牙

子蠟 和丸 麻子 各三錢 石為末 以猪膽汁浸
二連丸 治無辜疔 黃連 胡黃連 燕美 青黛 各五錢 乾
米飲下 二三次 服之 得九

布袋丸 治丁癩 瘡 露無辜 疔 夜明砂 燕美 使君子 各
二兩 薑 蒼人 參 白朮 茯苓 甘草 各五錢 右
為末 湯浸 蒸餅 和九 彈子 大每一丸 用絹袋盛之
次用 精猪肉 二兩 同煮 候肉 爛熟 提起 藥掛 風前
陰乾 只用 肉和 汁與 兒食 之

褐丸子 治疔腫 腹脹 羅當子 一兩 黑丑 頭末 半生半
炒七錢 半青皮 陳皮 三稜 蓬朮 五靈脂 赤茯苓
芩 檳榔 各五錢 胡椒 二錢 半木香 一錢 半右為末
麩糊 和丸 菜豆 大每取 十五九 蘿蒿 煎湯 下治五
疔者 如痢 疔瘦 腹

化蠶丸 治肺疔 鼻流 臭汁 流涎 隨即 成瘡 名曰疔
宜用 此燕 美 薑 蒼 膏 青 魚 川 芎 白 芷 胡 黃 連

黃連 蠟 和丸 麻子 各等分 右為末 猪膽汁 浸
玉蟾散 治諸般 疔瘡 乾蟾 灰 三錢 黃連 二錢 青黛
一錢 麝香 一字 右為末 先以 甘草湯 洗後 塗

猪肚黃連丸 治疔瘡 自然 疔瘡 疔瘡 疔瘡 疔瘡
流注 遍身 熱瘡 發 疔瘡 疔瘡 疔瘡 疔瘡 疔瘡
七兩 到石 黃連 入猪 肚中 線 縫 密 疔瘡 疔瘡 疔瘡
如菜豆 分大 爛取 入白 中 些 飯 擣 千 杵 眾 手 丸
木香元 治疔瘡 黃連 三錢 木香 厚朴 縮砂 夜明砂 炒
各二錢 黃連 子肉 一錢 右末 飯丸 麻子 大薑湯

洗疔瘡藥 洗後 訶子 燒灰 入麝香 輕粉 各少許 煎湯
諸疔通治藥 食元 消疔 疔瘡 疔瘡 疔瘡 疔瘡 疔瘡
諸疔通治藥 食元 消疔 疔瘡 疔瘡 疔瘡 疔瘡 疔瘡

洗疔瘡藥 洗後 訶子 燒灰 入麝香 輕粉 各少許 煎湯
諸疔通治藥 食元 消疔 疔瘡 疔瘡 疔瘡 疔瘡 疔瘡

洗疔瘡藥 洗後 訶子 燒灰 入麝香 輕粉 各少許 煎湯
諸疔通治藥 食元 消疔 疔瘡 疔瘡 疔瘡 疔瘡 疔瘡

洗疔瘡藥 洗後 訶子 燒灰 入麝香 輕粉 各少許 煎湯
諸疔通治藥 食元 消疔 疔瘡 疔瘡 疔瘡 疔瘡 疔瘡

洗疔瘡藥 洗後 訶子 燒灰 入麝香 輕粉 各少許 煎湯
諸疔通治藥 食元 消疔 疔瘡 疔瘡 疔瘡 疔瘡 疔瘡

洗疔瘡藥 洗後 訶子 燒灰 入麝香 輕粉 各少許 煎湯
諸疔通治藥 食元 消疔 疔瘡 疔瘡 疔瘡 疔瘡 疔瘡

洗疔瘡藥 洗後 訶子 燒灰 入麝香 輕粉 各少許 煎湯
諸疔通治藥 食元 消疔 疔瘡 疔瘡 疔瘡 疔瘡 疔瘡

洗疔瘡藥 洗後 訶子 燒灰 入麝香 輕粉 各少許 煎湯
諸疔通治藥 食元 消疔 疔瘡 疔瘡 疔瘡 疔瘡 疔瘡

坊童見元

肥兒丸

凡疳積病以肥兒丸補積餅食為主此藥消疳化

錢使君子肉四錢半人參黃連薑汁炒神麴炒三

錢炒山植肉各三錢半白茯苓甘草各三

五疳消食元

草通治諸疳殺蟲退熱磨積進食使君子

肉各等分右為末陳米飯和丸

十味蘆薈膏丸

治諸疳殺蟲和胃止瀉退熱胡黃連各五

錢蠅退十箇麝香五分右為末猪膽汁

疳眼

或流膿宜煮肝九或龍膽飲子不見物

煮肝丸

各等分右細末小兒一歲以上三錢精草

肝一大片則傾枕內煎取肝分三次煎却以

龍膽飲子

治疳眼流膿神效蛤粉三錢麻黃二錢半

黃芩炒末每二錢茶清調下

諸疳不治證

不治者不治疳目帶青左脇有青脉舌上焦黑者

者不治者不治疳目帶青左脇有青脉舌上焦黑者

齒黑有瘡骨出耳乾腦焦不水不白身如粉見

身上粟生色斑黑者必死如疳證也

飲水不止舌黑者死逆者不治

諸熱

有疳熱心熱脾熱肺熱腎熱胎熱潮熱蒸熱痰熱瘧

疳眼法疳不治證

<p>胎熱 便赤黃不胎中飲乳宜生地黃湯及酸乳 胎熱 止宜用通心飲坊元日露飲漿飲時即 朝熱 色地黃元坊觀主之門赤</p>	<p>腎熱 色地黃元坊觀主之門赤</p>	<p>肺熱 肺熱者咳色瀉白散壯飲水常悶</p>	<p>脾熱 脾熱者面黃肚大急情皆胃身熱</p>	<p>心熱 額赤齒黃中氣道赤散坊觀主之門赤</p>	<p>肝熱 肝熱者青九坊觀主之門赤 治之凡小兒熱不飲水者散熱也 內也凡小兒熱不飲水者散熱也 亦佳隨生諸利後或解清心無虛證乙丸補</p>	<p>為肺熱上壯實熱虛熱 治之凡小兒熱不飲水者散熱也 內也凡小兒熱不飲水者散熱也 亦佳隨生諸利後或解清心無虛證乙丸補</p>
--	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--	--

<p>骨蒸熱 骨蒸熱者肌瘦頰赤口乾潮熱盜汗五</p>	<p>痰熱 痰熱者喉有痰聲宜龍九方銀乙不利</p>	<p>瘧熱 瘧熱者一日一發或二三日 風寒熱 風寒熱者發熱宜散中氣</p>	<p>壯熱 壯熱者身熱宜散中氣</p>	<p>實熱 實熱者身熱宜散中氣</p>	<p>虛熱 虛熱者身熱宜散中氣</p>	<p>寒水石散 治小兒熱一兩甘草二錢半石為末每</p>	<p>甘露飲 治潮熱寒水石一錢薄荷湯調下甘草各</p>
-----------------------------------	----------------------------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	------------------------------------

諸熱

錢暑月冷湯調下

三

梨漿飲 治同上青蒿童便浸一宿兩乾柴胡人參黃

生地黄湯 治胎熱生地黄赤芍藥川芎當歸瓜蒌根

釀乳方 治同上澤瀉二錢生地黄一錢右剉作一貼乳

生犀散 治骨蒸熱犀角地骨皮赤芍藥柴胡乾葛甘

人參羌活散 治傷風寒發熱羌活獨活柴胡前胡枳

地骨皮散 治虛熱知母半斤柴胡人參地骨皮反赤茯苓

小兒清心丸 治諸熱及驚熱煩躁人參茯苓神防風朱

天乙丸 治小兒通利為捷徑本天一生利小兒便所以散以

積癖 食積者凡小兒失乳以食飼之未有不積證有傷

多嘔赤痢下如油凡有積滯須辨虛實實者多

傷積之明驗也類小兒積證面黃腫問有熱者

乳積成食積腹脹瘦弱疳積色無常嘔積證有傷

化積者凡小兒失乳以食飼之未有不積證有傷

積癖 食積者凡小兒失乳以食飼之未有不積證有傷

化積者凡小兒失乳以食飼之未有不積證有傷

化積者凡小兒失乳以食飼之未有不積證有傷

化積者凡小兒失乳以食飼之未有不積證有傷

化積者凡小兒失乳以食飼之未有不積證有傷

化積者凡小兒失乳以食飼之未有不積證有傷

化積者凡小兒失乳以食飼之未有不積證有傷

化積者凡小兒失乳以食飼之未有不積證有傷

化積者凡小兒失乳以食飼之未有不積證有傷

化積者凡小兒失乳以食飼之未有不積證有傷

化積者凡小兒失乳以食飼之未有不積證有傷

化積者凡小兒失乳以食飼之未有不積證有傷

化積者凡小兒失乳以食飼之未有不積證有傷

眼進食丸小兒病消食丸虛而有疳瘦者宜服中服肥元丸
 勞飲水不止或喘而痰下與潮熱相類若不早治必成
 之也以其有癥癖故令兒不食脾胃虛弱發熱引
 飲也。○有癥癖者併於兩脇痞結者吞於中脘皆引
 食積宜用七節聖飲厚停帶邪氣相搏而成也。○乳
 化癥丸如神散。○愛喫泥土宜清胃養脾湯治與泥
 霜九如神散。○愛喫泥土宜清胃養脾湯治與泥
 方。

進食丸

消癥積木香枳殼當歸代赭石朱砂各三錢
 巴豆霜一錢麝香五分右為末麩糊和丸

消食丸

砂治宿食不消消乳積食積香附子炒五錢
 砂治宿食不消消乳積食積香附子炒五錢
 法末服之神麩糊和一名消乳丸

七聖丸

乾次入蓬稜同炒赤色又入陳練再炒
 乾次入蓬稜同炒赤色又入陳練再炒
 乾次入蓬稜同炒赤色又入陳練再炒

厚腸丸

治乳食積積腹脹瘦弱參各三分厚神麩末各五
 治乳食積積腹脹瘦弱參各三分厚神麩末各五

白餅子

腹中疳積則不食但飲此主之滑石輕粉
 腹中疳積則不食但飲此主之滑石輕粉

六味三稜丸

治未喫食小兒有疳積者蓬朮三稜並
 治未喫食小兒有疳積者蓬朮三稜並

積癖

卷...

三十六

為末麩糊二和九菜豆大
白湯下

廣木化癖丸

治乳癖食癥木香五錢代赭石三錢
當歸炒朱砂研木香五錢代赭石三錢

千金消癖丸

治小兒疳積四錢人參白朮白茯苓神麩炒
芽炒小兒疳積四錢人參白朮白茯苓神麩炒

化癖如神散

治疳積塊積聚蟾酥黃蠟各二錢已豆肉
錢五分麩香三分

清胃養脾湯

治小兒愛喫泥土乃脾虛胃熱所致石
陳皮白朮茯苓甘草黃芩各

治契泥方

治小兒契泥土及嘔吐
砂治小兒契泥土及嘔吐

吐瀉

小兒吐瀉泄黃傷熱見吐瀉泄黃傷熱見吐瀉
當小兒吐瀉泄黃傷熱見吐瀉泄黃傷熱見吐瀉

吐瀉

者胃虛也紫霜宜九下後用香橘餅和吐瀉昏睡不
露睛者胃實熱也宜木散五錢散散散散散散散散
調服吐瀉有寒吐瀉身冷宜益散散散散散散散散
中穢惡不盡燕入喉中故吐不止宜用木初生拭口
如吐瀉或瀉完穀者傷風甚也凡傷風多作吐瀉
止者風木好者用燒錢九也宜大青膏眼慢糞穢有筋

膜者乃父母交感時與乳所致名曰交精吐慢驚
用益黃散五疳保童元功見吐瀉久將成慢驚
小兒宜用和胃丸助胃膏最妙

玉露散 治暑月吐瀉身熱或煩渴石膏寒水各五錢或一錢溫水

涼水任下

朱砂丸 治初生兒吐瀉此因穢惡入胃中所致朱砂

薄荷湯化下二三丸後以朱沉煎調之

朱沉煎 朱砂二錢藿香三錢滑石五錢丁香十四粒

五分先在上須史墜下澄去水別用溫水下○月內

生嘔自下而

香橘餅 治初生停乳吐瀉木香橘皮青皮各二錢半

實大每九以紫蘇煎湯或米飲任下

和中散 和胃止瀉定煩渴人參白朮白茯苓甘草

末作一貼入薑五片棗二枚水煎服錢○一方治

腹痛泄瀉厚朴一錢白朮五分乾薑甘草各三分

半粟散 治吐涎沫或白綠水者胃冷宜用此半夏薑

煎服

木瓜丸 治初生吐瀉不止木瓜麝香木香檳榔臙粉各

一丸二

燒鍼丸 治內傷乳食吐瀉不止危甚者黃芩朱砂白

米飲化下此藥清鎮專主吐瀉

和胃丸 治五錢 藿香 渴尾 各一錢 丁香 白木 各一兩 半

助胃膏 治小兒吐瀉 和脾 胃進 乳食 最妙 山藥 三錢 一錢 縮砂 二十箇 白茯苓 陳皮 甘草 各二錢 半 木香 未蜜 九皂子 大每 一丸 米飲 化下 或為 末木 亦湯

吐瀉論證 此五歲 兒中 黑睛 少而 白睛 多面 色恍 白必 多病 夫面 色恍 白者 神怯 也黑 睛小 者腎 虛也 黑 睛為 水本 法而 虛故 多病 也縱 長成 必肌 膚不 壯

若不 保養 易虛 壯年 也面 上常 無精 神元 氣者 酒如 若人 之失 血也 今吐 利不 食壯 熱者 傷食 也又 瀉虛 怯不 可下 下之 虛入 肺則 嗽入 心則 驚入 脾則 瀉

入腎 則益 虛但 以消 積也 錢調 下

磨入 腎則 益虛 但食 積也 錢調 下

感冒風寒 貧睡 口中 氣熱 呵欠 煩悶 者傷 風證 也頭 痛目 體痛 鼻色 皆傷 風寒 也嘔 噴瀆 頰赤 服青 膏財

雄黃膏 治傷 風溫 壯熱 引飲 寒水 石五 錢甜 硝甘 草

惺散 治傷 風發 熱痰 嗽煩 渴人 參白 木白 茯苓 桔

痰涎喘嗽 痰乃 風苗 火咳 嗽則 伏於 脾大 動則 壅於 肺痰

火湯 煎方 煎脈 脾寒 嗽宜 華蓋 散熱 嗽宜 清金 降

之聲 喘者 肺所 出也 龍九 奪命 散在 於咽 喉如 水雞

感冒風寒 痰涎喘嗽 龍九奪命散 馬脾風

宜用馬脾風散
命散保命丹
見牛黃奪

馬脾風散

治寒邪入肺
寒鬱為熱
痰喘上氣
肺脹
一錢半
粉五分
香油一點
抄藥在油花上待沉
却去藥少

神效

牛黃奪命散

治小兒肺脹
胃滿喘急
兩脇扇動
夕黃一兩
生半熟
黑五半
生半熟
取頭末各五錢
粉一字
和勻每取一錢
或二錢
蜜水

泄痢

小兒瀉痢
瀉即瀉也
其證目眩
腫腹
變易無常
○疳即

赤白痢感
元妨連
○膠元六
危九
一曰赤痢
二曰白

痛宜蘇感
元妨連
○膠元六
危九
一曰赤痢
二曰白

痢三日
赤白痢
四日食積
通宜
小驚
車元
真入
養

道藏湯
不閉
黃瀉
長流
者不治
○小兒痢
穀

一方治瀉痢
每五倍
子炒黃
為末
烏梅肉
水浸和丸
彈

水

腹痛腹脹

小兒腹痛
曲腰
乾啼
無淚
面青
白唇
黑肢
冷

洗其腹
揉葱白
熨臍
腹間
良久
尿自
出其
痛立
止

中湯散
積積丸
○面青
白身
冷大
水瀉
為食
所傷
宜用

乳香散

治小兒腹痛
取乳香
一塊
於乳
鉢內
磨水
一分
滾調

治兒腹脹
蘇子
蘇葉
蘇梗
乾葛
陳皮
木香
甘草
草減半
食減者
加木煎

乳香散
取乳香
一塊
於乳
鉢內
磨水
一分
滾調

乳沒末服之只

消食散

治食積腹痛白朮陳壁土炒二錢半麥芽縮

消積丸

治乳食傷積腹脹三筒使君子肉五筒右為

安蟲散

治虫痛胡粉炒黃檳榔苦練根鶴虱白礬半

撮氣丸

治小兒腹虛脹大胡椒全蝎各四十九至一箇右末

五軟五硬

軟是也頭項軟者天柱骨倒也身軟口

外貼生筋散

治手足軟者無力以動也宜薏苡九

捷骨散

治頭軟不能正也項軟者天柱骨倒也白

生筋散

治外貼之先起兒頭摩項上令熱作片去殼

薏苡丸

治手軟薏苡仁當歸秦艽大荆芥湯化下

鹿茸四斤丸

治身軟筋骨痿弱肉麻杜仲五味子各

五軟五硬

軟是也頭項軟者天柱骨倒也身軟口

外貼生筋散

治手足軟者無力以動也宜薏苡九

捷骨散

治頭軟不能正也項軟者天柱骨倒也白

生筋散

治外貼之先起兒頭摩項上令熱作片去殼

薏苡丸

治手軟薏苡仁當歸秦艽大荆芥湯化下

鹿茸四斤丸

治身軟筋骨痿弱肉麻杜仲五味子各

五軟五硬

軟是也頭項軟者天柱骨倒也身軟口

外貼生筋散

治手足軟者無力以動也宜薏苡九

捷骨散

治頭軟不能正也項軟者天柱骨倒也白

生筋散

治外貼之先起兒頭摩項上令熱作片去殼

薏苡丸

治手軟薏苡仁當歸秦艽大荆芥湯化下

鹿茸四斤丸

治身軟筋骨痿弱肉麻杜仲五味子各

五軟五硬

軟是也頭項軟者天柱骨倒也身軟口

五軟五硬

四二

解顛

年大小兒頭縫不合如解故曰解顛此由腎氣
不成故也腎主骨髓而腦為髓海腎氣不
成則腦髓不足故者不能合也凡得此疾者
亦有不數歲者乃成廢人得此疾者不過千
百其間腎氣不茂故也長必少笑更有目
色瘦者多愁少喜也○解顛小兒頭縫不
也宜服六味地黃元氣散或八物湯小兒
卒連煎服外貼三辛散天南星散且以頭
護之自磯合亦良法也

三辛散

治解顛乾薑七錢半細辛桂心各五錢右
末薑汁和付顛上小兒面赤即愈

天南星散

治同上貼顛上灸手頻熨立效錢全

顛填顛陷

顛填者顛門腫起也因乳哺失常或寒熱交
攻亦致顛填突起汗出毛髮黃而短是也
上衝則硬熱氣上衝則顛高而突又肝盛
熱渴引水漿致成泄利則氣血虛弱不能
交腦

語遲行遲

狗頭骨交黃為末雞子清調付
宜服菖蒲九錢○小兒五歲不能言者病後
黃元始發一五言至一年始言語如常者
者脚軟是也氣血不充骨髓不滿軟弱不
加鹿茸牛膝五散○子五加文久服之
或元加鹿茸補之或用調元散○小兒
鶴元加鹿茸補之或用調元散○小兒
由稟受不足血氣不充故肌肉瘦瘠骨
末醋調服仍以大南星炮為

菖蒲丸

治心氣不足五歲不能言石菖蒲人參麥
門冬遠志川芎當歸各二錢乳香朱砂各一

解顛顛填顛陷

語遲行遲

四二

錢右為末蜜丸麻子大服

下十九至二十九日服

雞頭丸

治小兒諸病後不能言雄雞頭灸一箇鳴蟬

虎骨丸

治行遲虎骨生乾地黃酸棗仁白茯苓肉桂防風當歸川芎牛膝黃芪各等分右為末

五加皮散

治行遲山藥五分白朮白芍藥熟地黃當歸各一錢二分半白芍藥熟地黃當歸

調元散

治行遲山藥五分白朮白芍藥熟地黃當歸各一錢二分半白芍藥熟地黃當歸

髮不生齒不生

髮不生者由齒者骨之所致宜服髮元氣不足則髮不生用雄雞散

去齒

取長齒生牙頰雄鼠之骨末取大共鼠

菴蓉元

當歸生乾地黃肉菴蓉白芍藥各一兩胡粉

芎黃散

川芎生乾地黃當歸山藥白芍藥各一兩沉

龜背龜

龜背者初生不能護背風入於脊骨或坐太

丹枳殼

枳殼九且取龜屎點脊骨節上即平也或乳母

松藥丹

治龜背松花枳殼防風獨活各一兩麻黃大

齒不生髮不生

齒不生髮不生宜服芎黃散

飲下十

枳殼丸

各三錢上枳殼防風獨活大黃前胡歸身黃

百合丹

治龜背丸細○黃七錢半天門冬各五錢右末蜜丸

滯頤

小兒滯頤者口角流涎是也涎者脾之液流出積

木香半夏丸

皮陳皮各二錢半右末蒸餅和丸麻子

溫脾丹

半夏為末丁香黍米大青皮乾薑各二錢

丹毒

也○金絲瘡小兒紅毒百疔赤毒如線巨細不一救之謂

拔毒散

兩黃柏甘草走嫩熱寒水石二兩三錢石膏一

冰黃散

右治同水調勻雞羽掃塗各五錢

滯頤丹毒

滯頤丹毒

滯頤丹毒

滯頤丹毒

泥金膏

治丹毒熱無名腫毒... 調敷上... 一分

諸瘡

所生之疾乃胎毒之深者... 宜按法治之... 小兒後

牛黃散

分黃連黃芩... 治胎熱血... 少許

大連翹飲

治諸瘡... 甘草四分... 柴胡五分... 黃芩一分... 芥各三分

生料四物湯

治同上... 黃芩薄荷各一分... 芍藥川芎各一分... 歸身防風

紅絲瘤

皆人生子... 遍身生紅絲瘤... 不救後生三四子

藥毒成淋

大痛下... 如黍粟者... 約五七日... 必發則

諸瘡藥毒成淋

紫雪和黃栢末... 九梧子... 胎留於... 乾熱湯... 門而然... 以

四五

錢許病減

與之况母得之者乎書此以證東垣紅絲瘰之事
斷乳小兒宜用畫眉膏
子與之况母得之者乎書此以證東垣紅絲瘰之事

畫眉膏
山梳子調勻候兒睡著濃抹畫兒兩眉上
畫眉膏
山梳子調勻候兒睡著濃抹畫兒兩眉上

小兒諸病死證
筋忽作鴉聲絕視不轉睛
筋忽作鴉聲絕視不轉睛

魚口凡病田汗不出如珠不流者死
魚口凡病田汗不出如珠不流者死

痘疹三證專由胎毒
夫胎毒在腹中至六七月則
夫胎毒在腹中至六七月則

已成形食母腹中穢液入兒五藏食至十月即穢
已成形食母腹中穢液入兒五藏食至十月即穢

斷乳諸病死證
熱毒少流行之天君則發作矣胎毒藏於命門遇少

稀痘方

稀痘湯

稀痘方有服朱砂法延生第一方稀痘免紅丸

服朱砂法

如米細光明朱砂水飛為末每五分作三
次煉蜜調量兒大稀者不可多服門一法
痘出未出者首尾可消但性微寒不可稀者
可起痘癰者首尾可消但性微寒不可稀者
末少許用調朱砂

延生第一方

小兒初生齊帶脫後取置新瓦上用
炭火四圍燒至預將朱砂透明者為極
蓋之類蓋之存性研末預將朱砂透明者為極
細末水飛過臍帶若有五分重朱砂用二分五釐
生地黃當歸身濃煎汁上一日之調和前兩味
兒上膠間及乳母乳頭上一日之調和前兩味
便遺下污穢濁垢之物十分身永無瘡
及諸疾生一子得一子十十分身永無瘡

稀痘免紅丸

一隻取血以蕎麥麩和之少加雄黃四五

滌穢免痘湯

分九乾成餅凡初生小兒二日後與菜豆大者二
九服久則遍身發小兒紅癍是其驗也
痘疹者雖出亦稀小兒已長會飲食者就以免血
啖之尤妙或云不必一日佳
免亦可自然終不若一日佳
母只令一人知其胎毒洗後不生痘也
頭面上下一以去其胎毒洗後不生痘也
而只三五顆

獨聖丹

絲瓜近帶取三寸連皮子如數配入砂糖搗
成餅時與兒吃盡為佳小兒痘疹服此則少與
全然只燒蒸三兩日不出者或每遇作熱時即與
食之出痘必少醫者凡痘疹初出或未出時服此
藥則多者可少者○無重者可令輕也又云
朱砂少許
尤妙

稀痘方

卷之二

四

百壽散 初生月內用之老無瘡疹黃連一兩朱砂一錢

之却以餘藥傾盆

服梅花方 服少陰乾為末煉蜜九如芡實大每一九好

酒化下念太乙救苦

秘傳稀痘湯 遇六月上伏日採葫蘆嫩蔓數十根陰乾

蔓安鍋內燒湯一盃洗未出痘小兒知將葫蘆

痘瘡預防法 油每遇子門○天行痘疹宜預服三豆飲

三豆飲 赤小豆黑豆綠豆各一升甘草五錢右水煮

丹免紅丸解毒則不

油飲子 此小兒陽盛無陰以制令頭髮堅直飲食減少

龍鳳膏 烏雞卵一箇地龍在內皮紙糊其竅飯鍋上蒸

辨痘證 傷寒傷食瘡疹有證相急○傷寒則口增熱

也○瘡疹者面燥○昏睡○喜驚○赤多○煩○發

大抵與傷寒相似發熱煩燥○赤多○煩○發

傷風寒而得嘔吐或因時氣傳染而得或因傷食發熱

嘔吐而得或因時氣傳染而得或因傷食發熱

嘔吐而得或因時氣傳染而得或因傷食發熱

嘔吐而得或因時氣傳染而得或因傷食發熱

痘瘡預防法 辨痘證

狂悶昏聩諸語或自汗或下利或發熱或不發熱
證候多端卒未易辨其耳後有紅脈赤縷為之真也
獨冷又若不若視其耳後有紅脈赤縷為之真也
○痘疹證以耳冷尻冷足冷及耳後有紅脈赤縷為之真也
脈驗之然須見心胃間細點如粟起則為真也
痘瘡亦時氣之一端其傷寒時氣熱毒內盛多發也
瘡其色或白或赤若頭作瘰癧戴豆故謂之豌豆瘡
軒若紫黑色白或赤若頭作瘰癧戴豆故謂之豌豆瘡
則周匝遍身五內
七竅皆有也類

痘有五般證五藏各有其證○肝藏木其色青或青
疹或如麩或二色○歸腎合而此為五色凡痘疹等
為好善或○小兒在胎十月食五藏之液肝主淚肺主涕
毒當出故瘡疹之狀皆五藏之液肝主淚肺主涕
心主血其色青而小肺為膿痘以涕稠濁如膿其
出如水其色青而小肺為膿痘以涕稠濁如膿其

色白而大心為瘰癧主血其色赤而小故膿疱水疱皆大脾
為疹其色赤黃而小多故瘰癧水疱皆大脾
血榮於內所出少以液從瘡出皆小膿疱水疱皆大脾
瘡者深淡俱少以液從瘡出皆小膿疱水疱皆大脾
者去則泡瘦子矣○瘡者俗謂之瘡子也瘡之形狀
最大水痘次隱隱如麻子又次之瘡子也瘡之形狀
瘡諸證初熱三日類傷寒初證○自初熱至發痘類
痘瘡諸證初熱三日類傷寒初證○自初熱至發痘類

痘瘡治法凡痘瘡治法或發或瀉或解或化毒其涼血
養適其寒溫遺毒汗不虛之疾成無不戒之毒其涼血
愈之後不致遺毒汗不虛之疾成無不戒之毒其涼血
喉閉肌腫潮熱汗泄此治法之大畧也○瘡瘡
發於肌肉陽明胃氣主之治法之大畧也○瘡瘡
無陷伏之患○諸熱不可驟去宜輕解之蓋痘瘡
無熱則不能起發比之種痘宜輕解之蓋痘瘡
痘瘡七時氣之端

痘瘡七時氣之端
痘瘡治法
痘瘡諸證

痘瘡

痘瘡日限 聖瘡七日熱而發 七日泡而乾 又七日則平 復如舊矣 癰疽除初熱三日不斘蓋有熱發 二日中或十餘日故也 自報痘至收斘首尾一十 不及一月後方死 而愈 轉紫色者不過七八日死 十蓋痘是胎毒自內出 外二三日方出 齊毒氣尚在 內出至六日則當盡發於表 七八九日成膿而結

調治凡見出遲發慢者 根葉欠紅 活者便當憂慮 證不可妄下 及妄用平攻 發受風冷 瘡疹用溫平藥治之 證不可妄下 當用平攻 發受風冷 瘡疹用溫平藥治之 證不可妄下 當用平攻 發受風冷 瘡疹用溫平藥治之

故須於六日以前急服涼血解毒之藥 以驅出之 六日以後醫無及矣 故其死最急者 虛弱毒氣少 者只是氣血不足 不能貫膿成 就故綿延日久而 後死矣 謂三朝自出痘至收斘要十二日可保平 安 醫

發熱三朝

痘瘡亦時氣之一端 大抵與傷寒相類 澁○睡○中○急○驚○卒○暴○壯○熱○肌○膚○癩○急○出○之○時

者根湯參蘇飲 煎熟似傷寒 未辨疑散 似間且與升麻 葛根湯參蘇飲 煎熟似傷寒 未辨疑散 似間且與升麻 者根湯參蘇飲 煎熟似傷寒 未辨疑散 似間且與升麻 者根湯參蘇飲 煎熟似傷寒 未辨疑散 似間且與升麻

痘瘡日限

發熱三朝

發熱三朝

出痘作腰痛者急服神鮮湯出汗以痛止為度免
出外腎之痘○發熱之初急宜表汗使藏府胎毒
紅點未見之前也○發熱則痘出稀少然表藥必在
已衰疑似未辨者宜用四物解肌湯五日未見
出即出五日已外無者非痘也○發熱三日未見
形跡宜以生酒塗身上時時
看之狀如蚤痕者是癩也○

發熱時言凶證

有言○發熱時不發熱時一日遍身即生紅點稠密如蠶
種樣摸過不碍手者凶○發熱時頭面上有一片色
被杖出痘乾燥者凶○發熱時頭面上有一片色
如臙脂者凶已
上皆決死醫

加味敗毒散

柴胡前胡羌活獨活防風荆芥薄荷枳
殼桔梗川芎天麻地骨皮各三分石劉
煎服表汗宜加紫草蟬殼紫蘇麻黃葱白

紅綿散

全蝎麻黃荆芥穗天麻白芷各五分
治熱毒大威狂言煩渴及痘瘡紅紫黑

加味六一散

滑石六兩研水飛甘草細末六錢辰
砂心煎湯調下夏月以新汲水調下三
散一錢下能解毒發熱出痘初用加味敗毒

神解湯

治發熱飲出痘而腹痛者柴胡一錢半乾葛
一錢麻黃白茯苓升麻防風各八分甘草五

四物解肌湯

傷寒瘡疹疑似未辨者以干涼之劑調
湯之即此

出痘三朝

重發熱一日即出痘者太重二日即出痘者亦
身涼乃見痘者尤輕自出痘一日至二三日方齊
凡痘至是謂之出痘三朝

發熱時言凶證

出痘三朝

五二

瘡若根不似紅若根稟紅頂圓突堅實捫之碍手者瘡也
瘡微痲瘡也醫用消毒飲化毒湯三日瘡不出或不快出
後即不多出即不加藥發之如三脚如紅藥發後不多
出者為子孫母好子孫多則自然有不等者為母後
無害○出速且密宜背脊多則此乃毒感官服消毒
飲鮮毒防風湯宜用後日青乾黑脂○年壯皮厚
外壅熱煩渴謔宜用後日青乾黑脂○年壯皮厚
宜用快出四聖散或快散○痘出而後風寒復入者
宜用或只此一箇高大紫黑儼似疔痘者名曰飛痘此
最輕或只此一箇高大紫黑儼似疔痘者名曰飛痘此
見紅點此由毒氣太盛故出速宜用化毒湯加紫
草紅花蠟炭涼色解毒醫○凡痘出不快宜四聖
散加味四聖散紫草及絲瓜湯之類○涼其內連翹
便密如錢頭形勢重者合輕其表而涼其內連翹
升麻湯主之○瘡疹稠密身表急感鼠粘子湯
以陽後日青乾黑脂○瘡疹稠密身表急感鼠粘子湯

○宜消毒飲不快加酒炒芩連外用護眼膏
○痘出不快宜酒炒芩連外用護眼膏
○痘出不快宜酒炒芩連外用護眼膏

出痘時吉凶證

痘一出即變黑者救之○腎證也此為惡候
加紫草紅花救之○腎證也此為惡候
碍指者名曰賊痘過三日變成紅水疱甚三紫黑
此危證也保元湯加四苓散○寒呢利之此妙法已不
危則保元湯加四苓散○寒呢利之此妙法已不
則遍身元破赤爛而死○發熱出痘時頭面有
六一七日後次死急用化毒湯加紅花黃芩升麻救
之變黑者死醫
則身死醫

消毒飲

解毒神效鼠粘子二錢荆芥穗一錢甘草
子酒各五分右剉作一貼水煎服或加山查
防風各五分右剉作一貼水煎服或加山查
化毒湯治痘出不快豆令稀少紫草茸一錢升麻煎

出痘時吉凶證

出痘時吉凶證

出痘時吉凶證

出痘時吉凶證

服神效

犀角消毒飲

治痘疹未出或已出熱尚未解急服此藥鼠粘子二錢荆芥穗防風黃芩各一錢犀角屑一貼水煎服

解毒防風湯

凡痘出速且密或七日後壯熱毒盛氣弱聲啞此藥主之防風一錢也骨皮黃芩各五分芍藥枳殼荆芥穗鼠粘子

透肌湯

治痘不快透紫芒白芍藥枳殼荆芥穗鼠粘子各五分右對作一貼水煎服

四聖散

治痘瘡出不快及倒靨紫茸木通枳殼甘草各等分右為麤末每服一錢水煎服

加味四聖散

治痘出不快或臨伏倒靨一切惡候紫茸木通枳殼甘草各等分右對作一貼水煎服

快癍散

治痘出不快或不被風復入紫茸甘草二錢五分木通三分半甘草二分半右對水煎服

紫草飲

治痘瘡出不快三四日隱隱將出未出紫草二兩細剉以百沸湯一大碗沃之以物蓋之勿令氣出候溫服半合或一合痘即出乾○治痘紫草皆當用茸有發出之功今人用根反利大便

絲瓜湯

發痘疹最妙取絲瓜連皮子煨存性為末砂糖溫水調下半匙許或以紫草茸甘草煎湯調服尤妙今人水煎服亦得明

連翹升麻湯

治瘡疹一發便密如蚕種或如糠粒味盛者即升麻葛根湯加連翹一味

鼠粘子湯

治痘疹稠密身表熱急用此以防後患地骨皮五分柴胡連翹黃芩黃芪各三分半

出痘

傳正也

五十三

鼠粘子當歸身甘草各二分

樺皮飲子

治痘不快出瘡皮

胡荽酒

治同上胡荽莖到二兩以清酒二升同煎令沸便以物蓋定勿泄氣候溫去滓噴一身令

又方

治痘出不快薄荷研酒飲之又食之盡出無生

山查子

取肉為末湯點服之

起脹三朝

起脹三朝毒盡浮於表蓋痘出三日後當潮

氣盡發於表觀痘虛實變毒淺深全在此關○觀上紅者終不起脹顛臉乃一身之主若額上先脹者四肢必順額上無害下體已脹皆不脹○上體已脹下體緩慢者無害下體已脹皆不脹○上體已脹下體漿滯又行頂陷又起或風寒所剋俱宜水楊湯浴之○凡起脹時毒盡在表須賴裏實

則無虞為畧有瀉則內氣虛脫毒乘虛內攻而陷伏矣宜用因直湯防見○痘不起脹灰白頂陷者虛寒也宜內托散加丁香或酒調紫草膏若紫

黑陷伏不起乃大毒血熱宜紫草湯調四齒散或獨聖散見防並○起脹時有痘長大而紫黑名曰

疔加鼠粘子荆芥穗連並酒炒外用銀簪挑破

疔頭令父母吹去惡血或綿裹指甲搯去惡血蓋

汁破而毒氣發泄故也仍用雄黃末一錢調臘脂

起脹時言凶證

五六日頂尖滿起如鼓釘門之碍指

直待起脹時陸續出如粟米於痘空隙處圓淨者

吉附○起脹時根窠全不起頭面紅腫如瓠瓜之

狀者凶○起脹時遍身陷伏不起腹脹不食氣促神昏

起脹三朝

起脹時言凶證

五石

內托散

活血均氣調胃補虛內托散毒使之盡出

易收易驚即癰疽疔毒十宣散加白芍藥一味

也難○若紅紫黑陷屬熱毒者去桂加紫草紅花

煎熟入人乳好酒溫服當歸

紫草膏 治痘疹不起脹白附子麻黃紫草茸甘草各

右細末另將紫草一兩煎成膏又用蜜二兩入

酒半盞煉過同紫草膏一兩調藥末九如皂角子

大一歲湯化半九三歲兒一丸用之紅紫黑陷

者紫草湯化下淡白灰陷者好酒化熱服

又方 治痘不肥冬不起脹黃狗四五枚溫酒研服

樹內蠱虫二三箇溫酒研服未起再服以水煮熟

取汁服臘月者尤佳俗○母酒能令痘肥脹取母

麥能解發起痘疹取細末作粥和砂糖服又云極好

米能解發起痘疹取細末作粥和砂糖服又云極好

貫膿三朝

升騰化毒成膿自肌肉上貫起漸至頂尖充

滿光潤者順○氣血大振毒漿已滿將欲收斂之

時也○當結膿窠而不結由血熱相薄毒氣內外

灌注必復入心宜用猪尾膏防見○貫膿時九竅

慎宜封閉飲食藥餌極忌寒涼○出痘歷七日當

貫膿則清氣下陷不能貫膿也○出痘歷七日當

略有人參黃芪當歸煎入酒有生意用內托散見倍

入參黃芪當歸煎入酒有生意用內托散見倍

真膿之巧法也○自然消燦此循環之妙理也若未

能解毒則至此時水瀉不能伏宜用定中湯防覘不

聲○痘宜用解毒防風湯坊見弱

貫膿三朝

貫膿三朝

貫膿時言凶證

行痘者若色滿黃或蒼爛色或黃

下加乾薑肉桂糯米煎服或吐瀉不食乳食不化腹

張聲啞寒戰咬牙痘爛無膿肌肉黑者凶野破而

膿純是清水皮白薄如水泡三四日遍身抓破而

收靨三朝

收靨三日漿老痂結如果熟蒂落氣收血平

全無血水皮白乾如豆殼者凶鸚鵡

黑毒或似紫紅蒲萄色者佳當靨不靨謂之慢

有收靨者異功散者心龍腦膏最妙防並有觸穢

咬乃氣血虛極宜保元湯防起脹其者異功散

救之方規虛極宜保元湯防起脹其者異功散

行矣也宜宣風散防見導之生屏磨汁解之必着

時熱退痘靨不肯靨但調砂糖水甄陶散摻之方

而疹膿而不焦此失清涼之氣也如五穀得陽氣

一則萬勿秀而實矣與痘疹何異須察證候而

清涼之則瘡必即矣與痘疹何異須察證候而

收靨時言凶證痂落從頭上至背膈手腹腰足節

白無血色者過後亦死急用消毒飲二貼坊見後

用補氣血養脾胃藥預防之陰囊及足上先靨

起者肉內細將靨時其痘一時盡黑非靨也火極

攻裏即肉細將靨時其痘一時盡黑非靨也火極

目中無神者凶

甘露回天飲砂糖一椀調服百

通治

痘瘡首尾宜保元湯為王治之防不見出不起脹不

脹回漿貫膿頂陷不起漿滯

不行俱以水楊湯浴之防見

貫膿時言凶證

收靨三朝收靨時言凶證

通治

保元湯

入參二錢嫩黃芪甘
藥潤此毒尚淺宜用活
而玄參鼠粘子各七分
四頂陷者為氣虛弱血
芍藥五日根稟雖起色
加木香當歸川芎五
寒不能制宜桂米發陽
不滿宜加官桂糯米以
滿氣弱而險宜桂糯米
其收斂足濕潤不斂者
相仍只以此藥證內減
大寒大熱之劑恐致內
解毒 疎則無毒密則有
初酒炒如胃前稠密急
服消炒茶連飲能見加
山查子酒

解毒

解毒

黃芩紫草茸○痘出太多
味犀角消毒飲○痘出太多
耳痛膿攻則瀉○耳痛膿攻
下○黑者毒氣燥熱相薄也
煎湯磨犀角玳瑁汁加味
者○毒入胃則腹上痘多
解毒地不毒氣太盛宜豆
加味犀角消毒飲○治痘疹
犀角五分防風升麻各三
神功散○治痘疹太盛以
取東流川芎常歸升麻甘
枕半慮下水煎三次每次
解毒

未砂四兩以綃袋懸入磁罐加煎藥水封固引水
 盡為度取出焙乾末入磁罐加煎藥水封固引水
 煉用糯米二合以紙色外用黃泥固濟入火
 煉紅冷定打碎取米黃色者用之白者不用每
 服以朱砂一錢末調勻煉蜜匙二匙好酒二匙
 沸湯一匙小鍾共一處調勻煉蜜匙二匙好酒二匙
 黑散子 盛瓶毒初出服此便消不冷研細每二錢新

辨痘吉凶

痘者豆也伏小痘不一無妨惟欲圓滿硬實不
 宜虛軟陷伏小痘不一無妨惟欲圓滿硬實不
 成水疱然遍身變壞獨頂額上收屬時敗證悉具惟
 頂額上未靨如舊者可生呼頭粒白根窠
 紅潤譬如一靨如真珠者在臙脂上故曰生頭粒紅窠
 紫地一般者善或二色相合而死相者凡痘疹
 只出一般者善或二色相合而死相者凡痘疹
 癩疹相乳念不減○痘脚稀疎和○根窠紅活○不
 不渴○相乳念不減○痘脚稀疎和○根窠紅活○不

辨痘輕重順逆

六證並不服藥自愈
 一痘不洽證有七○一者
 二痘不洽證有七○二者
 三痘不洽證有七○三者
 四痘不洽證有七○四者
 五痘不洽證有七○五者
 六痘不洽證有七○六者
 七痘不洽證有七○七者

辨痘吉凶

辨痘輕重順逆

辨痘輕重順逆

辨痘輕重順逆

辨痘形色善惡
者避風寒○常和煖○大便稠○不燥渴○忌生
冷○忌外入○凡疔疰收斂○頭至足為順
從○至頭足疰亦疰○齊者○頭上未出疰俱
上○大便先實者順○不食體大便秘者順○逆
食○大出為實者順○故春夏為順○秋冬為逆○惟腎無候但見
陽○出則為順○歸腎變黑○秋為逆○疹為逆○惟腎無候但見
盛○寒故病多歸腎變黑○秋為逆○疹為逆○惟腎無候但見
平○證耳凉尻凉為順○若黑血并皮耳及尻反熱者為
逆○痘耳凉尻凉為順○若黑血并皮耳及尻反熱者為
者○逆蓋瀉水出皮在內病出而安○也○水穀化者
脾○實故瀉水出皮在內病出而安○也○水穀化者
容○逆如鐵頭如發便出盡者必重痘挾疹者半輕半重
者○逆如鐵頭如發便出盡者必重痘挾疹者半輕半重
孔○者熱劇如鐵
鮮○紅則為血熱初起紫者大熱也全白者氣虛也○痘
灰○白者血衰而氣滯也黑者毒滯而血乾也○痘

辨痘形色善惡
色○初出淡紅○變白○變黃者○吉○初出鮮紅○紅
紫○紫變黑者○逆○痘出紫色○不潤者○毒盛壅塞○改
也○宜用紫草飲坊見外用芥子末塗脚心○坊見
○黑屬血熱涼血為主○四物湯坊見○加黃芩黃連
紅○花坊見○白屬氣虛補氣為主○保
元○湯坊見○甘草加紫草坊見
照燈影法○凡痘形色雖紅活紫影深厚則皆可調治
若○根窠不紅不起血死不活紫影深厚則皆可調治
故○白日久亦必用麻油紙擦照之眼法神巧全在於
此

辨痘虛實
下○胸散不吐瀉俱少食為衰虛○陷伏倒靨灰白為表
涼○胸散不吐瀉俱少食為衰虛○陷伏倒靨灰白為表
實○吐瀉少食為實○身涼多汗為表虛○實難出○裏
肺○主氣氣不足則致三證○實難出○裏
辨痘虛實
辨痘虛實

辨痘形色善惡
辨痘虛實
辨痘虛實

頂陷塌宜保三元湯方見四君子湯
血不足則致三證或灰白色根窠不紅心主光
澤宜芎歸湯紫草紅花
湯宜芎歸湯紫草紅花

辨痘陰陽證
嘔乳食冷目睛青赤兩腮紅數已大便秘陽證
不可服冷藥止足上脘熱急兩腮紅數已大便秘陽證
便赤渴冷藥止足上脘熱急兩腮紅數已大便秘陽證

保護
痘者由不慎風冷不受風冷可也
痘常令衣服溫適中涼處坐臥避風寒蓋內外
調護使房室溫適中涼處坐臥避風寒蓋內外

飲食
痘以脾胃為主始至終以能食為順又日淡食
且醫落之氣後血大虛尤當謹於防避也
為佳脾胃肥時宜食老雞補氣收曆時宜食雄
收毒或精肥時宜食老雞補氣收曆時宜食雄

內肝血中酸辣五辛忌鷄鴨卵烹食
少與滾熟水則可自發熱至收曆諸般血肉皆
不宜食助及精肉去盡脂肪淡煮少食以助
滋味難治常慎口去盡脂肪淡煮少食以助
黑歸腎難治常慎口去盡脂肪淡煮少食以助
以調藥乳以飼之俾其氣血清和飲食有節投
矣即乳母食後須令兒吮乳令汁盡乃
服藥即乳母食後須令兒吮乳令汁盡乃
痘疹宜食物
宜食
○海松子
○白飯
○蒲萄
○糯米
○小魚
○黑豆
○雄猪肉
○松子
○白飯
○蒲萄
○糯米
○小魚
○黑豆
○雄猪肉
○海松子
○白飯
○蒲萄
○糯米
○小魚
○黑豆
○雄猪肉

禁忌
痘疹切忌諸般臭穢煎炒烟父母行房梳頭等
觸犯未發而觸則毒氣入心悶亂而死已發而觸

辨痘陰陽證
保護飲食禁忌

則瘡痛如刺以至黑爛切宜深戒
近狐臭漏腋房中淫慾及婦人月候
黃蚊之氣一切腥臊頭髮等氣
惡之氣行聞臭則止故也
腦麝香行聞臭則止故也
○痘不可深浴落肌肉尚
○痘不可深浴落肌肉尚

浴法

痘膿或因氣血虛弱或為風寒所剋不能起
○或陷伏宜用黍稷煮湯
○或免皮毛煎湯
○或免皮毛煎湯

水楊湯

乃乘熱洗浴良久以油紙點照之
起勢如前浴弱者只浴頭面手足勿浴背如燈照

而無起勢則必添湯久浴使透徹肌肉疎通內外
轉毒氣隨轉紅而發也此藥升提開豁萬竅枯者

襪法

酒疔見化下蘓合香元方現懶門○熏之更以胡荽
冷有胡荽氣能辟去穢惡之氣
○常燒蒼朮猪蹄

辟穢散

一名香法穢散亦名辟穢丹
○常燒蒼朮猪蹄

痘瘡

諸證有聲音咽喉痛腰腹痛驚搐嘔吐泄瀉
眼淚便溺凡二十一條

浴法

痘疹論

二

聲音

瘡已出而聲不變者形病也瘡未出而聲先變者氣病也出而聲不聲者則內托散倍枯梗坊見○如漿滿聲啞者

咽喉痛

瘡出咽喉者亦治○瘡出乃心胃熱也見如聖飲○咽乾不痛口爛腫乃心胃熱也見如聖飲○咽乾不痛口爛腫乃心胃熱也見如聖飲○咽乾不痛口爛腫乃心胃熱也見如聖飲

如聖飲

麥門冬桔梗各一錢鼠粘子甘草各五分左右到入竹葉三片同煎服得

腰腹痛

痛如被杖及出痘乾燥者死○痘瘡腹痛多是痘毒當

臨證消息

出然後發於外宜升麻葛根湯○痘子先自腸胃中

相薄欲出

而不熱時腹痛或脹者由毒氣與外邪

手捻散

鼠粘子白芍藥大黃桃仁各八分紅花四

蟬退湯

蟬殼二十錢白湯調下腹痛立止而透神

驚搖

欲發瘡疹先身熱驚跳搦非驚風宜服發藥

聲音咽喉痛

瘡未出先發搖是兼外邪宜加減紅綿散如痘發

稠密毒熱內熾或倒靨黑陷時作搐
搦宜用猪心龍腦膏子方現醜
加減紅綿散 麻黃荆芥穗全蝎
天麻薄荷紫草草薺同煎服

嘔吐 凡顯痘疹若自吐瀉者不可妄治而多吉謂邪氣
上下皆出也初起者毒盛乘火宜視大便流膿見吐瀉
○吐瀉喘渴吐者毒盛乘火宜視大便流膿見吐瀉
○吐瀉喘渴吐者毒盛乘火宜視大便流膿見吐瀉

定中湯 收斂胃氣止吐瀉神妙取真正黃色土不雜
沙石者一塊置碗內以百沸湯泡之以蓋合
飛俟溫右用兩錢少加砂糖溫服二服立止
○吐瀉喘渴吐者毒盛乘火宜視大便流膿見吐瀉

泄瀉 湯出後極忌泄瀉起藥煎服腸滑者肉豆蔻煨一元
澤乳香不起發根菓不紅或瀉而向或腹脹或氣促是
管不起發根菓不紅或瀉而向或腹脹或氣促是
管不起發根菓不紅或瀉而向或腹脹或氣促是

表裏俱虛宜異功散煎水吞下肉豆蔻丸○腹脹
瀉乃胃中津液少也宜用香散○泄瀉頻
多津液內耗血氣不榮其痘雖起發必不能
木香散救之○起脹時泄瀉則內氣虛脫瘡必
固真湯

異功散 治痘屬之除頭溫尻冷腹脹濕瀉如寒戰咬
三分半桂皮白朮白茯苓各三分陳皮厚朴人參
肉豆蔻煨丁香各二分半附子炮半夏各一分半

木香散 治痘瘡腹脹渴瀉木香一香桂枝陳皮半夏
赤茯苓人參訶子皮大腹皮前胡甘草各三分

肉豆蔻丸 治痘疹泄瀉赤石脂白礬各七錢半白
龍骨肉豆蔻煨赤石脂白礬各七錢半白

嘔吐泄瀉 飲吞下 一歲兒三十丸 三歲兒百丸

甘草湯

治同上甘草煎服之

腹脹

腹脹則亦作腹脹散散之方

散散之方

自汗

當以參芪止自汗之防其難屬明

必難貫膿收瀝急用

痒痛

血不榮肌膝所以痒血和肌潤痒自不作

多君子湯動者將發痒也因食毒物及食蓋而痒四
用蟬退湯疥甚水楊湯浴之并立止又法益和石
草霜水拌略炒燒烟熏之并立止又法益和石
未雞羽潤瘡上亦止○痛乃痘之善證初出時宜
參燕飲之晚輕者消毒飲之見起脹買時作痛

厚密難出為痛寒折宜參燕飲肉腠密宜小活血

散○因食毒物作痒宜散下見蕎麥粉亦好○因

虛發痒遍身爪破敗草散下見蕎麥粉亦好○因

歸六香氣行血運其痒自止○痘瘡煩痛宜確

硬膏防兄初用真黃土細末好○痘瘡煩痛宜確

身發痒爪破無膿○痘瘡煩痛宜確

如豆殼者死醫膿○痘瘡煩痛宜確

小活血散

白芍藥為細末每

百花膏

以雞羽刷身上時

斑爛

痘毒出成表虛難屬以致肌肉壞爛名曰斑爛

爛生蛆以帶湯坊葉柳枝鋪地止疥之或藉以芭蕉葉
又水楊湯坊葉柳枝鋪地止疥之或藉以芭蕉葉
膿水不乾宜白龍散傳○痘瘡煩痛宜確

腹脹目汗癢痛

腹脹目汗癢痛

爛宜眼內托散坊見外用祛穢散坊見焚熏躡宜
擦破周身不能回水或痘厲濕爛淋漓並宜
甄陶散糝之最妙無神者死
爛如餅搭日中無神者死
敗草散多年蓋屋上爛草晒乾細末糝之若澤身瘡
露感天地陰陽之氣善解瘡毒

敗草散

硝膽膏 芒硝為末調猪膽汁塗之
無芒硝則煇硝亦可

硝膽膏

白龍散

甄陶散 新瓦研為細末羅過紛包裹撲患處若
痘瘡黑陷必寒戰蓋黑者歸腎水惡證也
寒戰 痘瘡黑陷必寒戰蓋黑者歸腎水惡證也
戰者表虛也咬者內虛也
也咬者表虛也咬者內虛也

寒戰

甄陶散 新瓦研為細末羅過紛包裹撲患處若
痘瘡黑陷必寒戰蓋黑者歸腎水惡證也
戰者表虛也咬者內虛也
也咬者表虛也咬者內虛也

泄瀉寒元湯 此屬虛寒宜歸腎功散
用保元湯加川芎歸腎功散
泄瀉寒元湯 此屬虛寒宜歸腎功散

咬牙

齒上齧下齧相磨切有聲謂之齧齧即咬牙也
齧下齧相磨切有聲謂之齧齧即咬牙也

失血

痘疹熱盛吐血及耳血不止者死
痘疹熱盛吐血及耳血不止者死

尿澀

當消息小便澀者宜導赤散
當消息小便澀者宜導赤散

人參

蟬蛻散 人參蟬殼木通白芍藥赤茯苓紫草
散紫草木通
蟬蛻散 人參蟬殼木通白芍藥赤茯苓紫草

寒戰咬牙

失血尿澀

紫草木通湯

便秘

紫草木通湯 紫草茸木通人參各四分甘草二分右制

者為肌肉三黑不旋踵而變夫秘一若百三六便二日一便

飲安得不下常歸始終不可下若百三六便二日一便

九導之或選用油醬法潤之熱壅盛便閉不通大便可

府肥嫩潤大便自通瘡亦易落最妙丹

當歸丸

了乃入三五味末和勻作丸菜豆大

蜜皂丸

角末和勻作餅如餡糖入皂角末二錢和勻

油醬法

筒內令人吹之令漸入或

倒靨

散外感及觸穢則辟穢散坊見

色將靨時如豆殼者因初起時飲水多其靨不齊

加味四聖散

調解散

右對作一貼入薑

水楊湯

浴之神效坊見不起

便秘倒靨

黑陷

痘變不過陷。伏厲黑。陷斑。爛。四。者。而。黑。陷。最。危。
 可。不。究。諸。○。痘。伏。厲。黑。陷。斑。爛。四。者。而。黑。陷。最。危。
 膏。○。痘。癩。黑。陷。毒。鬱。煩。躁。痰。盛。狂。叫。宜。四。齒。散。
 觸。犯。穢。污。毒。入。內。黑。陷。者。服。再。麩。散。十。齒。散。
 見。寒。戰。咬。牙。或。身。重。者。十。活。四。五。再。麩。散。十。齒。散。
 俟。寒。戰。咬。牙。或。身。重。者。十。活。四。五。再。麩。散。十。齒。散。
 身。冷。下。汗。耳。尻。反。熱。溫。欲。飲。水。者。可。治。如。惡。寒。不。已。
 飲。水。冷。下。汗。耳。尻。反。熱。溫。欲。飲。水。者。可。治。如。惡。寒。不。已。
 綻。一。齊。脾。不。勝。腎。故。惡。寒。身。冷。不。齊。主。黑。陷。故。身。熱。欲。
 ○。青。乾。黑。陷。身。不。大。熱。大。小。便。泄。則。是。熱。在。內。也。
 宜。用。宣。風。散。加。味。宣。風。散。○。痘。癩。初。出。光。壯。忽。
 然。黑。陷。心。煩。狂。躁。氣。喘。妄。語。或。見。鬼。神。不。速。治。則。
 毒。入。藏。必。死。宜。回。生。散。龍。腦。膏。子。身。○。痘。癩。初。出。光。壯。忽。
 宜。加。味。四。聖。散。更。以。胡。荽。酒。質。其。身。○。痘。癩。初。出。光。壯。忽。
 則。用。獨。聖。散。甚。則。宜。加。味。宣。風。散。○。痘。癩。初。出。光。壯。忽。
 猪。尾。膏。龍。腦。膏。子。身。○。痘。癩。初。出。光。壯。忽。
 惡。至。死。宜。四。聖。散。更。以。胡。荽。酒。質。其。身。○。痘。癩。初。出。光。壯。忽。
 宜。加。味。六。一。散。○。黑。陷。登。指。目。直。喘。急。宜。用。周。天。

散。○。痘。癩。初。出。光。壯。忽。黑。陷。最。危。

猪尾膏

治。痘。癩。初。出。光。壯。忽。黑。陷。最。危。

四齒散

治。痘。癩。初。出。光。壯。忽。黑。陷。最。危。

百祥丸

治。痘。癩。初。出。光。壯。忽。黑。陷。最。危。

棗變百祥丸

治。痘。癩。初。出。光。壯。忽。黑。陷。最。危。

黑陷

治痘癩初出光壯忽黑陷最危

治痘癩初出光壯忽黑陷最危

治痘癩初出光壯忽黑陷最危

水盡為度去大戟峻以不用將棗肉作丸如法

宣風散 治痘毒於內宜服黑須渴腹脹而喘二便赤澀乃

三歲陳皮五分各二錢半檳榔兩錢蜜湯下

加味宣風散 治同上法服之即宣風散加青皮二錢後以四

君子湯勅出又以厚朴木香糯米煎服即發起

回生散 齒一人箇作一兒齒自落者佳火煨研為末每

各少許甚則用每齒一錢黃芩荷湯調下甲炮麝香

凡入齒不可過用一錢過則一陽盡出表急以四君

子方或用升麻紫草湯調下凡痘瘡忌酒調下雲歧

草氣然則只用紫

龍腦膏子 治痘瘡未透心煩狂躁不速治則毒入臧

必死梅老腦子一錢研細滴猪心血和丸如豆下

大每服淡酒化下華水化下心煩狂躁紫草湯化下

獨聖散 治黑陷氣欲絕穿山甲取前足及背上者炒

研為末木香煎湯入酒少許調五分服入麝

無比散 治黑陷魚尾龍腦粉各二分半右為細末新汲

水入小兒五分得睡後利下惡物便安

四糞散 治俱取末破陽雄者先於重九日各置淨室

中勿雜食收其屎陰乾至臘月初八日未出時

火煨存性為細末每用一錢蜜水調下

倉卒無此藥只取無病小兒糞燒灰以蜜水調下

黑陷

一名無價散一名捷效化毒散

一名萬

金散

二角飲

治痘焦乾黑陷身熱如火犀角羚羊各

周天散

治黑陷發搐目直喘急蟬殼五錢地龍

麻黃湯

治倒靨黑陷麻黃去節五錢煎沸去沫

一方

治黑陷牛黃清心元半丸并水

護眼

痘瘡或發先用此藥則痘不入眼為害宜消毒飲助

黃栢膏或發先用此藥則痘不入眼為害宜消毒飲助

上回漿時眼腫不能開者以水濕煎服外塗點脂膏

略用手指攀開眼皮透一點風則不致生翳膜用

黃栢膏

一名神應膏黃栢一兩甘草四兩紅花二兩紫豆粉一兩半古為末清油調

從耳前至于兩眼

臙脂膏

乾臙脂不入眼調塗兩眼

一方

痘初出鼠粘子為末水調

滅癍

痘纒着赤即搽用菜子油調硬必隱成癍痕可搽則成

乾硬以酥油或白蜜潤之可搽即揭血出無妨若

之無酥則成癍痕或煎汁代之蠟硬而痛宜以真酥潤

落後宜用滅癍膏方羊骨髓一兩煉一二沸

粉一錢右研如膏每日塗瘡上○或用稀痘湯

滅癍散

細煉猪油調和塗瘡上日三次

覘子水

痘後以此洗面漸生肌肉無癍痕取活覘子

護眼滅癍

東醫寶鑑卷之二十一

二十一

稀痘湯

即秘傳稀痘湯也凡痘收靨時取此湯微溫洗面則無癢痕洗半面則半面無癢痕神效

門面

痘後雜病

痘後雜病用保元湯而再發或氣虛稟弱坐卧振搖者宜用此氣虛感風宜用消風散助龍丸愈後非時發搖目窠面赤乃心熱挾痰宜用抱龍丸方見時發愈後餘癢塞鼻中不得睡卧宜用木筆花散散喉○痘愈後心痛不可忍此餘毒歸心急服乳香散喉○痘愈後失音宜用天花散散○痘愈後喉腫走馬疳牙齦腐爛宜付搽牙散○痘愈後咽腫痛宜服七味甘桔湯○痘餘毒肝虛則入眼目肺虛則為疥癬或為癰癤而發在骨節腎之虛也齒疳在肉或咽喉腫痛宜服解毒藥消毒飲豆飲之類方

木筆花散

辛夷花為細末加麝香許以葱白蘸入鼻中數次即通

乳香散

乳香二錢水一盞煎服

天花散

天花粉七條末用白茯苓訶子肉石菖蒲甘草各等分右為末用水調半匙在碗內外以小竹

搽牙散

白梅肉燒存性白礬各二錢半人中白雞翎洗去腐爛惡肉至先以鮮血乃付藥日三次爛破付藥皆愈但鼻梁發紅點則不可治

七味甘桔湯

甘草射干各五分防風玄參鼠牙子升麻射干各三分右剉下煎服

痘後諸疾

痘後諸疾凡三條

痘後醫膜

痘後醫膜入眼生翳膜遮睛用馮青丸功觀大效初覺易治每取二丸或三丸以竹葉煎

痘後雜病

痘後諸症

痘後醫膜

湯和砂糖化下微利神效... 宜寄蒙花散通聖散... 蟬散半年內者一月取效... 後目生翳但活血解毒則疼痛自止... 不宜點藥蓋毒氣自藏過外點藥攻逼反以為害... 痘後眼腫痛或生赤脈或白膜遮睛四邊散漫者... 易治若暴遮黑睛多致失明宜用地黃散... 坊見眼腫不開黃連末... 兩足心陷者痘瘡入眼雖赤白障翳膜遮漫黑睛... 但腫子不陷者痘瘡入眼宜用决明元... 宜用蟬菊散羌菊散入耳... 明散兼用吹雲散入耳... 宜兔屎湯四皮飲... 密蒙花散為末取二錢用羊肝一大片薄批... 濕紙裹煨熟空心... 以米泔澆下... 錢乾柿一箇米泔一盞同煎俟泔盡只取柿

通聖散 錢乾柿一箇米泔一盞同煎俟泔盡只取柿

密蒙花散 宜用蟬菊散羌菊散入耳... 宜兔屎湯四皮飲... 密蒙花散為末取二錢用羊肝一大片薄批... 濕紙裹煨熟空心... 以米泔澆下

食之日

蟬猪散 燒存性... 取三分三歲兒五分... 水調服日三夜一... 蟬猪散 燒存性... 取三分三歲兒五分... 水調服日三夜一

地黃散 生地黄熟地黃當歸防風羌活蟬殼犀角木... 取五分以羊肝煮汁調服... 取五分以羊肝煮汁調服

二仙散 右判作一貼水煎服... 取五分以羊肝煮汁調服... 取五分以羊肝煮汁調服

决明元 未以兔肝和丸... 取五分以羊肝煮汁調服... 取五分以羊肝煮汁調服

蟬菊散 入蜜少許水煎服... 取五分以羊肝煮汁調服... 取五分以羊肝煮汁調服

羌菊散 石痘後生翳膜疼痛... 取五分以羊肝煮汁調服... 取五分以羊肝煮汁調服

痘後醫膜

痘後醫膜

痘後醫膜

甘草各等分右為末每

通明散 花當歸川芎赤芍藥生地黃防風乾葛甘菊天

貼水煎

吹雲散 以鵝翎管吹入耳內如左眼病吹入右耳右

兔屎湯 治痘後生翳障免尿焙為末

四皮飲 治痘後生醫葉豆黑豆赤小豆水浸取皮各

散最妙 肺膜不生醫便退

點法 治痘後醫膜生鱗魚倒懸刺項下取血點醫上

痘後癰瘡 凡痘癰必先手足及脉絡之處或有紅腫或

○痘毒流注脉絡者結核瘡癤而已甚者頭面

胃腸手足肢節痲腫作痛宜用消毒湯○痘癰瘡

血不收宜用餘毒○痘後生疔瘡疥癩宜用金

華散○痘疹餘毒○痘後生疔瘡疥癩宜用金

用犀角化毒丹○痘後生疔瘡疥癩宜用金

止若不化則多潰爛○痘後生疔瘡疥癩宜用金

研取散以雞翎初起紅腫時黑紫赤三豆醋浸

毒腫痛宜消成癩癰苦痒臘猪油塗之痘後癰

餘毒不盡變成癩癰苦痒臘猪油塗之痘後癰

消毒湯 赤芍藥連翹各一錢甘草節枯梗各五分貝

水煎服此即丹

歛肌散 黃連黃柏地骨皮五倍子甘草

金華散 黃丹黃柏黃連大黃黃芪各三錢輕粉麝香

犀角化毒丹 治痘疹餘毒未解頭面身軀多生癰瘡

痘後癰瘡

東醫圖書集成痘疹門

一兩連翹各五錢
二錢右為末每薄和每兩分作
雄黃散 雄黃一錢 雄黃一錢 雄黃一錢
綿蠻散 綿蠻一箇 須用出蟻空者以生白礬末填滿
必勝膏 右等分合和熬膏塗之
痘後痢疾 疔後下痢黃湯
赤膿血宜服
薤白湯 薤白切半盞豆豉一盞山桅子十枚
附孕婦痘瘡 宜內托散 宜內托散 宜內托散

附孕婦痘瘡 宜內托散 宜內托散 宜內托散
桂加香附烏藥胎
動宜安胎散
薤白湯 薤白切半盞豆豉一盞山桅子十枚
附孕婦痘瘡 宜內托散 宜內托散 宜內托散

單胎散 赤茯苓白朮當歸赤芍藥柴胡乾葛人參桔
柿蒂七箇砂甘草各三分瓜蒂一箇銀器用荷葉蓋
覆煎之荷葉無銀器以砂
安胎散 人參陳皮大腹皮白朮當歸川芎白芍藥香
莖分右對作一貼入燈心七
附癍疹 疹有微紅如麻子頂平軟不碍指即有清疹
者如粟米微紅如麻子頂平軟不碍指即有清疹
痘多挾疹同出麻亦多挾疹同出麻亦多挾疹同出
易子適身無空處初熱三日發起者共三日狀如
而及沒而赤白微黃不一周時許重者遍身最黑
眼亦封閉有赤白微黃不一周時許重者遍身最黑

痘後痢疾 痘後痢疾 痘後痢疾

陷○麻疹以升麻證與痘瘡大同但始終藥宜清涼○
初起見表之神方也或用蘇葛湯加蔥白紫蘇葉乃麻疹○
者死變成黑痲者亦死○麻後後餘毒內攻循衣摸
床澹語神昏者亦死○門○麻以滋其渴使毛竅中
其微汗潤澤可也○過三日不沒者內有實熱犀角
常黃湯發於皮膚解之如蚊蚤所咬故謂之赤痲今俗
謂之紅痲毒發於皮膚狀如蚊蚤所咬故謂之赤痲今俗
葛根麥門冬散○用

蘓葛湯

紫蘇葉乾葛甘草各五分

皮縮砂研各五分入葱白二莖生薑三

葱白湯

生葱去青葉取白根連鬚

葛根麥門冬散

升麻赤芍藥甘草各六分參

煎水服

單方

白礬

初生兒臍瘡及臍中汁出不止枯白礬末糝之破

伏龍肝

治小兒赤遊丹毒行於身上或井水調塗乾取

胡粉

治小兒腹上乾則再塗不急治即死鑽和

臘雪水

治小兒赤遊丹毒取水塗之乾

焰硝湯

治小兒火丹毒取硝納

地龍汁

治小兒熱病癩癩

藍葉汁

殺疳虫治小兒壯熱取

單方

煎水服

三五

黃連 殺疳虫猪肚蒸搗為丸服日三亦治

蒲黃 治小兒虛熱蜜和作

酸漿 除小兒食之能

王瓜 乾封臍治小兒痲疾良方王瓜藤經霜晒

使君子 殺小兒疳虫及蛔虫寸白

天南星 治驚風聲痰不能言及諸病後不能言南星

猪膽汁調下即

篇蓄 治小兒疳虫痛煮汁令濃飲之

苧根 治小兒惡毒瘡五色無常

五加皮 治小兒三歲不能行取皮細末每取一錢

竹葉 治小兒驚熱煎湯飲之
柳絮 兒多積可作溫服一合
龜尿 治小兒龜背取尿
鯽魚 鼻中三五日差毛髮作瘡取頭燒灰為末塗

露蜂房 治小兒赤白痢燒為末和飲服日二小便

鰲 小兒脫肛蒸勞瘦取肉作食之

蟹 小兒解願不合取蟹殼灰付之

蟬殼 小兒驚癇夜啼身熱為末和飲

躑躅 丹走皮中浸淫取

單方

本草綱目卷之九十一

三十六

烏賊魚骨 治小兒痢下為末

白僵蚕 治小兒客忤及臍風掃口 禁取

蝸牛 細研入藥和用 最勝

蟾蜍 治小兒疳積 瘡口瘡 燒為末 付之飲服

牡鼠肉 主小兒疳積 疔瘡 與食之 勿食骨 甚瘦人 骨取

雄鼠糞 治小兒齒不生 取三七粒 每日用一粒 指齒

小鰕 小兒赤白 疔毒 取

蛇 二小兒 諸瘡 燒末 猪脂 調付 乾服

蜘蛛 不能行者 燒熟 啖之 乾

蚯蚓 取地小兒 龍糞 水 和塗 之妙 蝕瘡

蜈蚣 初生小兒 口瘡 不調 半錢 灌服 乾

水蛭 法小兒 丹毒 及赤白 瘡 最妙 用 錢 乾

雀瓮 治小兒 慢驚 天漿 子 神效 蠶全 蠟各 三枚

蛙 治小兒 熱瘡 擣碎 付之 燒食 之妙 疥

壁錢 七枚 煮汁 飲之 乾

粟毛殼 丹主小兒 疔毒 及五色

蒲萄 或研酒 服之 亦佳 乾

乾柿 兒和米 粉作餅 與小

單方

東晉書 醫方 卷之二

三二

梨 治心藏風熱昏瞢燥問生梨取汁入米煮粥

脂麻 齋○若客熱擣取汁飲之

赤小豆 末治小兒丹毒及詐肥軟疔消痔烏

蓼實 和雞子白塗之

冬瓜仁 或煎服皆效

薄荷 烏主切要之藥水煮取汁飲之

馬齒莧 後癩痕及白禿瘡馬齒莧汁熬膏塗之妙

芥子 用芥子烏末白湯調如膏塗兒脚心乾則再塗

雞腸草 一合和蜜服之甚良

水芹 取汁小兒暴熱及霍亂吐利搗

人爪甲 烏小兒初生便多驚剪取父母兩手爪甲燒

亂髮灰 銚治小兒熱瘡取亂髮之甚妙

雞子 與食小兒頭身諸瘡雞子殼末和猪脂付之

白鴨 取肉小兒熱驚癇頭生瘡

鵝毛 取輕茸細毛夾布為褥冷故也

夜明砂 炒治小兒無辜瘡中任意與食

鷓鴣屎 主小兒疳積與取屎研為末

鶴鶉 熟治小兒疳積下五色取鶴鶉灸

百舌鳥 治小兒久不語取肉灸食之

單方 本草綱目卷之二十七

麝香

主小兒驚風及客忤取當門子一

牛黃

治小兒驚風迷悶和蜜水灌之禁取

熊膽

主小兒驚風或竹瀝煎服之兩

阿膠

能育神凡小兒驚風後眼中瞳子不正

虎骨

水煮作湯浴小兒去驚啼客忤虎眼睛為末竹

瀝調

兔肉

臘月取兔肉作醬食去小

猪乳汁

主小兒驚風或和朱砂取牛乳三合以綿纏浸入小兒

白禿瘡

瘡爛猪屎燒末付之頭生

狐陰莖

主小兒陰癢卵腫取

鍼灸法

或灸三壯立效風振口瘰癧驚風神庭灸七壯鼻
 上入髮際三分宛宛中灸兩蹠主之男陽女陰晝
 百會瘰癧印堂急治陰蹠風危極不可灸者先
 發急陽驚灸印堂急治陰蹠風危極不可灸者先
 當兩乳頭各三壯上男左女右大指當甲壯角以次灸髮際
 眉心顛會各三壯上男左女右大指當甲壯角以次灸髮際
 手作一處灸以三壯先脚後手亦可治陰陽諸癩艾
 半肉之間灸三壯先脚後手亦可治陰陽諸癩艾
 者如小麥大衝脈則取百會穴灸之神效植藥不效
 卒然腹皮青黑而死灸臍上下左右去臍各半寸
 弄尾骨下一寸凡五處各灸五壯仍酒和胡粉
 塗腹上乾則易變○小兒龜背灸兩俞各三
 五壯止炷如小麥○小兒龜背灸兩俞各三
 寸五分上兩行三骨節間凡六處各灸三壯依此法如
 小麥春夏兩行三骨節間凡六處各灸三壯依此法如
 灸之無效○願門不合臍上臍下各五分二穴
 各灸三壯灸瘡未發先合臍上臍下各五分二穴

鍼灸

門灸七壯脚○灸癱法穴在小兒背脊中自尾
 骶骨將手揣摸脊骨兩傍有血筋發動處兩穴每
 一穴用銅錢三文壓上穴上以艾炷安孔中灸
 七壯此是癱之根貫血之所也○小兒瘡久不
 愈亂男左女右第二脚指上灸三壯即愈○小兒
 兒雀目灸兩手大指甲後一寸內廉文頭白肉
 際各一壯○疳眼灸合谷一壯○小兒脫肛灸
 臍中三壯百會七壯○

東醫寶鑑雜病篇卷之十一

