眩量病患之護理指導

- 1. 眩暈症狀通常仍會持續數日, 請回門診繼續追蹤治療。
- 2. 如有下列情形請盡快就醫。
 - (1)眩暈症狀持續或症狀加重。
 - (2)嚴重頭痛併有噁心嘔吐。
 - (3)意識改變。
 - (4)一側手腳無力或麻痺。
 - (5)走路不穩。
 - (6)複視(看東西有重疊的影像)。
 - (7)腹痛、胸痛、背痛等令您不適的情況。
- 3. 請回神內/耳鼻喉科複診。

諮詢電話:22490088 轉 1111

臺北醫學大學·署立雙和醫院 97.07.A

H3800012

護理指導資訊-急診重症醫學部編印

眩暈病患之護理指導

- 1. 眩暈症狀通常仍會持續數日, 請回門診繼續追蹤治療。
- 2. 如有下列情形請盡快就醫。
 - (1)眩暈症狀持續或症狀加重。
 - (2)嚴重頭痛併有噁心嘔吐。
 - (3)意識改變。
 - (4)一側手腳無力或麻痺。
 - (5)走路不穩。
 - (6)複視(看東西有重疊的影像)。
 - (7)腹痛、胸痛、背痛等令您不適的情況。
- 3. 請回神內/耳鼻喉科複診。

諮詢電話:22490088 轉 1111