

## 台北醫學大學附設醫院牙科部

### 固定假牙注意事項

- 一、臨時假牙使用期間，由於臨時假牙材質強度較弱，請小心使用，不要啃食太堅硬或是太黏的食物，以免造成臨時假牙破損斷裂或鬆脫。若臨時假牙破損斷裂或鬆脫，應取下保存，回門診交由醫師進一步處理。
- 二、治療期間若有任何不適之現象，如牙齒疼痛、搖動、咬合不適或咬到臉頰或舌頭，請馬上告知醫護人員。
- 三、暫黏注意事項：
  1. 固定膺復假牙治療期間，常需要暫黏試用固定假牙，由於暫時黏合劑強度較弱，有時會造成固定假牙鬆動，固定假牙暫黏鬆動後一定要取下保存，並馬上回診處理，以防吞入及齧齒。
  2. 特別在植牙膺復物試戴期間，由於植牙無牙周帶來吸收咬合壓力，因此咬合力大過於黏劑強度或螺絲緊度，就會造成假牙鬆脫，要特別小心，一旦植牙膺復物鬆脫一定要馬上回診處理。
  3. 單顆牙冠在暫黏時期，於內側通常有一小珠珠，是為了回診時方便取下，請保持該區清潔。
- 四、永久黏合注意事項：黏合劑通常在黏合後 24 小時才會達到最大強度，因此建議患者在 24 小時內先不要使用該黏合膺復物咀嚼。
- 五、固定膺復假牙的保養方式
  1. 膺復假牙、植牙及牙齒請用牙刷清潔乾淨。
  2. 牙縫請用牙線或牙間刷清潔乾淨。
  3. 橋體與支柱牙之間，請用牙線穿引器將牙線穿過，清潔橋體與支柱牙之間的縫隙；若橋體與支柱牙牙縫很大，也可用牙間刷來清潔。
- 六、膺復假牙製做完成後，至少每六個月要回診檢查。

台北醫學大學附設醫院牙科部 關心您！

- 家庭牙科聯絡電話：(02)27372181-3211-2
- 牙髓病科聯絡電話：(02)27372181-3211-3
- 牙周病科聯絡電話：(02)27372181-3211-4
- 膺復牙科聯絡電話：(02)27372181-3211-5

醫師：\_\_\_\_\_