

Divina Tablets - 宜維娜錠

[發表藥師] :陳俐秀 藥師

[發布日期] :2003/2/5

適應症:

動情素缺乏，更年期諸症狀，無月經症，月經過少，荷爾蒙取代療法(如:

卵巢切除手術後之治療)。

藥理作用:

本劑模仿女性正常生理週期時之荷爾蒙分泌，先是 11 天的動情素期，所

以前 11 粒白色錠劑所含的是天然動情素的酯化物 (Estradiol Valerate);然

後是 10 天的動情素加黃體素期，故，後 10 粒藍色錠劑包含了 Estradiol Valerate

和天然黃體荷爾蒙的衍生物(Medroxyprogesterone acetate)，藉此機制來治療上述的

適應症。

用法:

(1) 每天一次，一次一粒，先從白色錠劑開始服用，11 天後改為藍色錠劑，接著

休息 7 天再開始服用第 2 包。

(2)最好是晚間服用，若是忘記，可在第 2 天早晚各服一顆。

(3)已經停經者隨時可開始此療程，尚未停經者在月經來潮第 5 天起開始服藥。

用藥指導:

(1)停藥的那7天中，大部分的人會有出血現象。

(2)有些患者禁服本藥，如:孕婦、腦血管障礙、鎌形血球貧血症…等，所以本藥請依醫師處方來使用。

(3)服用本藥可能有些許副作用，如:噁心、乳房脹痛感、頭痛等，請無需驚慌，若有特殊嚴重的變化請馬上告知醫師。

!!健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。