

Baraclude TabletR - 貝樂克膜衣錠

[發表藥師] :吳其玲 藥師

[發布日期] :2008/11/5

貝樂克(Baraclude)成分為 Entecavir, 在民國九十五年正式在台上市,是一種口服的鳥糞嘔呤核糖類似物,主要是藉由抑制 B 型肝炎病毒聚合酶的活性,來達到抑制 B 型肝炎病毒複製的作用,用於治療有 B 型肝炎病毒複製跡象的成人慢性 B 型肝炎, 研究指出服用貝樂克發生抗藥性的發生率較其他 B 型肝炎治療藥物低。

衛生署核准的劑型包括口服錠劑及口服液劑兩種, 須依醫師處方服用, 切勿因症狀改善而擅自停藥。對於未曾接受核糖治療的成人和 16 歲以上青少年, Baraclude 每日單一口服建議劑量為 0.5 毫克。對於在 Lamivudine 治療期間有 B 型肝炎病毒血液跡象或有 Lamivudine 抗藥性突變的成人和青少年(16 歲以上), 建議劑量是每日一次 1 毫克。Baraclude 應空腹服用(飯前至少 2 小時及飯後至少 2 小時)。每一種藥都有產生副作用的可能性, 本藥常見的副作用包括腹瀉、消化不良、頭痛及頭暈等, 對於貝樂克成份過敏者, 不宜使用。此外, 本藥於孕婦、哺乳及小孩的安全性尚未完全確立, 因此服用本藥仍須經過謹慎評估。

!!健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼, 但不可取代實際的醫療行為, 所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。