

Cialis® - 犀利士膜衣錠

[發表藥師] :陳木龍 藥師

[發布日期] :2008/8/21

根據統計，台灣約有七十二萬名男性有勃起功能障礙的困擾，年齡集中於四十至七十歲，但其中只有 20% 曾經尋求醫療，比例相當低，目前勃起功能障礙的治療，已有不錯的效果。

除了大家耳熟能詳的威而剛，另外還有犀利士。犀利士作為治療勃起功能障礙的藥物，其成分為 Tadalafil。當性刺激造成氧化氮(nitric oxide)局部釋出時，平滑肌放鬆，血流流入陰莖而勃起。若無性刺激，則 tadalafil 沒有作用。

犀利士的建議劑量為 10 公絲，至少在性行為前 30 分鐘服用本藥，進食與否則不受影響。服藥最多一天一次，極不鼓勵持續每日用藥，因為長時間每天用藥的安全性資料尚未建立，而且 tadalafil 之藥效通常能持續超過一天。

特別值得注意的是，本藥品絕對不可與硝酸鹽類藥品併用，否則會有低血壓的危險。所以，患有心血管疾病的病患，應充分和醫師討論您是否適合服用本藥品。若服用本藥品後持續勃起 4 小時或更久，應立即尋求醫療協助。另外，本藥品不適用於 18 歲以下病患。

犀利士為處方藥，為保障用藥安全，有這方面困擾的民眾，請務必經過醫師的診斷與處方，為您建議合適的藥物。

!!健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行

爲，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。