

麗歐迅外用液(Cleocin T® Topical Solution 1%)

- ❖ 適應症：尋常性痤瘡
- ❖ 用法用量：每日兩次，將一層 Cleocin T Topical Solution 薄膜施於患部。包裝容器皆隨時保持緊閉。
- ❖ 使用說明：1. 第一次使用時，先將原容器的蓋子取下丟棄，再將盒子內附之接頭的包裝拆開，用力按壓將接頭與瓶身組裝在一起（務必緊密接合，不可有縫隙）。
 2. 將患部先清潔乾淨。
 3. 旋開上方瓶蓋，將瓶身倒立，使藍色接頭部份完全浸潤到藥水，即可直接塗抹於患部。
- ❖ 副作用：1. 接觸性皮膚炎
 2. 刺激感（如紅疹、鱗屑剝落、與燒灼感）
 3. 皮膚油膩
 4. 革蘭氏陰性毛囊炎
 5. 腹痛
 6. 腸胃不適
- ❖ 注意事項：1. Cleocin T Topical Solution 含有醇基劑，會引起眼燒灼感與刺激；若意外接觸敏感的體表（眼、擦傷的皮膚、黏膜），則以大量自來水沖洗；此溶液劑的味道不佳，於嘴巴周圍塗藥時尤需小心。
 2. Cleocin T 需審慎處方用於異位性體質病人。
 3. 除非有明確的需求，懷孕期間不可使用本劑。
 4. 病人於用藥期間不可哺乳

保存方法：貯存於室溫（15°C~30°C），避免冰凍。