

Rifampicin® (Rifampicin 150 mg) - 立汎黴素膠囊

[發表藥師] :護理指導 藥師

[發布日期] :2006/9/1

[藥品效用]

治療結核病，且需長期服藥達數個月，切勿因症狀緩解而擅自停藥。

[服用指示]

1. 擅自減藥、停藥可能造成多重抗藥性菌種產生，或再變成開放性結核病而傳染他人，故請配合醫師的指示服藥，絕對不可自行停藥。
2. 此藥應空腹服用(即飯前 1 小時或飯後 2 小時)。
3. 請務必按時服藥。忘記服藥請盡快服用；若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。

[注意事項]

1. 若您有肝臟疾病，請告知您的醫(藥)師。
2. 若您對此藥或其他藥物過敏，請告知您的醫(藥)師。
3. 為確知藥物交互作用情形，若您同時有服用其他藥品，請主動告知醫師。
4. 服藥期間，身體的分泌物或排泄物會變為橘紅色(如汗液、尿液等)，此為正常現象，不會影響正常生理功能，請勿驚慌。
5. 此藥會影響口服避孕藥的效果，故必要時，請採用其他避孕措施，如保險套。

[副作用]

1. 每一種藥都有副作用，若出現噁心、嘔吐、胃腸不適等，請勿太驚慌，這些症狀會隨時間慢慢改善。

2. 上述症狀若持續且加重，或有以下情形，須立即請醫師處置：異常肌肉疼痛、皮膚發疹或紅斑、不正常出血。

3. 部份病患之肝功能指數可能上升，故如果您有食慾不振、異常疲倦、虛弱，甚至出現眼睛及皮膚泛黃、尿液顏色變深等症狀，請立即聯絡您的醫師。

!!健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。