

Topamax - 妥泰

[發表藥師] : 方若穎 藥師

[發布日期] : 2005/8/3

Topamax (topiramate) 是種嶄新的抗癲癇藥物。用於成人及二歲以上兒童局部型癲癇或併有Lennox-Gastaut 症候群的癲癇及原發性全身性強直陣攣癲癇的輔助治療，及偏頭痛的預防。

適應症: 癲癇，偏頭痛的預防

用法：

Topamax 有錠劑 (100mg) 及分散型膠囊兩種劑型 (25mg)，建議由低劑量開始治療，再逐漸增量至有效劑量。建議不要將錠劑剝開，不能吞服錠劑的病人 (如兒童及老年人)，可服用分散型膠囊，此分散型膠囊可整顆吞服，亦可將膠囊小心剝開再將所有的膠囊內容物灑佈於少量的軟質食物吞服，無須咀嚼。不需於餐後服用。

注意事項：

抗癲癇藥物，包括 Topamax，需逐漸停藥以降低發作頻率增加的危險性。某些病人，特別是易罹患腎結石的病人，可能會增加腎結石形成的危險性，建議給予足量的水分以降低此危險性。

副作用：

嗜眠、暈眩、神經過敏、步履不穩、疲倦

!!健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行

爲，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。