

Xalatan - 舒而坦 眼藥水

[發表藥師] : 盧庭生 藥師

[發布日期] : 2004/11/4

<劑型與包裝>:

每一毫升的 Xalatan 含有 50mcg 的 Latanoprost 以及 0.2mg/ml 的 benzalkonium chloride. 每一滴約含有 1.5 μ g Latanoprost. 每瓶含有 2.5 毫升的眼藥水，約相當於 80 滴的眼藥水

<適應症>: 青光眼及降低眼壓過高患者之眼內壓.

<用法用量與投藥方式>:

(1) 成人(包括老年人)

於晚間投與 Xalatan 可獲得最佳效果. Xalatan 的劑量為每日投藥次數不應超過一次，因為有報告指出，增加投藥之頻率會減低其降眼壓之作用. 眼內壓在投藥後大約三到四小時後開始降低，在投藥後八到十二小時達到最大的效果. 其眼壓下降效果可持續至少二十四小時.

(2) 兒童: 對兒童之安全性及有效性資料至今仍為建立，因此不建議兒童使用 Xalatan.

(3) 懷孕及授乳: 本藥品不會增加自發性新生兒缺陷之發生率. 在懷孕期間，只有在衡量所得之益處大於其對胎兒之潛在危險時，才可使用 Xalatan. Xalatan 內之活性成分會進入乳汁，故哺乳之婦女應小心使用.

<藥理性質>:

Latanoprost 的活性成分為一種 prostaglandin F2 α 衍生物，為一選擇性 prostanoid FP 受體作用劑，可藉由增加眼房水液之流出量來減少眼壓。

<使用注意事項>:Xalatan 對瞳孔無作用，故對於急性隅角閉鎖性青光眼治療時，可能須與 pilocarpine 縮瞳劑或週邊虹膜切開術合併使用。由於隱形眼鏡可能會吸收 Xalatan 所含之 benzalkonium chloride，所以在使用本品點眼之前應將隱形眼鏡摘除，在投藥 15 分鐘之後才可重新配戴。另外投與點眼滴劑會造成短暫之視覺模糊，故對開車及操縱機械能力有所影響。

<不良反應>:

Xalatan(1)會造成虹膜色素沉積的增加。

(2)可能會使睫毛變黑變厚變長。

(3)會引起輕微的異物感。長期使用約有 10% 的病人會產生輕微的結膜充血，而大約 1% 病人會產生中度結膜充血。

<儲存>:

(1)避光

(2)儲存於冷處(攝氏 2 到 8 度)

(2)一旦開啓容器後，必須於四個星期內用完，此時可儲存於攝氏 25 度之室溫。

!!健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。