

PROTOPICOR ointment - 普特皮OR 軟膏

[ 發表藥師 ] :朱育瑩 藥師

[ 發布日期 ] :2003/8/5

PROTOPICOR 軟膏適用於，無法耐受其他傳統治療的中度至重度的異位性皮膚炎，作為短期及間歇性長期治療。

PROTOPICOR 軟膏含有 tacrolimus，是一種由鏈黴菌製造的免疫抑制劑，僅供局部皮膚使用。

Tacrolimus 用於異位性皮膚炎的作用機制仍未知，但已被證實，可以抑制 T 型淋巴球的活化及多種引起過敏發炎反應的物質。

PROTOPICOR 軟膏 0.03%及 0.1%二者都可以用於成人，而只有 0.03%軟膏可以用於 2-15 歲的兒童。在患部皮膚上塗抹薄薄一層軟膏，並且徹底的輕輕柔搓，每天使用兩次。異位性皮膚炎的症狀消失後，應繼續使用一週。在使用軟膏的頭幾天，常會引起如皮膚灼熱、刺痛或搔癢的症狀，但通常會隨著異位性皮膚炎病灶的癒合而改善。

使用 PROTOPICOR 軟膏應注意以下幾點：

- 1.本藥需要由醫師處方使用
- 2.軟膏僅供外用，如果手不是治療範圍，則用軟膏之後須洗手。
- 3.在使用軟膏期間，應盡量減少或避免暴露於日光下。
- 4.使用後若有任何皮膚或身體上不適，應告知醫師。

**!!健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行**

爲，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。