| • 系統編號 | RN9305-0383 | | |
|----------|--|--------|---------------------|
| • 計畫中文名稱 | 同時活化的 JAK1 和 JAK2 於細胞激素依賴型之幹原母細胞中功能角色的探討 | | |
| • 計畫英文名稱 | | | |
| • 主管機關 | 行政院國家科學委員會 | • 計畫編號 | NSC90-2320-B038-051 |
| • 執行機構 | 臺北醫學大學細胞及分子生物研究所 | | |
| • 本期期間 | 9008 ~ 9107 | | |
| • 報告頁數 | 5 頁 | • 使用語言 | 中文 |
| • 研究人員 | 黃惠美 Huang, Huei-Mei | | |
| • 中文關鍵字 | 酷胺酸磷酸化; 訊號傳遞 | | |
| • 英文關鍵字 | Tyrosine phosphorylation; Signal transduction; JAK | | |
| • 中文摘要 | 細胞激素誘導不同的訊號途徑來調控血球細胞的形成。Janus kinases(JAKs)被發現在一些訊號途徑中扮演著重要的角色。在大部份的例子中特定的細胞激素可以同時活化一個以上的 JAK。然而同時活化的 JAK 如何影警細胞的活性並不清楚。我們之前的實驗結果顯示同時轉殖 CDJAK1 和 CDJAK2 的血球幹原母細胞株於抗體聚集後可偵測到磷酸化訊號包括 STAT5、MAPK 和 Akt 的酪胺酸磷酸化。在現今的研究,進一步地利用 JAK1 或 JAK2 inactive mutants(KE)取代其中一個 JAK,所得到的兩個細胞株分別為 Ba/F3-JAK1KE+2 和 Ba/F3-JAK1+2KE。確實於抗體聚集後可以抑制或降低 STAT5,MAPK 和 Akt 的酪胺酸磷酸化以及細胞增生的活性。這些結果顯示,JAK1 和 JAK2 被活化所產生的協同作用可以提供訊號傳遞和細胞增生的活性。 | | |
| • 英文摘要 | Cytokines are able to induce various signaling pathways during hematopoiesis. Janus kinases (JAKs) were found to play a very important role in some signaling pathways. In most cases, more than one JAK will be simultaneously activated by specific cytokine. However, it is not clear that how simultaneous activated-JAKs can affect cellular activity. Our previous results have shown that phosphorylation signaling, including tyrosine phosphorylation of STAT5, MAPK and Akt, can be detected after antibody cross-linking in hematopoietic progenitor cells co-transfected with CDJAK1 and CDJAK2. In present study, one of JAKs was replaced by JAK1 or JAK2 inactive mutants (KE). The resulted two cell lines, Ba/F3-JAK1KE+2 and Ba/F3-JAK1+2KE, respectively, indeed produce either inhibited or reduced phosphorylation profiles of STAT5, MAPK and Akt, as well as proliferation activity of cells after antibody | | |

cross-linking. These results show that both JAK1 and JAK2 need to be activated to produce synergistic effect for signal transduction and cellular proliferation.