

<藥物效用>

- 1.精神科用藥
- 2.妥瑞氏症候群用藥
- 3.治療兒童嚴重行為問題用藥

<服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示，請勿擅自停藥或更改劑量。
- 2.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥時，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。
- 3.請隨餐服用，可避免胃腸不適。
- 4.服用此藥期間，請避免喝酒。

<注意事項>

- 1.假若你有懷孕或是哺乳，請在服用此藥前告知你的醫(藥)師。
- 2.如果您有帕金森氏症或對本藥成分過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.服用此藥時，應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥品。其中特別要注意的有：安眠藥、憂鬱症用藥、鎮靜劑、感冒藥、抗過敏藥、其他精神科用藥等。
- 4.若您有心臟疾病、肺疾病、癲癇、前列腺肥大、青光眼、排尿困難、憂鬱症，請告知您的醫(藥)師。
- 5.服用此藥時，可能會引起困倦或眩暈，應避免駕車或操作具有危險性的機械。
- 6.這個藥品可能會造成你對冷熱溫度較為敏感。
- 7.這個藥品可能會造成你對陽光敏感，因此外出時記得使用防曬用品。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：暈眩、焦慮、口乾、食慾不好、噁心、便秘、視力改變、乳房腫脹，這些症狀會隨時間慢慢減弱。
- 2.上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形，請立即聯絡您的醫師：發燒、肌肉僵硬、臉頰下巴痙攣、眼睛顫動、呼吸心跳過快、遲發性運動困難(無法控制的肌肉活動)。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行爲，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。