

<藥物效用>

此藥為直接作用血管擴張劑，可用來治療高血壓。

<服藥指示>

1. 請依照醫師的指示飯後服藥，請勿擅自停藥。
2. 如果忘記服藥，請盡快服用；假如已接近下次服藥的時間，只要服用下次的用藥就好。不可一次服用兩次的藥量。
3. 當您使用本藥來控制血壓時，請記得高血壓無法根治，若您自己覺得病情改善也不可突然停藥，必須先請教您的醫師。

<注意事項>

1. 若您計畫(已)懷孕、哺乳，或有肝、腎、心臟方面疾病、腦血管疾病、冠狀動脈疾病或紅斑性狼瘡，請告知您的醫(藥)師。
2. 若您對本藥過敏，請告知您的醫(藥)師。
3. 若您有服用其他心血管藥物或鎮靜劑、抗憂鬱劑，請告知您的醫(藥)師。
4. 在服用本品的初期，可能會影響反應能力，因此開車或操作機械請小心。
5. 服用本品時應避免飲酒。

<副作用>

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：頭痛、頭暈、面潮紅、鼻塞、嘔吐、心悸、胃腸不適。這些症狀會隨時間慢慢減弱。
2. 上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：突然的發燒、水腫、節痛、胸痛、呼吸困難、過敏起疹、震顫、抽搐。請立刻聯絡您的醫師。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。