

<藥物效用>

此藥是用來治療失眠，舒緩焦慮。

本藥品亦可用於治療其他疾病，若需進一步的資訊，可請教您的醫(藥)師。

<服藥指示>

- 1.本藥品不受食物影響，可於空腹或飯後服藥。
- 2.如果忘記服藥請盡快服用；若已接近下次服藥時間，只要服用下次的用藥就好。不可一次服用兩次的藥量。
- 3.服藥一段時間之後即使症狀已改善，仍應遵造醫師指示慢慢減量，不可突然自行停藥。

<注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳或有糖尿病、肝、腎、心臟疾病或青光眼方面的疾病，請告知您的醫(藥)師。
- 2.服用此藥時，除非確定該藥物不會引起睏倦或眩暈，否則不該駕車或操作具有危險性的機械。
- 3.服用此藥期間，避免喝酒或其他中樞神經系抑制劑。
- 4.具有成癮傾向(如癮君子及酒精中毒)的人，服用此類藥物時，應密切加以督導，因為此類患者對藥物特別容易產生習慣性和依賴性。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：思睡、眩暈、虛弱、心悸、頭痛、皮膚過敏、噁心嘔吐及情緒不穩如有發生，則通常是在治療之初。這些症狀會隨時間慢慢減弱。
- 2.上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：定向力障礙、憂鬱、胃口改變、睡眠障礙、激動請立刻聯絡您的醫師。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。