

<藥物效用>

- 1.可用於治療帕金森氏症
- 2.治療因其他藥物引起的副作用

<服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示，請勿擅自停藥或更改劑量。
- 2.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥時，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。
- 3.服用此藥期間，請避免喝酒。

<注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳，請告知您的醫(藥)師。
- 2.如果您對本藥成分過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.服用此藥時，應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥品。其中特別要注意的有：安眠藥、憂鬱症用藥、鎮靜劑、感冒藥、抗過敏藥、肌肉鬆弛劑等。
- 4.若您有狹角性青光眼、胃腸道疾病、肝臟疾病、腎臟疾病、心臟疾病、前列腺肥大，請告知您的醫(藥)師。
- 5.另外其有導致眩暈及嗜睡的副作用，服用時避免從事需要集中注意力的事如開車或操縱機械
- 6.服用此藥可能會減少流汗，請避免劇烈運動或待在炎熱的地方。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：口乾、眩暈、輕微視力模糊、輕微噁心、情緒緊張的情形，這些症狀會隨時間慢慢減弱。
- 2.上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形，請立刻聯絡您的醫師：嚴重噁心嘔吐、情緒極度激動、心跳不規則、排尿疼痛、幻覺。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。