

<藥物效用>

刺激結腸蠕動、引發排便。可使用於暫時緩解便秘，診斷及手術前清腸。

<服藥指示>

- 1.請按照醫師指示使用。
- 2.忘記使用請儘快使用，若已接近下次使用時間，只要使用下次的藥量，不可一次使用兩次藥量。

<注意事項>

- 1.使用前需用肥皂和清水將手徹底洗淨。除去栓劑之外包裝後使用，如可能的話，請帶上指套或手套，用手指把栓劑尖端部份塞入肛門括約肌直到超過約 2.5 公分深的位置(如果沒有插入超過此深度，栓劑可能會被排出)。塞入後持續躺下約 15 分鐘以防栓劑被排出。
- 2.栓劑如變形時，以原包裝浸於溫水(40~50°C)中，軟化後再浸於冷水(20°C 以下)即可凝固。
- 3.孕婦或授乳婦女請告知您的醫師或藥師。
- 4.若對此藥有過敏現象，請停止使用並告知您的醫師或藥師。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，使用無祕®栓劑可能會發生腹部不適，包括絞痛與腹痛。
- 2.上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形，請立刻聯絡您的醫師：過敏、水樣便(腹瀉)等。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。