

<藥物效用>

此藥是屬於抗躁劑，用於治療躁症、預防躁鬱症

<服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示，請勿擅自停藥或更改劑量。
- 2.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥時，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。
- 3.請維持正常飲食包括鹽及水分的攝取

<注意事項>

- 1.假若你有懷孕或是哺乳，請在服用此藥前告知你的醫(藥)師。
- 2.如果您對本藥成分過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.服用此藥時，應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥品。其中特別要注意的有：利尿劑、癲癇用藥、帕金森氏症用藥、抗感染用藥、消炎止痛藥、其他精神科用藥等。
- 4.若您有腎臟疾病、心臟血管疾病、嚴重衰弱、脫水、甲狀腺疾病、腦神經疾病，請告知您的醫(藥)師。
- 5.服用此藥時，可能會引起困倦或眩暈，應避免駕車或操作具有危險性的機械。
- 6.醫生將會定期檢查您的血液和尿液，請定期回診。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：手部輕微震顫、輕微噁心、輕微口渴，這些症狀會隨時間慢慢減弱。
- 2.上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形，請立即聯絡您的醫師：過敏反應、嚴重口渴、排尿次數改變、心跳不規則、嚴重頭痛、嘔吐、腹瀉、全身虛弱。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。