

#### <藥物效用>

- 1.治療某些類型的癲癇發作。
- 2.治療三叉神經痛。

#### <服藥指示>

- 1.請按照醫師指示服藥。
- 2.忘記服藥請儘快服用，若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥，不可一次服兩次藥量。
- 3.若您有同時服用兩種以上水劑藥品，請勿與「癲舒液」併服。

#### <注意事項>

- 1.孕婦或授乳婦女請告知您的醫師或藥師。
- 2.若對此藥有過敏現象，請停止服用並告知您的醫師或藥師。
- 3.請告知醫師或藥師您正在服用的藥物(包含非處方藥)，特別是用來治療抽搐的藥物、治療感冒或過敏的藥物、鎮定劑，以及維他命等。癲舒液會影響其他藥物的效用，因此請詳細告訴醫師您所服用的藥物。
- 4.請告知醫師或藥師，您目前或曾經患有的疾病史。
- 5.此藥品可能導致嗜睡，服藥後不宜開車或操作機械。
- 6.酒精會加重的嗜睡作用，服用此藥期間請避免飲酒。

#### <副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：嗜睡、嘔吐、胃痛、食慾不振、便秘、腹瀉、出現幻覺、失眠、煩躁不安、易怒(特別是小孩)、頭痛、行動不協調、說話困難、口乾、嘴巴或舌頭刺激，等症狀。
- 2.若上述症狀持續，或加重或有下列症狀，請立刻通知醫師：皮膚紅疹、發癢，容易瘀青，皮膚小紫斑狀，流鼻血，不正常出血，皮膚或眼睛變黃，發燒，喉嚨痛，嘴巴痛，心律不整，關節疼痛，昏厥，腳部或下肢腫大，抽搐。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。