

<藥物效用>

此藥為中樞性甲型(a)交感神經作用劑，可用來治療高血壓等心血管疾病。

<服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示飯後服藥，請勿擅自停藥。
- 2.如果忘記服藥，請盡快服用；假如已接近下次服藥的時間，只要服用下次的用藥就好。不可一次服用兩次的藥量。
- 3.當您使用本藥來控制血壓時，請記得高血壓無法根治，若您自己覺得病情改善也不可突然停藥，必須先請教您的醫師。

<注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳或有腎臟、心血管疾病，請告知您的醫(藥)師。
- 2.若您對本藥過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.若您有服用其他心臟血管用藥或三環抗憂鬱藥等，請告知您的醫(藥)師。
- 4.服用此藥時，應避免喝酒。
- 5.服用此藥的初期可能會有暈眩的症狀,應避免駕車或操作危險的機械。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：頭昏眼花、口乾、便秘、皮膚發癢紅斑，這些症狀會隨時間慢慢減弱。
- 2.上述症狀若持續且加重，或有以下少見的情形：心跳過慢、胸痛等，請立刻聯絡您的醫師。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。