

<藥物效用>

痛風發作及痛風性關節炎之緩解與預防

<服藥指示>

1. 請按照醫師指示服藥。
2. 痛風發作時請儘快服用此藥，通常在 12 小時內疼痛可以減輕，48 至 72 小時內痛風症狀可以解除。
3. 忘記服藥請儘快服用，若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥，不可一次服兩次藥量。

<注意事項>

1. 孕婦或授乳婦女不建議使用此藥，若有需要請告知您的醫師或藥師。
2. 若對此藥有過敏現象，請停止服用並告知您的醫師或藥師。
3. 下列患者請告知您的醫師，並慎重投與：老年人、腎疾病、胃腸疾病和心臟疾病的患者。

<副作用>

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情況：噁心、嘔吐，這些症狀會隨時間或與食物併服慢慢減弱。
2. 若上述症狀加重或出現以下情形，請立即與醫師聯絡：嚴重腹瀉、皮疹、血尿、少尿、貧血、白血球減少、血小板減少時，應立即停止使用本藥品，並立即與醫師聯絡。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。