

#### <藥物效用>

Ulsamin 能夠局部性保護潰瘍部位，與細胞表面的蛋白質形成保護膜，保護新形成的黏膜細胞。

#### <服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示，請勿自行停藥或更改劑量。
- 2.忘記服藥時請盡快服用，若接近下次服藥時間，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。
- 3.於空腹或飯前 1 小時使用。
- 4.請與制酸劑間隔兩小時使用。

#### <注意事項>

- 1.須整粒吞服；不可咬碎或撥半
- 2.固定於早上時間服用，藥效可持續一天
- 3.CONCERTA 為持續釋效錠，若糞便中有空的藥物外膜，為正常情形
- 4.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥請盡快服用；若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。

#### <副作用>

1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：頭痛、暈眩、失眠、緊張、腸胃不適、食慾降低。

上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形，請立刻聯絡您的醫師：孩童之發育減緩、癲癇、視覺改變、食道、腸胃道阻塞。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。