

#### <藥物效用>

防止或抑制產後乳汁分泌，可改善漲乳與乳房疼痛感，或治療高乳促素血症引起之症狀，如閉經、月經過少、排卵停止和乳漏等。

#### <服藥指示>

- 1.請按照醫師指示服藥，建議隨餐服用。
- 2.忘記服藥請儘快服用，若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥，不可一次服兩次藥量。

#### <注意事項>

若您有下列情形，請事先告知您的醫師或藥師：

- 1.對本藥或麥角鹼類有過敏反應者
- 2.準備要懷孕，或已懷孕及授乳婦女。
- 3.本身具有嚴重心血管疾病、雷諾氏症候群、肝病、腎功能不全、消化性潰瘍、胃腸道出血病患、精神方面疾病病史，或是患高血壓或正服用降血壓藥物。
- 4.開始服用本藥的頭幾天較易有困倦的情形，開車、操作機械或執行其他事物時，應特別小心，以免發生危險。

#### <副作用>

每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：困倦、暈眩、頭痛、噁心、腹痛、血壓下降、無力、潮紅、精神狀態變化等，這些症狀通常是暫時性的，且會隨時間慢慢減弱，若情況未改善或惡化，請立即與醫師連絡。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。