

<藥物效用>

- 1.緩解慢性便秘
- 2.降低血中氨的濃度

<服藥指示>

- 1.請依醫師指示服用。
- 2.服用此藥可能會有不好的口感，可以和水或果汁一起服用，通常在 24-48 小時之後就會產生便意。
- 3.請務必按時服藥，忘記服藥當想起時，請盡快補服，下次就恢復正常的時間服藥；若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。

<注意事項>

- 1.爲了幫助便秘的緩解，每天至少喝 6-8 杯(約 2000c.c.左右)的水或果汁，並經常運動和攝取高纖維的食物(如：水果)。
- 2.假如您有糖尿病、懷孕、授乳、或正在服用其他藥物，須先告知您的醫生。
- 3.假如您連續腹瀉或胃腸不適超過兩個星期，請告知您的醫生。
- 4.要降低血中氨的濃度，此藥應會使您一天排便 2-3 次。

<副作用>

- 1.服用此藥若有輕微腹瀉及脹氣、噁心、食慾不振應減量或停止服用。
- 2.若出現不明原因腸道過度活動(如：腹絞痛、嚴重且持續的腹瀉)，應該停止使用此藥，若症狀持續沒有改善，請聯絡醫生。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行爲，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。