

<藥物效用>

舒解噁心、嘔吐、胃灼熱、腹部疼痛、脹氣、食慾不振，和餐後持續的脹滿感等上腸胃道蠕動不良之症狀。

<服藥指示>

- 1.請按照醫師指示服藥。
- 2.忘記服藥請儘快服用，若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥，不可一次服兩次藥量。

<注意事項>

1. 胃斯妥®持續膠囊應整粒吞服。若吞服有困難，可將膠囊打開服用，但不可壓碎或嚼碎。
2. 孕婦或授乳婦女請告知您的醫師或藥師。
3. 事先告知醫師同時服用的其他藥品，例如麻醉性止痛藥、精神相關用藥或胰島素。
4. 事先告知醫師是否患有(或曾經患有)腎上腺瘤、癲癇、帕金森氏病、高血壓、心、肝、腎臟疾病、精神相關疾病、腸道阻塞或出血。
5. 服用此藥可能會造成嗜睡或暈眩，在開車或操作危險機械前，應先確知藥品對您的影響，避免危險。
6. 酒精會加強嗜睡作用。
7. 若對此藥有過敏現象，請停止服用，並告知您的醫師或藥師。

<副作用>

1. 每一種藥都有副作用，使用此藥可能會發生嗜睡、疲倦、便秘或腹瀉等副作用。
2. 上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形，請立刻聯絡您的醫師：過敏現象、四肢或眼睛不自主運動，頸、臉、顎部肌肉的痙攣，說話或吞嚥困難，心跳變快或不規則等。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。

