

<藥物效用>

一般便秘、習慣性便秘、急性腸加答兒、痢疾、赤痢及其他必要排便之浣腸。

<服藥指示>

- 1.請依照醫師指示服用，需要解便前使用一次，大約 10-15 分鐘會產生藥效。
- 2.使用時身體左側躺下，右膝上彎，將容器之先端塑膠蓋取掉後，再把其先端插入肛門後將藥液慢慢注入。藥液完全注入完後，請先躺著並忍個 10-15 分鐘後，讓藥液有足夠的作用時間，再去上廁所。
- 3.使用前、後，請記得用肥皂洗手。
- 4.此藥為外用浣腸製劑，切勿口服使用。

<注意事項>

- 1.有特殊疾病者(例如患有心臟、腎臟、肝臟疾病者)或是懷孕及哺乳婦女，請告知醫師。
- 2.當症狀沒改善或更加嚴重者，就不要再使用此藥了，並告知您的醫生。
- 3.此藥不該持續使用超過一星期。長期使用此藥會使您對瀉劑產生依賴，使腸道失去正常的蠕動能力。因此除非有醫生處方或特別交代，否則此藥不宜長期連續的使用。
- 4.為了幫助便秘的緩解，每天至少喝 6-8 杯(約 2000c.c.左右)的水或果汁，並經常運動和攝取高纖維的食物(如：水果)。

<副作用>

偶而會出現一些噁心頭痛的現象，但若出現不明原因的嚴重嘔吐或腹痛者，應該停止使用此藥，若症狀持續沒有改善，請聯絡醫生。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。