

<藥物效用>

主要用於治療黑色素瘤、慢性髓性白血病；不可開刀之復發或轉移性卵巢癌；並可與輻射線併用，以控制於頭及頸鱗狀細胞癌。

<服藥指示>

1. 請按照醫師指示服藥。
2. 盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥時，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。
3. 若無法吞服膠囊之病人，可以將膠囊內容物直接倒入一杯水中並立刻服用。

<注意事項>

1. 治療期間應避免懷孕，若有懷孕可能或已懷孕應立即告知醫生。
2. 如果您對本藥成分過敏，請告知您的醫(藥)師。

<副作用>

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：口炎、噁心、嘔吐、丘疹、臉部紅斑、頭痛、暈眩，這些症狀會隨時間或停止治療後漸漸改善；另有白血球低下、貧血之情況，醫師亦會透過定期檢查以監測病人情形。
2. 上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形，請立刻聯絡您的醫師：發燒、寒?、全身倦怠之情形，請立即與醫師聯絡。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。