

<藥物效用>

- 1.癲癇治療藥物
- 2.精神疾病用藥

<服藥指示>

- 1.此藥需長期服用，請依照醫師的指示，不可自行停藥或更改劑量。
- 2.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥時，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。

<注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳，請告知您的醫(藥)師。
- 2.如果您對本藥成分過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.服用此藥時，應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥品。其中特別要注意的有：口服避孕藥、其他癲癇用藥、鎮靜安眠藥、結核病用藥、賀爾蒙等。
- 4.若您有心臟疾病、肝臟疾病、腎臟疾病，請告知您的醫(藥)師。
- 5.醫師可能會監測您的血液數值，請定期回診。
- 6.另外其有導致眩暈及嗜睡的副作用，服用時避免從事需要集中注意力的事如開車或操縱機械。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：噁心、暈眩、頭痛、嗜睡、失眠，這些症狀會隨時間慢慢減弱。
- 2.上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形，請立刻聯絡您的醫師：過敏反應、皮膚黏膜發疹或出現紅斑、血便、視線模糊。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。