

<藥物效用>

帕金森氏症

<服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示，請勿擅自停藥或更改劑量。
- 2.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥時，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。
- 3.服用本品時，應與食物一起併服。
- 4.請整粒吞服，不可將膠囊打開服用。

<注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳，請告知您的醫(藥)師。
- 2.如果您對本藥成分過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.服用此藥時，應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥品。其中特別要注意的有：其他巴金森氏症藥物、安眠藥、憂鬱症用藥、鎮靜劑、感冒藥、抗過敏藥等。
- 4.若您有青光眼、嚴重內分泌疾病、腎臟病、心臟病、肝臟病、心肌梗塞、冠狀動脈循環不良、心律不整，請告知您的醫(藥)師。
- 5.另外其有導致眩暈及嗜睡的副作用，服用時避免從事需要集中注意力的事如開車或操縱機械。

<副作用>

每一種藥都有副作用：食慾喪失，噁心嘔吐(可以與食物一起併服來改善)。上述症狀若持續且加重，或有其他少見的情形，請立刻聯絡您的醫師。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。