

<藥物效用>

本藥是用於治療心室性心律不整。

<服藥指示>

- 1.服藥時請併服大量液體，最好採坐姿且飯後服用。
- 2.如果忘記服藥，請盡快服用；若已接近下次服藥的時間，只要服用下次的用藥就好。不可一次服用兩次的藥量。

<注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳或有肝、腎、心臟方面疾病、癲癇、低血壓、電解質不平衡等，請告知您的醫(藥)師。
- 2.若您對於本藥過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.若您有服用其他藥物，特別是 Quinidine(心臟用藥)或 Theophylline，請告知您的醫(藥)師。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：胃腸不適、暈眩、肌肉震顫、運動失調、緊張不安、頭痛。這些症狀會隨時間慢慢減弱。
- 2.上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：持續胸痛、心臟不適感、休克、過敏起疹子,請立刻聯絡您的醫師。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。