

<藥物效用>

用於治療嚴重牛皮癬及皮膚角質化

<服藥指示>

1. 請按照醫師指示服藥。
2. 忘記服藥請儘快服用，若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥，不可一次服兩次藥量。

<注意事項>

1. 此藥建議與食物或牛奶一起服用。
2. 此藥物可能會影響夜間視線，故於夜間盡量避免開車。
3. 接受此藥治療期間，與完成治療後3年內，不建議捐血。
4. 若您有計劃懷孕或已懷孕與授乳之婦女，請事先告知醫師，因服用藥物期間不可懷孕。
5. 若您有(或曾經有)肝腎疾病者，或同時有使用其他藥物，請主動告知醫師。
6. 若對此藥有過敏現象，請停止服用，並告知您的醫師或藥師。

<副作用>

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：嘴唇乾澀(此症狀可由使用油性護唇膏緩除)、嘴角裂傷、結膜炎、對光敏感等副作用。
2. 上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形，請立刻聯絡您的醫師：過敏(發疹或搔癢)、嚴重頭痛、噁心、嘔吐、視力模糊等。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。