

<藥物效用>

主要預防或治療口腔及皮膚念珠菌感染。

<服藥指示>

請依照醫師指示，服用此藥物

建議用法

成人：依照醫師指示之用量，加適量蒸餾水(約 5-10cc)製成懸濁液，含漱 5 -15 分鐘後即可吞下。

幼兒：依照醫師指示之用量，加適量蒸餾水(約 5-10cc)製成懸濁液，振搖均勻後，用乾淨棉花棒，塗抹於小兒舌背或口腔即可。

請保持每日固定時間服藥，如果忘記服藥，請盡快服用；假如已接近下次服藥的時間，只要服用下次的用藥就好。不可一次服用兩次的藥量。

<注意事項>

1. 已製成之懸濁液，應於當日使用完畢，若超過時限，不建議再使用。
2. 鵝口瘡白色乳凝斑消失後，仍需要防患再次發生，並持續給藥約一週，以根除芽胞。

<副作用>

1. 每一種藥物都有副作用，若有以下情形發生，請勿驚慌：胃腸不適、噁心嘔吐。這些症狀可隨時間慢慢減弱
2. 上述的症狀若持續加重，請立即聯絡您的醫師。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。