

<藥物效用>

- 1.治療泌乳激素異常
- 2.帕金森氏症

<服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示，請勿擅自停藥或更改劑量。
- 2.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥時，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。
- 3.請與食物或牛奶併服。
- 4.服藥期間請避免喝酒。

<注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳，請告知您的醫(藥)師。
- 2.若您對本藥或麥角鹼(Ergot Alkaloid)過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.服用此藥時，應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥品。其中特別要注意的有：避孕藥、其他帕金森氏症藥物、其他賀爾蒙。
- 4.若您有肝臟疾病、腎臟疾病、心臟疾病、高血壓、胃潰瘍、精神疾病，請告知您的醫(藥)師。
- 5.另外其有導致眩暈及嗜睡的副作用，服用時避免從事需要集中注意力的事如開車或操縱機械。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：噁心、暈眩、頭痛、口乾，這些症狀會隨時間慢慢減弱。
- 2.上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形，請立刻聯絡您的醫師：嚴重噁心嘔吐、嚴重暈眩、嚴重頭痛、手腳腫脹、膀胱功能降低。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。