

<藥物效用>

治療因頭頸部癌放射線治療造成唾腺功能減低而引起的口乾燥症或 Sjogren' s Syndrome 所引起的口乾燥症

<服藥指示>

1. 請按照醫師指示服藥。
2. 忘記服藥請儘快服用，若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥，不可一次服兩次藥量。

<注意事項>

- 1.孕婦或授乳婦女請告知您的醫師或藥師。
- 2.若有未控制之氣喘、慢性支氣管炎、慢性阻塞性肺部疾病、病變性縮瞳(急性虹膜 炎及閉角性青光眼)、心血管疾病等患者，請先告知醫師或藥師。
- 3.若對此藥有過敏現象，請停止服用並告知您的醫師或藥師。
- 4.本藥可能會造成視覺上的干擾,服用後請盡量應避免駕車或操作具有危險性的機械

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有頭痛、呼吸不順、視力干擾、胃腸痙攣、噁心嘔吐、流淚流汗等，請勿太驚慌，這些症狀會隨時間慢慢改善。
- 2.若上述症狀有加重或持續，請立即停藥並告知醫師。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。