

<藥物效用>

此藥是用來控制第二型糖尿病，使您的血糖在正常(接近正常)的範圍內。

<服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示，請勿擅自停藥或更改劑量。
- 2.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥請盡快服用；若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。
3. 糖尿病雖然無法根治，但可經由長期之照顧，得到良好控制，不可因自覺症狀已改善而擅自停藥；不控制之高血糖易引起腎臟，眼睛及心血管病變。
4. 將此藥與食物併服，可減少腸胃不適。

<注意事項>

1. 若您計畫(已)懷孕、哺乳或有肝腎方面疾病(如腎功能不全)，請告知您的醫(藥)師。
2. 若您要接受某些需使用顯影劑的檢查，如電腦斷層掃描，請主動告知您的醫(藥)師，因檢查前應停止服用本藥 48 小時。
3. 輕微感冒或發燒時，仍應正常服用本藥，並定期監測血糖。若出現呼吸困難，嚴重咳嗽或高燒則應停用本藥並立即就醫。
4. 服用此藥時，應避免服用酒精性飲料。

<副作用>

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：胃腸不適、脹氣、噁心感、輕微腹瀉、味覺異常。這些症狀會隨時間慢慢減弱。
2. 上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形，請立刻聯絡您的醫師：嚴重嘔吐、呼吸急促、肌肉酸痛、疲倦嗜睡、面部潮紅、心率增快。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。