

<藥物效用>

本藥可用於治療胃癌、大腸癌、乳癌、結腸癌、頭頸部鱗狀上皮癌，亦可與其他抗癌藥物併用，治療轉移性及末期癌症。

<服藥指示>

1. 請按照醫師指示服藥。
2. 忘記服藥請儘快服用，若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥，不可一次服兩次藥量。

<注意事項>

您計畫(已)懷孕、哺乳或有肝腎方面疾病，請告知您的醫師或藥師。

2. 若您對此藥有過敏現象，請停止服用並告知您的醫師或藥師。
3. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物（包括非處方藥品、維他命及中草藥），如抗病毒藥（sorivudine）、抗癲癇藥（phenytoin）、抗癌藥等。
4. 本藥會使您對病菌的抵抗能力降低，應避免與有傳染性疾病(如感冒)的人接觸。

<副作用>

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：胃腸不適、噁心、嘔吐、食慾減低、掉頭髮、皮膚顏色變深等，這些症狀會隨時間慢慢減弱，若情況未改善或惡化，請與醫師連絡。
2. 若出現發燒、寒顫、異常出血、淤血、皮膚或眼球變黃、倦怠、劇烈腹痛、嚴重腹瀉、昏睡、頭昏、意識障礙、血尿、口腔潰瘍、皮膚紅疹等情形，請立即與醫師聯絡。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。