

<藥物效用>

Ulsamin 能夠局部性保護潰瘍部位，與細胞表面的蛋白質形成保護膜，保護新形成的黏膜細胞。

<服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示，請勿自行停藥或更改劑量。
- 2.忘記服藥時請盡快服用，若接近下次服藥時間，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。
- 3.於空腹或飯前 1 小時使用。
- 4.請與制酸劑間隔兩小時使用。

<注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳，請告知您的醫(藥)師。
- 2.如果您對本藥成分過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.服用此藥時，應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥品。
- 4.若您有腎臟疾病，請告知您的醫(藥)師。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：腹瀉、便秘、口乾、脹氣，這些症狀會隨時間慢慢減弱。
- 2.上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形，請立刻聯絡您的醫師：過敏反應、臉部腫脹。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。