



臺北醫學大學附設醫院
TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

9001

備勞喘[®] 定量噴霧吸入器
Berotec[®] N



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

備勞喘[®] 定量噴霧吸入器 (Berotec[®] N)

2009.07 修訂

藥品成分名：Fenoterol 100mcg/噴，每瓶 200 噴

作用

這是一個支氣管擴張劑，在氣管收縮導致的呼吸困難時，可快速幫助您擴張氣管，緩解症狀。

用法

1.

將噴霧器出口 蓋子 移除



2.

將吸入器輔助器開口較寬的一邊與噴霧器出口 連接



3.

上下搖動 噴霧器 (瓶底感到冰涼即可)，同時確定上述連接處是否緊密



此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

4.
吸入前先呼一口氣



5.
將吸嘴含於兩唇間，按壓一次吸入器，同時慢慢持續深吸氣至少 3-5 秒
(請盡量於按壓時同時吸氣以確保藥效)



6.
然後閉氣 5-10 秒，再慢慢吐氣



注意事項

若需吸入第二個劑量時，請在第一次吸入動作完成後隔 1-2 分鐘，再吸入下個劑量。

如何清潔？

至少一星期清理吸入器一次。將吸入器(塑膠外殼)與藥罐(金屬罐)分開，吸入器可以水沖洗，洗完後直接晾乾即可，避免置於溫度過高的地方(如日曬處)，且不須以吹風機吹乾。藥罐不可放入水中。

